



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



17
575

01
at a
3

Tal. 61
R
Z44
Alca

ANDREAE ALCARIS MEDICI, AC CHIRURGI GVADALAXARENSIS IN
amplissima Salmanticensi Academia Chirurgæ
facultatis primi Professoris Chirurgiæ Libri Sex.

IN QVIBVS MVLTÆ ANTIQVORVM, ET RECEN-
tiorum subobscura loca hætenus non declarata interpretantur.

De Galea m. 1774



SALMANTICAE,
In ædibus Dominici à Portonarijs, S. C. M. Typographi.

MDLXXV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

Esta tañado en res maravedis el pliego.

De Galea m. 1774

EL REY.

PO R quanto por parte de vos el Licenciado Andres de Alcaçar, Medico y cirujano Cathedratico en la Vniuersidad de Salamanca, en la Cathedra de cirugía, nos fue fecha relacion diziédo que vos auíades compuesto vn libro de cirugía que tenia feys tratados, vno de heridas de cabeça, y otro de heridas de neruios, y otro de heridas penetrantes a lo hueco del pecho, y otro de heridas del vientre, y otro de las apostemas venenosas que vienen en tiempo de pestilencia, y otro del mal de bubas, en los quales tractados allende de la theorica sciencia y explicacion de muchos textos de aathores graues antiguos y modernos se conteniã en ellos muchas cosas en pratica y experiencia muy necessarias, el qual era muy vtil y prouechofo para la republica y nos suplicasdes os mandassemos dar licencia e facultad para le hazer imprimir y priuilegio por el tiempo que fuessemos seruido, o como la nuestra merced fuese: lo qual visto por los del nuestro consejo, por quanto en el dicho libro se hizo la diligencia que la Prematica por nos agora nueuamente sobre ello fecha dispone: fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra cedula en la dicha razon, e nos touimos lo por bien, y por la presente vos damos licencia y facultad, para que vos, o la persona que para ello vuestro poder ouiere, y no otra persona alguna podays hazer imprimir y vender el dicho libro que de esso se haze mencion en estos nuestros Reynos por tiempo y espacio de diez años cumplidos primeros siguientes que corren y se cuentan desde el dia de la fecha desta nuestra cedula, so pena que qualquiera persona que sin tener para ello vuestro poder le imprimiere y vendiere, o hiziere imprimir, o vender pierda toda la impresion que hiziere, o vendiere con los moldes y aparejos della, e mas incurra en pena de cinquenta mil maravedis por cada vez que lo contrario hizieren, la mitad de la qual dicha pena sea para la nuestra camara y fisco, e la otra mitad para vos el dicho Licenciado Andres de Alcaçar, y todas las vezes que se ouiere de imprimir el dicho libro, durante el tiempo de los dichos diez años le trayays al nuestro consejo juntamente con el original, que en el fue visto que va rubricada cada plana e firmada al fin del de Alonfo de Vallejo nuestro escriuano de camara, e vno de los que en el nuestro consejo residen, para que se vea si la dicha impresion esta conforme al original, e se os de licencia para lo poder vender, y se tasse el precio a que ouieredes de vender cada volumen, so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha pregmatica, y leyes de nuestros Reynos, e mandamos a los del nuestro consejo e otras qualesquier justicias de nuestros Reynos, que guarden e cumplan y executen e hagan guardar, cumplir y executar esta nuestra cedula e todo lo en ella contenido. Dada en Madrid a veynte y nueue dias del mes de Agosto de mil y quinientos y setenta y quatro años.

YO EL REY.

Por mandado de su Magestad.

Antonio de Eraffo.

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO
APPROBATIO.



V S S V Regij Senatus supremi, præclarum hoc
& egregium chirurgiæ opus, vidi & attentè perle-
gi, in quo Præstantissimus vir Andræas Alcaçar,
non solum selecta atque præclara ab antiquis au-
thoribus desumpta cõplexus est, verum etiam multa qui-
dem addidit cognitiõe dignissima. Quare ita censeo, hos sex
chirurgiæ libros, in quibus nihil reperitur quod non sit vtile
& ad curãdos hominum morbos egregiè accommodatum,
typis posse, & debere committi, vt eorum vtilitas, quæ profe-
cto maxima est, ad omnes redundet, Datis Madriti die. 27.
Mensis Iulij. Anno à Natiuitate Domini. 1574.

Doctor Petrus
de Torres.

❧ INDEX LIBRORVM
qui in hoc opere continentur.

1 De Vulneribus capitis:

2 De Vulneribus neruorum, alijsque ipso
rum affectibus.

3 De Vulneribus Thoracis.

4 De Vulneribus ventris inferioris regio-
nis abdominis.

5 De morbo Gallico.

6 De Valetudine tuenda tempore pestis,
ac de curandis pestilentibus inflam-
mationibus.

ANTONIVS CA-
CERES PATIECVS,
CANDIDO LECTORI. S.



VLTVM DEBETVR CAN-
dide Lector nostri temporis homini-
busijs, qui in restituendis bonis artibus
egregiam operam nauarunt. Nam si-
ue perturbationes rerum, & commu-
nium temporum casus, siue hominum
inertia, & libido ita bonas artes labefa-
ctauerant, vt earum aliquod in nostra
Europa vix vestigium appareret: Ma-
thematicæ disciplinæ, quæ explicatissimam continere verita-
tem dicuntur, ita in alta obscuritatis caligine latebant, vt nisi
Georgius Purbachius, & Ioannes de Monte Regio instauran-
dis illis, auctores extitissent, vix aliquod earum nunc lumen elu-
ceret. Ars medica ita erat Arabum, & eorum, qui Græca in la-
tinum inquinatè transferebant, intoleranda barbarie oppres-
sa, & afflicta, vt quæ malis hominum curandis erat destinata,
ipsa multis vulneribus confossa, & deformata videretur. Ha-
buit & hac nostra ætate suos propugnatores, & Camillos, qui
nobis eam magna ex parte sartam, tectam, restituerent. Elo-
quentia verò, quæ ipsa cæteris artibus lumen adhibet, adeò
multis barbariæ tenebris sepulta erat, vt nisi viri aliquot in ea
instauranda, subtilissimi, & eruditissimi vehementer elabora-
sent, cum suo illa Cicerone in fouea obliuionis, verborum
monstris velut fluctibus obruta, mansisset. De chirurgia quid
dicam? quæ cum valde utilis, & necessaria sit, vulneribus homi-
num curandis, præter vnum Guidonem, alterum, qui eam be-
ne explicauerit, neminem habeamus. Qui Guido, tametsi eru-
ditè fatis, & rectè eam partem medicinæ tractauit, multa ta-
mèn breuiter inclusit, nonnulla oblitus est, non pauca negle-
xit. Noster nunc Alcazar chirurgiam ipsam plenam nobis, &

absolutam dedit: non tam sponte sua, quàm amicorum rogatu, ut id faceret impulsus. Sex ille libris tantam rem, & usque adeò necessariam complexus est: De quibus sigillatim dicere quì conuenit, cum illi sex omni parte indicent? De quinto libro tantum id affirmare pro certo ausim, si cætera defuissent omnia, hunc magnæ nobis utilitati, & authori ipsi magno honori, & emolumento futurum. Agit enim decurando eo morbo, qui homines libidinosos grauissimis articulorum doloribus discruciat, obscœnis pustulis extrinsecus fœdè, misereque confectos, cuius mali contagio, cum ita latè pateat, ut iam, vel ab Indis vel, à Gallis, vel ab Hispanis nomen inuenerit: & ita sit pestilens, ut hominis artus, nervos, ossa peruadat, & corrumpat: tamen nullam fatis adhuc commodam inuenire potuit medicinam: atque inde factum est, ut multi medicaminibus exhausti, & confecti, cæteros admoneant sedulò de non admittenda curatione. Hic verò noster AEsculapius, & huius pestis pertentaui venas, & indagauit naturam, & medicamina excogitauit: quibus perfectè, citò, & absque magno ægri tædio huic morbo mederetur, nouaque, ac forsan hactenus non visa ferramenta fabricatus est, affabrè facta, ad curandos omnes humani corporis pœnè morbos. De hoc igitur verè dicam (nouì enim eum à multis hinc annis per familiariter) hominem esse, tam alto, & acri ingenio præditum, ut sine magno studio posset difficillima quæque in literis adipisci: Tanto autem studio in bonis artibus elaborasse, ut sine magno ingenio quiduis facillè consequi potuisset. Cum vtroque igitur telo sit strenuè præliatus, quos barbaros hostes? quæ valla? quas fossas? quæ non ille tormenta superauerit? Quod ipsum facillè cum cernerent multi magnates, & viri principes, quanti eum facerent, manifestissimis iudicijs iudicauerunt: Alteri enim huic magna stipendia, ut apud illos esset, suppeditauere: Alteri magna amicitia, & fauore sunt eum vbique prosequuti. Quare valde spero Almæ Academiæ, atque adeò eruditis omnibus has nostri

Alcazaris

Alcazaris elucubrationes, vt iam tandem in lucem prodirent,
visum iri, non indignas. Ego verò, quod ad me attinet,
hominem, & officio amicum, & etate grauem, & eru-
ditione perfectum, ad cætera publicanda, & iure amici-
tiæ, & mortis recordatione, & admirandæ doctrinæ com-
memoratione cohortabor, & calcaribus adhibitis impel-
lam. Vale. Augustobrigæ. 12. Calend. Augusti. Anno
Millesimo Quingentesimo Septuagesimo primo.

TORIBII DE PARAMO
ADLECTOREM.

Dulcia lector amas: sunt hæc dulcissima lectu.

Vtile si mauis, vtile cernis opus.

Quod si vtrunq; voles: opus hoc vtróq; refertum est:

Quo pascas animum: quóque difertus eris.

ALCAZAR noster sic miscuit vtile dolci:

Temporis vt nostri iure vocetur honos.

EIVSDEM IN INVIDVM.

Ni lego te metuo, quanuis mihi multa mineris.

Inuide: Quid frustra fortia verba iacis?

Sæpe in neglectis reperitur gemma lapillis.

Sæpe cadus vilis nobile nectar habet.

Nil dignum inuidia meditor, sed fama suffurat

Nescio quid de me, quod facit inuideas?

Aut hoc dissimula: aut famam argue, quæ mihi tantum
arrogat: & dete nil ve, parum verefert.

ALIVD.

Non legis, & carpis: qui non capis, inuide carpis.

Inuide quid carpis? fac meliora, legam.

AMPLISSIMO AD MODVMQVE ILLVSTRI

SALMANTICENSIS ACADE-

miae Senatui. Andræas Alcazar Medicus, Chirur-

gæ facultatis primus in eadem Acade-

mia professor. S. D.



UX QVO SVM ACADEMIAM VE-
stram omnium excellentissimam, atque honestissi-
mam ingressus. (Senatus amplissime) nulla maior
vrere me cœpit cura, nulla sollicitudo, quàm vt me,
non ingratum, sed maximi erga me vestri beneficij
memorem publico aliquo testimonio ostenderem.
Nam cum insigni Chirurgiæ cathedra, Hispaniarum
prima, tanto honore, tantoque applausu pro vestra
humanitate, me decoraueritis nihil in me certè est,
quod vobis iure optimo non debeat. At cum vires
meæ imbecilles, par referre nequeant, animum hunc

meum (quo neque paratior, neque propensior, vllus in vos est) libentissimè offerre
decreui. Cuius certissimum argumentum est, libellus iste noster, vobis sacratus: qui
ex laborum nostrorum officina non immatura, neque tumultuaria elucubratione,
sed veluti elephantis partus (vt est in verbo) morosus prodit. Multi enim consum-
pti à me anni sunt: multi labores exanthlati, tum in perscrutandis veterum, & recen-
tiorum scriptis: tum in nouis, & rationibus morborum, & curandi methodis excogi-
tandis, præter innumera experimenta, quæ temporum series suppeditauit: ex quibus
bonam partem proximo hoc quadriennio, studiosam iuuentutem, qua potui diligen-
tia, edocui: quam nostra industria non poenitendos progressus in Chirurgia hac facul-
tate facturam spero. Factum hinc est, vt aliquantulum iam respiret Chirurgia nostra,
quæ vbiq; penè sepulta iacet. Nam (vt liberè loqui liceat) si quosdam, insignes qui-
dem Chirurgos excipiamus magis Chirurgiæ dehonestatores, quàm cultores reli-
qui dicendi sunt: qui perfricta fronte per vrbes, veluti grassatores Chirurgum no-
men præripientes, vix primis literis degustatis, omnibus temerè salutem pollicen-
tur: omnibus medentur: neque adeò desperatus est morbus, cui se præsentaneum re-
medium non fingant inuenisse, quò à misera plebe pecunias extorqueant. Atque eò
dementiæ deuentum est, vt quæ clarissima ab illustribusque viris summa diligentia
excolta, semper extitit Chirurgia, tandem in mechanicorum, & muliercularum ma-
nus (proh dolor) inciderit, à quibus miserrimè dilaniatur. Cui malo præclare à vobis
P. Amplissimi succursus est: qui Chirurgiæ dignitatem restituentes, in propriam
sedem ipsam collocauistis, vbi profuga ars, patriæque pulsa, iam reuocata tranqui-
llam vitam ageret, ac perinde reipublicæ tot malis scaturienti subueniret, ad quod
munus, me, licet indignum, & tanto oneri imparem, destinauistis. Ego quidem pro

A 5 viribus

ANDREAS ALCAZAR

AD LECTOREM IN CHIRVR- GIAE COMMENDATIONEM.



ETVS, ET CELEBRATVM EST LA-

conis cuiusdam apophthegma, qui oratori cuidam, Herculis laudem longa oratione exornanti, dixisse fertur. Quis Herculem vituperat? quasi inanem operam, & superuacuum orationem, & laudem significans. Ad eundem modum obijcere mihi aliquis posset Chirurgicam disciplinam commendatione non indigere, illiusque defensionem à me frustra fuisse susceptam. Sed quoniam nonnullorum prauitas, & omnia contemnendi impudentia, aliter quam sapientes, sepe sentit, & indicat, quasi recens nata, aut obscura Chirurgia esset: statui paulo altius ori-

ginem huius artis repetere, atque dignitatem ostendere. Perutilis est Chirurgia facultas, clara, illustris, imò quid illa vtilius? quid clarius? quid illustrius? Et si originem, atque antiquitatem queras, quid antiquius? quando priores illi Viri Homérico carmine laudati Podalirius, & Machaon Aesculapij filij, Agamemnonis castra secuti, solis vulneribus medebantur. Chiron etiam Centaurus longè antea Chirurgiam illustravit: cuius etiam Homerus, & Ouidius meminere, ab eoque Chirurgiae nomen subortum esse, quidam referunt. Optimus etiam Chirurgiae dignitatis, testis est, summus ille Couis Hippocrates Medicorum splendor. Cui si Epidemiorum, s. multi quae alijs eiusdem libris fidem habemus, huic arti propriam admouisse manum, nec Chirurgi nomen dedignatum reperiemus. Ibi enim inter multa, infixum sagittae ferrum à vulnerato quodam extraxisse refert: tum iuuenem capite vulneratum curasse. Scripsit librum etiam maxima elegantia, de capitis vulneribus: alium de Vlceribus: alium de officina Chirurgiae: alios de ossium fracturis, ac luxationibus, siue de articulis: in quibus, administrationibus Chirurgicis, atque etiam inuentione instrumentorum, quae ad Vsum artis necessaria sunt, maxime pollere, demonstrat. Nec prospero semper Vsum fuisse successu, prodidit: imò interdum aberrasse, in capitis praesertim suturis. Cuius ingenuam, apertamque confessionem mirè laudauit Celsus Cornelius libr. 8. capit. 4. dum inquit, A suturis se deceptum Hippocrates memoriae prodidit, more, scilicet, magnorum Virorum, & magnarum rerum fiduciam habentium. Quante praeterea laudis, quantaeque antiquitatis Chirurgia sit, Medicinae decus ostendit Galenus praesertim, super librum Hippocratis, de victus ratione in morbis acutis Coumento. l. 6. Vbi non tertium instrumentum (vt Auicenna voluit) sed secundum Chirurgiam nuncupauit. Tercio praeterea de compositione medicamentorum per genera, non parui fecit gladiatorum curam sibi vicesimum nonum annum agenti à Pontifice Romae iniunctum fuisse: nullumque ex illorum numero interemptum, vt tanquam miraculum haberetur, quod reliquis antiquioribus medicis secus contigisset: atque inde factum, vt postea Pontifices omnes, gladiatores sibi committerent curandos. Ipse quoque Galenus illos Hippocratis Chirurgiae libros, quorum superius memini, interpretatus est: aliaque multa Chirurgia opera ille monumentis suis posteritati reliquit. Quid clarissimum illum referam Cornelium principio septimi libri Medicinae hoc instrumentum tanto opere commendantem, ac subinde inter reliqua extollentem: qui & vetustissimum, & potissimum, & ab ipso parente Hippo-

crate

crate excultum, eiusque eff: Etum inter omnes Medicinæ partes evidentissimum esse asseue-
rat. Hinc merito insignis ille Andreas Vesalius in proœmio sui operis Chirurgiam sacratissi-
mam nuncupauit: intelligens nimirum, quantum ex illa utilitatis: quantum beneficij huma-
næ naturæ comparatum sit: sine qua, Medicus nulla ratione perfectus dici potest, cum (ut
satis probatum est) Medicinæ potissimum sit instrumentum. Sed non amplius in nostræ mira-
bilis, innumeræq; laudis, Chirurgiæ commendatione immoremur (latissimus enim diuagan-
di campus est) inopemq; me copia fecit, ut cum ingenioso poeta loquar. Vnum tandem tibi, Le-
ctor optime, persuasum vellem, hanc esse artem, quæ præter ingenij, & iudicij vires, quibus
non paucis opus est, maximum etiam studium, atque indefessos labores exposulet, ut in ea
quis, vel mediocriter proficiat: nec triviale Chirurgorum nomine, quorum ubique magna
turba errat, censeatur. Hac via ab Hippocrate, hac a Galeno cæterisq; illustribus Chirurgiæ
cultoribus ad ipsius culmina peruentum est: neque ignavis, & desidibus iter patet. Egre-
giam ergo operam (Candide Lector) in Chirurgia naua, ad eamq; animum sedulo,
ac totis viribus intende. Quod si præstiteris, & vberimos illius fru-
ctus percipies, & quanti illa facienda sit, mani-
feste cognosces.

Errata sic emendare oportet, primus numerus paginam, secundus columnam, tertius lineam indicat.

- 14.2.15. denisissimis.
15.1.23. perpetuum.
17.1.20. conceptas.
17.1.19. est frigidum.
18.1.21. ad. ab.
18.2.36. di. crimina.
19.1.14. rhogme, rhogme.
19.1.35. valculis.
19.2.9. cap. 5. dic. 4.
26.2.39. est, &.
27.1. antepenult. scotone, cotone.
28.1.23. pro. prae.
29.1.18. notu, motu.
29.1.17. eandem, eadem.
30.1. penultim. rigore, rigores.
33.2.13. pafmus, pafmus.
33.2.18. iufiniftra, iufiniftra.
34.1.28. noluit, voluit.
34.2.3. iimmeto super ofis, linimen
to super duram membranā infuso,
vel ex sanguine super.
36.1.13. timoris, tumoris.
36.2.23. fractum, fractura.
37.2.2. secundum, secundam.
37.2.5. obliquit, obliquus.
38.1. final. Tertio. Tertium.
41.1.18. paica, poica.
41.1.24. rebelatur, reuallatur.
41.1.27. copiam, quopiam.
42.2.28. compos est, compotis.
45.1.30. vifus, vifus.
46.2.19. cenemmos, cenemon.
47.1.1. quam, qua.
47.1.17. tractat. 30. tractat. 3.
47.2.21. carnationis, carnationis.
49.2.41. affigitur, affigitur.
51.1. vltim. penetrans debeat, penetrat
fractura debeat.
52.1.11. quia, ratio quare.
54.1.1. tollantur, at tollantur.
54.2.28. est apho. est. 2. apho.
55.2.4. medico commendat, medicum
commendat.
55.2.5. prae. dictionem, prae. dictio.
56.2.37. apicite, apicite.
58.2.37. vt. ne.
58.2.39. vt. ne.
59.1.3. nō vulnerum, nō vt vniuerum.
59.1.4. fore, foret.
59.1.27. durat cerebri, dura cerebri.
65.2.40. de atque, abundat.
67.2.20. curare, abundat.
69.1.4. apparuerat in, apparuerint
69.2.2. caufiq, claufique. (& in.
69.2.41. a. que, atq.
70.1.6. immitenti, immitenti.
70.2.18. repleatur, repleatur.
73.1.38. fice, fice.
73.2.14. folidum, folidum.
73.2.41. in alijs, fice in alijs.
75.2.2. cum, fice.
76.2.22. gontufa, gontufa.
76.2.5. deligatur, deligatur.
76.2.34. Requa. Reliqua.
76.2.35. reliquifonem, reuulfonem.
76.2.36. cum. cum. cumini.
77.1.26. immaturam, abundat.
77.2.5. fice, fice.
78.1.32. est os inflari, eos inflari.
78.1.33. caligine, caliginem.
78.1. final. oculorum nunc, oculorum
caliginem nunc.
78.2.19. grumi, grumini.
79.1.4. ferus, ferus.
79.2.13. fimilis, simile.
80.2.22. emiffaria, emiffarium.
80.2.19. foluto, foluta.
80.2.28. Offa. Offe.
80.2.28. abfterfa, abfterfo.
81.2.7. fermentum, currotum.
81.2.31. fice, fice.
82.1.8. fuppositis, fupra pofitis.
82.1.12. dicta, dicta.
82.2.15. alchermes, alchermes.
82.2.23. citra, abundat.
82.2.40. fumiculis, funiculis.
84.1.12. diximus temperatu, diximus pra
uis temperaturis.
95.1.6. debet, dicendum.
96.2. penultim. gummi, gummi enhem.
97.2.22. oleo, alca.
97.2.25. oficulam commotam, oficula
commota.
97.2.37. quam, atq.
97.2. penult. comperto, cooperto.
98.1.3. maximi, marini.
98.1.23. remittetur, remutetur.
98.2.25. feq. fequenti.
98.2. antepenult. etenim, etiam.
99.2.17. quida, quida.
99.2. antepenult. nerui copulatiores cum,
neruis corpuentiores.
99.2. penult. vt, vnde.
99.2.22. quod, quo ad.
99.2.26. Ferantur, abundat.
99.2.29. erunt, iuerunt.
99.2.31. esse, abundat.
99.2.31. text. tract.
99.1.13. an. a.
102.2.16. nec, abundat.
102.2.18. confuere, conficere.
103.1.21. panni, panis.
105.1.13. illa, ille.
105.1.20. caput. 4. cap. 1.
106.1.5. hac, hac.
106.1.28. habent, prohibent.
111.1. penult. qua, abundat.
111.1. final. maneret, manere.
112.2.31. nedonem, nerui.
117.2.33. primo vulneratu, principio val
nerum.
118.1.3. difidentes vulneris ore, difide
tibis vulneris oris.
119.1.27. fice, abundat.
119.1.36. apta, apte.
119.1. antepenult. auxilij, auxilium.
119.2.11. phalitam, per halitum.
121.2.23. pagatus, pagatus.
121.2.21. intamo, in infirmo.
121.2.30. fice, fice.
126.2.32. membrum, membri.
129.2.35. vnc. drag.
131.2.36. mellis, mellitis.
132.2.15. cenfueri, cenfuerit.
137.2.18. inanibus, manibus.
138.1.14. extertio, externo.
140.2.19. comprimenta, comprimente.
140.2.21. cum, ficiu.
143.1.26. est, &.
143.1.30. diuretiarum, diuretiarum.
143.2.5. vnc. drag.
147.2.13. confubunt, confultit.
147.2.36. redinotur, redditur.
148.2.20. diametro, diametro.
148.2.21. expuritione, expuritione.
149.2.13. continetur, continetur.
149.2.13. lateris, latere.
151.1.1. peritanei, peritanei.
151.1.19. aperiendi, aperiendi.
152.1.37. linamentum, linamento.
157.1.35. longam, longam.
158.2.26. artium, artium.
159.1.28. vulnerum, vulnerum.
159.1.33. pectoris abundat.
159.1.35. curantur, curentur.
161.1.21. decoctis, decoctus.
162.1.34. 98. 98.
162.2.35. vnc. vnc.
163.2.40. ficede, ficede.
166.1.12. prima, vnam.
166.2.11. carotante, egrotante.
166.2.34. difparaueris, difparaueris.
167.1.15. qui, quod.
168.1.22. infigniti, infigniter.
168.1. penult. redactore, redactorum.
169.1.12. inculto me audacia, incultus
me audaciorum.
170.1.30. prius, primus.
170.2.36. cenfuerint, cenfuerint.
171.2.4. frusta, frusta.
172.1.31. maleuolus afpectus, maleuolus
afpectu.
173.2.33. appofita, oppofita.
176.1.21. obferuare, obferuari.
176.1.32. fermenti, fermenti.
177.1.13. dolentim, dolentim.
177.2.40. remedijs, remedia.
179.1.27. abfolitam, ad folitam.
180.1.6. vitare, victrice.
183.2.34. igitur, agitur.
183.1.40. capite, capi.
184.2.3. conctat, conctat.
184.2.9. id quo, in quo.
189.2.38. geminata, vis geminata.
189.2. final. inter fe, inter fe.
192.2.15. quadam, quadam fententia.
193.1.16. inafionem, inafionem.
194.2. antepenult. nunc fubi, non fubi.
195.1.37. illitit, illitit.
196.1.41. vis, bis.
198.2.31. de fluxum, de fluxus.
201.2.33. vitam, vitam.
203.1.21. ferina hec lues, ferina haic lai.
204.1.1. catexi, catexi.
205.2.19. forcipedo, forcipe vero.
205.2.32. drag. vnc.
207.1.32. cithoniorum, cithoniorum.
209.1.3. cucurbita, cucurbita.
209.1.17. chifmifitarum, alchimifitarum.
209.2.7. fumum reduci, fuu locum reduci.
209.2. final. mundicato, mundificato.
211.1.30. elenationem, elenatione.
216.2.16. tibus, tibus.
217.2.20. in, to in.
219.2.6. drag. carz, drag. iij. carz.
219.2.12. Galenum, Galenus.
220.1.1. in furmo, in furmo.
222.2.23. nigrities, nigrities.
223.1. vltim. feruatur, feruatur.
225.1.15. diferturi, diferturi.
226.2.10. turbidine, turbine.
226.2.13. etenim, etiam.
226.2.17. men tolle.
226.2.32. comittantur, comittantur.
227.2.4. rebrum, vrbium.
228.1.39. efme, fme.
228.2. penult. reddat, redeat.
229.1.14. reddi, reddi.
229.1.28. profrigatis, profugatis.
231.1.40.3. part. dict. 2.7. 3. t. d. 27.
231.2.8. offertur, offertur.
231.2.34. part. primi.
234.2.11. affuctiores, affuctiores.
236.1.13. beratio, berare.
239.1.12. diftentes, diftentes.
239.1.23. additum, additionem.
239.2.16. statum, etatum.
240.1.26. cum, cum.
241.1.9. philoballami, xiloballami.
241.2.4. innitum, innitum.
241.2.38. rofarum, rofarum.
242.1.29. cias, cias.
242.1.30. drag. vnc.
242.2.21. vera, quinta.
243.2.2. emundtoriarum, emundtoriorum.
246.1.23. bubone, buboni.
246.1.34. part. primi.
246.1.38. part. primi.
246.2.8. tar. tur. canterium, canterium.
246.2.10. tho. tho. c. f.
249.2.9. memento, mento.
249.2.28. uis, uis.
Fini.

Liber.I.De vulnerib. capitis.

13

ANDREAE ALCAZARIS MEDICI, DE VULNERIBVS CAPITIS LIBER VNVS.

Caput Primum. De capitis anatome.

Triplex ven-
scr.



NATOMICAS

Capitis de-
scriptio.
lib. 1. de
Histo.
anim. c. 7.

Caput oca-
lorum cau-
sa, altiori lo-
co positum.

administrationes per tractantibus, peculiare est, triplicem ventrem, superiorem, medium, & inferiorem describere. De vltimis duobus suo loco differemus. Nunc (quando de capitis vulneribus sermonem instituimus) superioris ventris, nempe capitis, anatomie premitamus: quod rite quidem explebimus, si ipsius capitis definitione, seu descriptione prius proposuerimus. Est ergo caput Philosopho teste, capillata pars, qua animata regalia, vel sacra membra continentur: ob eamque rem Hippocrates de morbo sacro, comitiali morbum cerebro infidentem, sacrum nuncupauit. Est enim caput secundum Timaeum, reliquis corporis partibus insignius: cui cetera membra obsequuntur, & veluti regi parent: ac proinde, sensuum domicilium a quibusdam nuncupatur, atque omnia membra praeeminet, quod oculorum causa a natura non sine magno consilio factum est, ut scilicet, altiori parte constitutum, commodius quam alibi cuncta contemplantur, munusque suum obirent, ut eleganter tradit Galenus lib. 8. De vsu partium. cap. 5. Qua ratione, vnus homo, inter cetera animantia, os erectum habet. Vnde Ouidius. 1. Metamorphoseos.

Pronaq; cum spectant animalia cetera terram:
Os hominis sublime dedit, calamus ridere
Iussit, & erectos ad sidera tollere vultus.

Licet Gal. 3. De vsu partium. c. 3. huic sen-

tentie aduersetur, inquit enim, hoc credere hominum est, qui nunquam vident piscem qui coeli speculator dicitur. Estque caput instar sphaerae conditum, nulla alia capacior figura sit. Sed prope rpa vtrinq; parum compressum, ac deflexum, ut capitis ventriculi aptius distinguatur. Capacior autem querenda figura fuit, & quod plus cerebri (quod hois capiti vberius reliquorum animantium proportionem magnitudinis contigit) ea contineretur. Er quia talis figura tutior multo, innoxiorque ceteris est casibus, & quae hois vitae frequentius infidatur, periculis, ut Gal. 4. De vsu partium. ca. 7. & Auerr. 2. colligit cap. de iuuamentis instrumentorum sensus, aperte docere. Sed nec hoc quidem perpetuum est: nonnullis enim non rotunda, sed oblonga capita sunt: quod praeter experimentum, tradit Hipp. lib. De vulneribus capitis, & de aere, aqua, & locis. & Arist. lib. 1. de Histo. animal. c. 16. Idque vel obstetricis incuriae, vel feminali materiae nimis excreseci, tribuit. Quare Chirur-

Caput sphaericae figurae, vtrinq; compressum, & ratio.

Caput quibusdam oblongum.

Rotundum capiti oblongum vulnus non nisi altum contingit, quod sphaerica figura nisi in puncto tangi non possit. Ut ergo extrema medium exaequant, penetrasse necessum est: contra in longa. Licet enim in craneo longa rimam telum fecerit, non ob id statim profunde intromissum necessarium fatendum erit. Quod & mihi ad magni vulneris in oblongo capite curatione, valde profuit considerasse. Est autem caput frigidum

Caput frigidum temperatum est.

Nunc quod de capite asseritur. (Paracelsus de videri vultu) sed quod illa in vultu inquit Galenus est, peraturae, homo non est creatus animalis, sed ut aspicere caelum, quod caelum aspicere non vult, nisi oculum reflexum, quod vult. Idcirco possumus alia animantia. & si aliquid in tepide hoc asserunt, veluti Olympus, siquidem est de natura vranoscomon piscem. i. caeli speculatorem vidisse, qui oculos in medio capitis habet, & si semper ut inuitus caelum aspiciat, nec sciat, si sensus doctus in vultu, est dicendum de vultu, quod talis figura, quod praeus est veluti alij piscis, solum in medio capitis habet, quod oculos in medio capitis sitos habet, unde illi caelum non aspicere est impossibile, quod oculi speculandi, quare caeli speculandi optimi dicitur est. ut dicit Philo. lib. 32. c. 7. & de vultu asseritur in lib. 1. c. 7. & de vultu de vultu c. 7.

Capitis anatome.
Caput duodecim constituit partibus.
Continentes partes.

Contentae partes.

Capillorum natura.

Cutis natura.

Pericraneum.

Pericranei utilitas.

peraturæ, ob frigidā partium ex quibus constitat, ossium nimirum, membranarum, medullarum, & substantiarum naturam. Ergo ad Anatomiam accedentes, duodecim particulæ caput constituunt, ex Auic. i. tertij tract. i. c. 1. ex his, quinque; continentes, septem contentæ dicuntur: continentes, capilli, cutis, musculosa caro, ~~pericraneum~~, pericraneum, membrana, scilicet, calvariæ totā exterius vestiens, & os. Contentæ sunt, cerebri prima membrana, quam quidā duram matrem appellare: secunda cerebri membrana, priori multo tenuior, ob quod pia matris nomen ipsi indiderunt. Medullaris ipsius cerebri substantia, in loculos quosdā quodāmodo diuisa. Et ipsa prima, & secunda cerebri membrana, quæ sub contentis partibus, cū ad cerebri profundū deuentū est, iterū à Doctoribus connumerantur: Rete mirabile, ob eius admirandā, vixque perceptibilem contexturā sic nuncupatū, est quædā venarum (quas Græci choroides vocant) connexio. Hoc quidē re in Anatomis administrationibus inuentū perdifficile est. Vltimò basilare os, quod veluti cerebri basis, & fundamentum sit, sic dictū. Has omnes partes sigillatim prosequamur. Capilli, ex vaporosis totius corporis exhalationibus nascuntur, variisque ob causas à natura dati sunt: tum, quod ipsum caput calfacere, atque venustiore redderent: tum, ut à cœli iniuria, frigore, pluuia, cæterisque exterioribus noxijs tuerentur. Cutis in capite solidior est, quā in cæteris corporis partibus, ut capilli ipsi herētes, stabiliore essent, utque; cranium, & cerebrum, membrana ista carnosā, clypei instar defenderet. Pericraneum, seu periostium nervosa, scilicet, membrana, cranei totū os exterius tegit, atque; ex dura cerebri membrana per ossium futuras, nervorum quibusdā filamentis mediatis, exoritur. Membrana hæc ad duo perutilis est. Primum, ne duo extrema, mollis nimirum caro, & os, sine

medio copularentur: voco mediū ipsum pericraneum. Secundò, quod nervosa sua substantia, particulis illis sensum deferat. Hinc aliqua maximi momēti consequuntur: primum, pericranei vulnera quantumvis exigua, non contemnenda, quinimo maximi pendenda esse, cū à cerebri membrana dura, ut dictū est, originē suam ducat. Tertiò, Emollientia medicamenta, aut nullo modo, aut parciſsimè prædictis vulneribus admouenda: ne caliditate, & humiditate sua, nervorum illis filamentis, de quibus modò memini, putrefactionem inducant. Cui Hipp. lib. De vulneribus capitis, & recentiores omnes, præter ipsum experimētum, concinunt. Quartò, radendum minimè esse os in huiusmodi vulneris futuris, ne ratiōe contritis nervulis, ac disruptis, membrana, quæ ab illis pendebat, super cerebrum decidat. Os calvariæ, cerebri custos, sua ipsum cauitate vestit. Vnde istud calvariæ os, cranium Græcè, quasi continens, dicitur, Cuius crassities, ex duabus tenuissimis, ac vtrique ex parte tenuissimis tabellis constat. Sed in earum interna compagine, spongiformis quædam raritas, nonnullas venulas in se amplectens, reperitur. Ex quibus, dum os raditur, sanguis effluit. Vnde occasio oboriri solet, ut in hac arte parum exercitati Chirurghi, penetrasse vulnus, atque interius sanguinem cecidisse (qui tunc foras, data per ratiōem via, prodeat) falsò arbitrentur. Sed de hoc suo loco latius. Nec desunt spongiformi illi raritati commodæ: namque; illa mediante, cerebrum minus comprimitur: per illam, & corporis, & cerebri exhalationes facilius prodeunt: Sanguis ille venulis contentus, ipsis ossibus inter se medulla carentibus, alimento est: & denique nudato osse ad cerebri usque; membranam, sarcinoides callus inde confurgit, & conflatur. Quam quidem cauitatem, & tabula-

Pericranei vulnera periculosa etiam exigua sunt.

Emollientia medicamenta rarissimè admouenda pericranei vulneribus.

In futuris os minimè radendum, & ratiō.

Os calvariæ duabus tabellis constat.

lenissimè.

Deceptio chirurgorum quorundā.

Spongiformis raritas intra tabellas contentæ commoda.

rum

De Vulneribus capitis.

15

rum compaginem, Hipp. lib. de vulneribus capitis, & Gal. 6. Meth. capitulo ultimo, diploem, ac si duplicationem dixes, appellauere. Caluariæ istud os, non continuum, sed cōtiguum est, ex septem compactum ossibus, quauis quidam octo esse dicant cum ossē cribroso, tamen sub ossē coronali computatur, in quibus quinq; reperiuntur futuræ: tres quidem veræ, ad cerebri interiora penetrantes: ferratiles dictæ: duæ mendosæ, minimè penetrantes: quarum Gal. lib. de ossibus capit. 1. meminit, idq; humanis capitibus magna ex parte contingit: licet Arist. de historia animalium lib. 1. cap. 7. & Cornelius lib. 8. cap. 1. futurarum expertia capita reperiri contendat, sed id rarum est, nec attendendum: Nos enim quæ frequentiora sunt curamus. Sed quò futuræ pauciores sunt, eò capitis valetudo commodior, & id caput firmissimum, & à dolore tutissimum Cornelio est, dicto loco. At certe id mihi perpetuum non est. Nam quauis ab externo nocumento huiusmodi caput tutius sit, ab interno tamen minimè erit: cum futuris carento vaporosæ, & corporis, & cerebri exhalationes progredi non possint. Cui sententiæ patrocinatur Aristot. Problematum 10. problem. 48. Caterum, caluariæ futuræ, nec certum numerum, nec locum in omnibus semper obseruant. Vnde Hippo. de vulneribus capitis: nec futuræ, inquit, capitis in omnibus eodem modo sitæ sunt. Atq; etiam Cornelius loco citato: nec certus, ait, futurarum numerus est, nec locus quidem. Adde Aristotelem loco iam dicto mulieres interdum capitis vnicam futuram habere, contendere. Neq; hæc naturæ variatio miranda est: quādo, in multis alijs variè sæpe ludit natura parens, vt in iecore, & liene: Nam iecur magna ex parte à dextro latere est: lien, à leuo, & tamen iam legitimū illum lo-

cum in nonnullis animalium, lienem cum iecinore permutasse visum est, vt Arist. testatur. lib. 1. de historia animalium ca. 18. & lib. 2. cap. 17. & Gal. de Anatomia administr. lib. 6. cap. 8. futurarum non parua vtilitas est, ne si vnum os læderetur reliquis cranei partibus damnum cōmune fieret. Et quia si futurarum expertus os esset, vnicum tam varium os, crassum nempe, tenue, durum, mollius, secundum cerebri variam exigentiam, componi aptè non potuisset. Acceditque, medicamentum frustra ipsi in varijs morbis, accommodarentur: cum eorum vires, non data per futuras via, ad interiora minimè penetrarent. Vnde Gal. 13. Meth. cap. 22. nisi futuras, inquit, in capitis ossē natura ipsa fuisset, molita, nihil adeò æstimandum fecisset pharmacum vllum extrinsecus impositum. Et statim subdit: ipse enim in me ipso expertus memini, cum infunderetur rosaceum frigidum, certissimè, clarissimèq; sensisse me in fyncipitis loco, eius intrò penetrationem. Est etiam non parui commodi, qd cerebri prima mēbrana futuris ipsis mediātibus, per craneo copulatur, quòdque in plenilunio, & cū furorē homo corripitur, aut valde vociferatur, quo tēpore cerebrū increpescit, exhalationes per futuras vaporare possint, quod integro craneo, fieri non poterat, vtque venularum, & arteriarum ramuli, vitam, atque alimentum deferrentes, ad interiora cerebri permearent. Hinc consequens fit, in futuris, earumque ambitu, periculosiora multò esse vulnera, quàm capitis vlla parte, perindeque lethale, rasionem ibidem moliri, vt supra admonuimus, cum neruorum filamenta, quibus vtraque membrana colligatur, rasionē ipsa necessariò dilaceranda sint. Quod & Hipp. aperte sensu, sæpè citato. lib. De vulneribus capitis. Mendosæ reliquæ duæ futuræ, quæ ad interiora

Licet & iecur aliquando permutar lo cum in quibusdam animalibus.

Sotorarū vtilitas.

Vulnera periculosa in futuris, minus radenda os in eis est.

Mendosæ futuræ.

rora non penetrant, obidque tale nomen inditum illis fuit, scammiformes dicuntur, quod scammæ instar, laterali-
bus ossibus adhærescant. Ergo quinque hæ futuræ ossibus illis, ex quibus diximus constare caput, consistunt: Quo-
rum ossium primū coronale, dicitur, quod speciem coronæ referat. Prima ex veris futura, coronalis dicta, per os istud super verticem, ab aure vna ad alteram, ducitur: os ipsum cum alijs duobus laterali-
bus verticis ossibus (quæ ex recentiori-
bus nonnulli, parietalia, quasi paries, aut cerebri propugnacula sint nuncupaue-
re) connectens: Quæ quidem lateralia, seu parietalia ossa, alia futura ex veris, sagittali (quod sagittæ quoddammodo for-
mam referat sic dicta) consueunt: quæ, ab occipitij osse, per capitis verticem, secundum longitudinem, vsque ad coronariam protenditur. Hoc autem occi-
pitij os, tertiam veram transversalem su-
turam continet, lateralia, vel parietalia ossa cum occipitali colligans: ex cuius occipitalis ossis foramine quodam, spi-
nalis medulla motiuorum neruorum fons, à cerebro propagata, exoritur, per dor-
si vertebrarum, seu spondilium ossa exten-
ditur. Præter hæc, alia duo petrosa, scam-
mosa, seu mendosa ossa, per vtranque par-
tem, iuxta aures, laterali-
bus superponuntur ossibus. In his, aurium foramina consistunt: petrosa hæc ossa, propè tempo-
rum tenuissima ossa desinunt, vbi natura, quod tam gracilem locum, nobilissi-
mosque musculos, & nervos principes custodiret, durissima quædam ossa crea-
uit, ponticuli cuiusdam instar, vt in ipsa anatome videre est. Vltimò, basilare os subsequitur, hoc quidem, cerebri basis, & aliorum capitis ossium fulcrum est: duræ substantiæ à natura conditum: ne excrementorum assiduis stillicidijs, vel putresceret, vel plus æquo mollius redde-

retur. Crebra continet foramina, per quæ ipsa cerebri pituitosa excrementa excer-
nerentur. Et hæc de continentibus parti-
bus: quibus contentas, seu internas iam connectamus. Primò duas membranas: alteram craneo adhærentem validam: al-
teram ipsum cerebrum attingentem in-
firmiorem, quæ meninges dicuntur, quæ duæ tam contrariæ consistentiæ, non si-
ne magna prouidentia à natura creatæ sunt: dura nimirum, vt si capiti casus ali-
quis succederet, cerebrum defendere pos-
set: Tenuis verò, vt supra cerebrum im-
mediatè posita, inter ipsum, & duram men-
ingem media esset, ne sua duritie offen-
deretur. Ex tenui igitur membrana per-
venularum, & artiarum ramusculos ab illa propagatos, nutrimetur, ac vita ipsi cerebro ingeritur, dum tenuis membra-
na cerebri subintrat ventriculos. In mem-
branis his inflata vulnera, lethalia à Do-
ctoribus iure censentur, quauis nonnul-
los curauerim, & ab huiusmodi vulneri-
bus ad Dei gloriam, incolumes redditos viderim. Medullaris nunc substantia con-
sequitur. Est hæc alba, rotunda, plurima (proportione magnitudinis) quam in cæ-
teris animalibus. In tres partitur ventri-
culos: Anteriorem, qui maior, mollior atque humidior est, idque in gratiam sen-
situiorum neruorum, qui ab eo exoriun-
tur: Medium, qui minor, ac solidior: quod motuius neruis inde propagatis consule-
retur: Posteriores, qui mediocres. Ex istis singuli bipertiti sunt: vt tres, sex consti-
tuant, præter mammillares, quas dicunt, carunculas, solidioris substantiæ, mino-
risque albedinis, iuxta supercilia insitas, quæ olfactoriæ facultatis instrumenta sunt: Medius autem ventriculus socios suos complectitur, in quo locus quidam ob-
cavitatem lacuna à recentioribus dictus, reperitur: quem glandosæ caruncula re-
plet, spirituum, scilicet, respiramentum.

Contentæ partes.

Dura mem-
brana.Tenuis mē-
brana.Vulnera in-
flata mem-
branis letha-
lia.Substantia
medullaris.In tres diui-
sa ventri-
culos.Singuli ven-
triculi bipar-
titi sunt.Mammillares
carunculae.Lacuna lo-
cus vbi re-
peritur.

Continet

De Vulneribus capitis.

17

Ventriculo-
rum virtu-
tes.

Phantasia.

Imaginati-
ua.

Cogitativa,
& rationalis.

Seruatricis,
& memoria-
tia.

Retemirabi-
le.

Continet ventriculus hic in sui medio, foramen ad palatum, seu basillareos protensum, in anatome satis conspicuum, qua ventriculi huius medij excrementa mittuntur, quemadmodum anterioris, per nares. Hi autem ventriculi virtutes, seu potentias sex insitas habent: primus (in duplicem, vt iam docuimus penè diuisus) duas obtrinet, phantasia: qua, ab exterioribus sensibus primitus delata obiecta, concipiuntur. Quæ quidem potentia, à Philosophis simplicium apprehensio nuncupatur. De qua Aristot. intellexit libro. 3. de anima capitulo. 8. dum inquit: Nihil esse in intellectu, quod prius in sensu non fuerit, & imaginatiuam, in anteriori eiusdem ventriculi parte positâ, cuius muneris est obiectorum species, in phantasia primò conceptas cõponere, & quales sint, discernere, atq; diuidere. Quæ potentia simplicium cõpositio multis in locis ab Arist. dicitur. In medio vero ventriculo, dicto modo bipertito, binæ aliæ potentie includuntur, cogitativa inquam, & rationalis. Hæc totius microcosmi gubernatrix est: quâ nunc discursum, nunc ratiocinationem, nonnulli ex Physicis nuncupare: Sed in homine intellectus, in brutis æstimatiua, vel si mauis, instinctus, vel sagacitas naturalis appellatur. Posterior cerebri ventriculus, seruatricem, atq; rememoratiuam recondit: quibus proprium est, recepta cognita, atq; iam distributa conseruare, atq; memorari. Verùm sub cerebro, retiformis, ex tenuissimis duntaxat venulis siue arterijs, contextus, aut (quod vocant) rete mirabile collocatur. Admirandum profectò opus, atque opificis summam sapientiam ostendens, visum quidem præ sui tenuitate fallit, nisi diligentissime perquisieris, & intuearis. In hoc, elaboratione, & contra operantia quadam, quam vocant, cerebri re-

peraturâ frigidi, calidissimo cordi correspondentis, vitales spiritus in animales conuertuntur, vt Gal. libro. 9. de vsu partium testatur. Sunt tamen qui Galenum sic interpretantur, vt non omnimodam conuersionem, substantiali mutata forma, vitalis spiritus, fieri intellexerit: sed eo vsq; frigiditate cerebri vitalem spiritum temperari, vt animale, quod ad temperaturam pertinet similet. Namq; cerebrum frigidum, atq; humidam temperaturam, ab elementis comparatam sortitur. Quod nulli dubium vnquam fuit. Quare non malè hic sese offert interpretandus Guidonis nostri textus tracta. 1. capitulo. vniuersali anatomies: qui traditioni huic nostræ, imò etiam sibi ipsi contrarius videtur. Cerebrum, inquit, & frigidum, & humidum, & licet habeat substantiam medullosam, differt tamen à medulla: quoniam illa fit ab humoribus: cerebrum ab spermate: & dicitur calidum secundum naturam. 2. de partibus animalium. Hæc ille. Quibus verbis parum sibi cõstare videtur, cum principio, frigidum, & humidum cerebrum vocet, & ad finem, calidum. Sed vt difficultatem hanc clarius dissoluamus, præmittere oportet cerebri substantiâ, non propriè, sed largè, atque similitudinariè medullam dici, quòd craneum impleat, vt reliquæ medullæ sua ossa, iuxta Auerrois sententiam. 2. collectaneorum, seu colliget cap. de iuuamentis membrorum. Differt tamen non parum cerebri medulla, à reliquis aliorum ossium, & (vt nonnullas alias differentias omittam) quinque potissimum obseruo. Prima circa materialem causam ipsius versatur, quòd nempe cerebri medulla in generationis primordio à paterno semine: aliæ vero ab humoribus generantur, vt Gal. de compagine membrorum, & de natura humana tradit. Secunda, quòd ista frigida,

Galen. inter-
pretatur.

Guidonis
textus ambi-
gui declara-
tio.

Cerebri sub-
stantia, me-
dulla non pro-
priè, sed lar-
gè dicitur.

Quinq; dif-
ferentiæ in-
ter cerebri,
& aliorum
ossium me-
dullas.

gida, & humida, alia calida, iuxta Philo-
sophi traditionem. Secundo de partibus
animalium capit. 7. licet Guido supradic-
to capit. contrarium sentiat, affirmans,
medullam in genere sumptam frigidam
esse. Tertia quod ista, pinguedinis experts
est: alia pingues, ut ipsa anatomes indi-
cat. Quarta quod ista ad ignem coagula-
tur, alia liquefcunt. Ultima quod ista in-
cisa, seu deperdita, minimè instauratur:
alia instaurari possunt, ut Albucasis. 2. li-
bro. suæ operationis manualis. cap. 88. &
Guido tractatu. 3. cap. ultimo antiquorū
dogma secuti, docent, sed differre cere-
bri medullam ab his quæ reliquis ossibus
continentur, tradidere etiam Hippo. lib.
de carnibus, & Gal. lib. 2. de temperamē-
tis capite. 3. Ergo cerebri temperaturam
ostendēs Guido, frigidum, & humidum
esse, inquit, sed seiungi ab alijs medullis,
præter alia, quod illud à semine: reliquæ
verò ad humoribus ortum ducant. At
quod statim subdit auctoritate Philoso-
phi. 2. de partibus animalium cap. 7. scili-
cet, & dicitur calidum secundum natu-
ram, bifariam, meo iudicio, intelligi po-
terit: Aut cerebrum calidum esse secun-
dum naturam medullæ, in genere, & im-
propriè usurpatæ, quæ iuxta Philosophū
citato loco, calida est: cuius opinionem
refert Guido: quanuis ipse frigidam esse
eodem capite contendat: non quatenus
propria cerebri substantia est: hæc enim
frigida proculdubio ab Aristo. citato lo-
co, & à cæteris censetur: Aut secundum
naturam, non quidem ab elementis com-
paratam, sed iuxta naturam: aut influen-
tem temperiem, ex vitalium spirituum à
corde ad cerebrum ascendentium influ-
xu, partam. Sicq; ex accidenti, calidæ tem-
peraturæ dici poterit: quo modo, tempe-
rari poterit, Isaac ab omnibus refutata
sententia, existimantis, calidum esse cere-
brum, quem multis argumentis reprehē-

Declaratio
Guidonis.

Sententia-
fac repre-
henfa à con-
ciliatore sal-
uatur.

dit conciliator differentia. 24. Igitur Gui-
donis difficultas, ac repugnantia cessat.
Constanterq; fatendum, cerebro frigi-
dam & humidam inesse temperaturam.
Hæc breuissimè de capitis anatome scri-
benda duximus, eas capitis partes, eaq; so-
lùm perstringens, quæ ipsius, vulnerum
lucidiorum tractatum redderent. Cæte-
ra Anatomicas administrationes ex insti-
tuto plenissimè pertractantibus relinqui-
mus, petenda potissimum sunt à Gal. lib.
8. 9. 10. & 11. de vsu partiū, & lib. de ossi-
bus, librisq; de anat. administ.

C A P. II.

De causis Vulnerum capitis.



VLNERVM Capitis
causæ eadem quæ aliorum
vulnerum, sunt: nempe in-
cisis, perforatio, punctu-
ra, contusio, casus, morsus,
& quidquid aliud vnitatem soluere, vel
contundere aptum est.

C A P. III.

De capitis Vulnerum diuisione ne penes varias ipsorum causas, ac penes varia loca & varios vulnera- tionis modos.



VT Capitis vulnera varijs
modis euenire solent, ita
variā medēdi rationem
expostulant. Ergo ut com-
modam curationis metho-
dum nanciscamur, vulnerum differentiæ
proponendæ sunt, & tria quidem in vul-
neribus discrimen (quod ad curationem,
& ipsorum periculum, pertinet) consti-
tuunt: primum, telum: secundum, locus:
tertium, vulnerationis modus. De pri-
mo, aut capitis vulnera à telo incidente,
ut ense,

Telum, loc⁹
& vulnera-
tionis mod⁹
vulnera va-
ria efficiūt.

De Vulneribus capitis.

19

vt ense, gladio, & alijs id genus, vnitatem
scindere aptis, inferuntur, & tunc aut si-
ne substantiæ abolitione, aut cum ipsa:
Rursus, vel à pungente, vel perforante te-
lo, vt cuspide sicæ, sagittæ, alteriusve acu-
ti teli, aut à contundente telo illata sunt:
qualia erunt lapis, siue proiectus, siue in
quem caput impigit: lignum, ferrum, vel
plumbea glans à sclopetorum, seu alio
tormeto emissa. De secundo. Aut in sum-
mo capite vulnera consistunt, aut decli-
uioribus, seu lateralibus eius partibus. De
tertio. Vulnerationis siue fracturæ gene-
ra sunt Rhogmæ, id est, caluariæ fissio.
Ecype, id est, caluariæ excisio. Ecpiasma,
id est, effractio: engisoma, id est, corporū
appropinquo, siue fractura compri-
mens, adde fracturam pungentem: Cama-
rosus, id est, testudinatio, quando nimi-
rum vna tabella compressa, altera deue-
xa, seu incurua superest. Camurus enim.
Latinè curuus dicitur, Thlasis, id est, cōtu-
sio, & citra fracturam ossis inflexio, in fan-
tibus, & mulieribus, ob eorum capitum
molliciem, ac humiditatem magis fre-
quens: qualis plumbeis æneisq; vasis, si il-
lidantur, contingit. Ex his fracturis, quæ-
dam ad interiora vsq; penetrant: quædā
non penetrant. Quibus fracturarum dif-
ferentijs quidam apechema, id est à con-
trariâ ictus parte, caluariæ fracturam con-
nectunt, à quibus Paulus lib. 6. ca. 90. ma-
nifestè discedit, prædicta fracturarum di-
scrimina recensens. Nanque argumen-
tum à vitreis xaculis, quorum altera par-
te percussa, opposita frangitur, dissimi-
le proculdubio est, cum vitrea vascula te-
nuissima, vacua, & non nisi aere plena
sint: os autem caluariæ solidum, & crassif-
sima plenum substantia: Rursus, vitreum
vas continuum: os verò caluariæ conti-
guum, septem constans ossibus, futuris
quibusdam colligatis. Ex cuius ossium,
futurarumque compagine, illa inter a-

lias non leuis certè vtilitas promanuit,
vt si vnum ex cranei ossibus offendere-
tur, reliquis læsio communis non fieret.
Merum ergo commentum est, prædi-
ctam fracturæ speciem cū cæteris recēse-
re. Obijciat tamen aliquis nō abs re: Pau-
li sententiam aduersam videri Hippocra-
ti lib. de vulneribus capitis. & Celso lib.
8. cap. 4. Auicennæ Fen. 5. 4. tract. 3. cap. 1.
de fractura cranei, eiusq; interpreti Di-
no, asseuerantibus euenire, altera ossis
parte percussa, vt non eadem, sed altera
frangatur, Sed si rectè prædictorum ver-
ba consideres, nihil certè in illis quod
Paulum impugnet agnosces: solū enim
illud volunt, vna parte ossis icta, alteram
eiusdem ossis intra eandem futuram in-
terdum frangi, quæ fractura principio la-
tuit: non tamen vt in opposita vulnera-
tione ossis caluariæ parte, hoc est, toti ca-
piti aduersa, respondeat fractura. Vt si ni-
mirum coronale os ictum sit, occipitale
frangatur, aut contrā, quod plusquāmma-
nifestè ex ipso Cornelio loco citato con-
stat, dum inquit: Euenit etiam vt altera
parte fuerit ictus: os verò altera fiderit.
Idq; etiam Hippocratis verba aperte so-
nant. Sed quid respondebimus Florenti-
no Nicolo, qui sermone. 7. cap. de fractu-
ra cranei etiam atq; etiam affirmat: pro-
prijs oculis fracturam de qua agimus vi-
disse? Ego ei bifariam satisfacere: aut op-
vulnerato illi, de quo ipse meminit, præ-
ter apparēs vulnus, altera parte, verbi gra-
tia, in Sincipite illatum: altera, nempe in
occipite, aliud vulnus contusum sine ex-
terno sanguine, siue ab aduersario in-
ixa, siue lapsu factum fuit: Quod negle-
ctum, post aliquot dies intumens, & sup-
puratū, apertum, & in eo fractū os reper-
tū est: Nata inde occasione, vt Nicolus
arbitraretur eodem ictu duo illa vulne-
ra in oppositis capitis partibus contigif-
se. Aut secundo, quod tā vehementer cō-

Solutio.

Responsio
ad Nicolite
stimonium

Responsio
prima

Responsio
secunda

tūdi potuit fauciati illius caput, vt præter
fyncipitis conspicuū vulnus, obtritis futu-
rarū neruūculis, occipitalis sutura disru-
pta, tēporis tractu suborta ibi inflāmati-
one, & refectione facta, fracturæ ossis spe-
ciem retulerit, cum re vera fractura non
esset: quo errore deceptus Nicolus, affir-
mare potuit vidisse se, quod re vera non
erat. Nec mirari debemus errantem Ni-
colū, quādo ipse parens Hipp. a futuris se
deceptū memorię prodidit. lib. 5. de mor-
bis vulgaribus ad mediā ferē libri partē.

Aliud fracturæ genus euenit teste A-
uic. 5. 4. tract. 3. cap. 1. cum craneum nul-
lo externo apparente vulnere, frangitur.

Craneū frā-
gi potest ab
sq; vulnere
cutis.

Multoties, inquit ipse, frangitur craneū,
& nō finditur cutis: cuius ratio ea esse po-
test, q̄ cū os solidū, ac durum sit, magisq;
q̄ ipsa mollis caro resistat, vis maior ipsi
ossi infertur: a proportionē em̄ inæquali,
actio minimē producitur, & fortia agen-
tia passum debile ob improportionem,
contemunt. Hinc Philosophus. 3. Me-
teorologicorum. capit. 1. Quo circa, ait,
& quæ obfistunt quippiam pati solent,
quæ minimē, nihil: verbi causa, iam æs
quoscutum integebatur liquatū fuit: li-
gnum verò nihil sustinuit nam propter
ligni raritatem, prius spiritus percolatus
fuit, atque transmissus, quā vt lignum
affici vilo pacto quierit: p vestes quoq;
pari modo trāsiuit, quas non adfuit, sed
protriuuit. Hæc Arist. Alius etiā vulnera-
tionis modus est, dū integro craneo, inte-
rior noxa cōtingit, disrupta nimirū inter
ipsam cerebri membranā & craneum, ve-
nula aliqua. Tunc enim idē malū confur-
git, quod ex penetrātī fractura, illapso su-
pra mēbranā sanguine, euenire solet: vt
elegāter Cornel. lib. 8. cap. 4. tradidit, &
Dinus Florētinus in cōmēto supra Fen.

Alius mod⁹
vulneratio-
nis notabi-
lis.

5. 4. Auic. cap. de fractura cranei. Aliū ca-
sum huic adsimilē, nec minoris periculi
Scribit Razes, tū. 1. cōtinētis cap. 1. 0. 1. tum

etiā. 1. 5. cap. 1. 3. quē se vidisse testatur. E-
uenit hic casus magna ex parte infanti-
bus & mulierib⁹, ppter capitis maximā
mollitiem, atque humiditatem: nempe
quando ex ingenti casu sine exteriori
vulnere, & cranei fractura futurarum cō-
pago dehiscit, sanguine inde superdurā
cerebri meningē interiūs cadente, quod
& ipse mea tempestate vidi. De his om-
nibus suo loco sigillatim.

C A P. IIII.

De Vulnerum capitis pene-
trantium varijs signis.



Enetrantium vulnere ca-
pitis varia signa nūc conu-
meremur. Quæ si cognoue-
rimus, statim & non penetrā-
tia vulnere contraria ratione intelligen-
mus. Primū ergo indicium ab efficien-
ti causa, id est, a telo, vel re, qua illatū vul-
nus est, insurgit, vt quia ab ingenti telo,
vel casu, vt tradit Cornelius Celsus libr.
8. cap. 4. quem noster imitatur Guido tra-
ctatu. 3. capitu. de signis fracturæ cranei.
Sed huic indicio opponere possumus
Galenum. 4. Meth. cap. 4. contendentem
indicia non à procathartice, siue exter-
nis causis, sed potius à causa morbi essen-
tiæ indicatiua, petenda esse. Obiectio-
nem tamen hanc bifariam ego diluo: pri-
mū, quod licet propriē & per se verum
hoc sit, ex accidenti tamen, & mediātē
in hoc vulnerationis negotio, insigniter
exteriorum consideratio prodest, quate-
nus nimirum hanc vel illam qualitatem
vulneri, aut morbo imprimunt. Namq;
incidens telum incisum, contundens cō-
tusum, mordens morsuum aut veneno-
sum reddit. Aut secundo, quod Gal. non
esse curandas externas causas tunc dun-
taxat voluerit: quādo in propatulo mor-
bus est: secus tamen in ancipiti cranei fra-
ctura.

Varia indi-
cia vulnerū
capitis pene-
trantium.

Primū indi-
cium.


Obiectio.

Duplex so-
latio.


De Vulneribus capitis.

21


ctura. Cuius inuestigationem primitiua
causa non leuiter iuuat. Quare non absre
Auic. Fen. 5. 4. dicto cap. de fractura cra-
nei. Oporter, inquit, vt cōsideretur causa
fracturæ, & vltimatio virtutis rei frangē-
tis grauitate sua, aut magnitudine, aut in
sua fortitudine, & Cornelius loco citato.
Protinus, ait, considerandū est, lapide, an
ligno, an ferro, an alio teloperculū sit, &
hoc ipso leni, an aspero, mediocri, an va-
stiorē, vehementer, an leuiter. Sed & o-
porter perpendere, an ab agenti libero,
an impedito vulnus illatum fuerit, & per-
cutientis vires attendere, & ipsum telum
videre iubet Hipp. saepe citato libro. Præ-
stat etiam indicium, læsionis quantitas,
an, scilicet, magnum vulnus, aut ingens
contusio sit, vt docet Guido tract. 3. cita-
to capite de fractura cranei. Sed neq; hoc
perpetuum est: solum euim in incis vul-
neribus, & non in contusis, verum obti-
net, in quibus citra cranei fracturam ma-
gnū vulnus ferē nunquam contingit:
quia cum sphericæ figuræ caput sit, non
nisi in puncto tangi potest, si vulnus non
penetret, vt hæc indicat effigies.



A quo tamen ipse excipio, si ^{Caput obli-}
caput a natura oblongum, in ^{gum.}
quo citra cranei fracturam,
magnum vulnus non raro
contingit, vt eleganter docet
Hipp. citato lib. Quod in hac
effigie apertè videre est.



Et ipse cōpertum habeo ex
perimento, & in anatome i-
psa ostendimus. Excipe etiam
vulnus ab incuruo telo illatū,
quod proculdubio magnum,
seu oblongum citra ossis no-
xam fieri poterit: vt hæc indi-
cat effigies.



Si verò vulnus penetret, ex-
trema cum medio æquari ne-
cesse est, vt hæc etiam figura
demonstrat.

B 3

Disimile



Disimile euenit in telo contraria figura: quale in hac figura conspicitur: paruum nanque vulnus breue inquam, posset ad interiora penetrare.



Oblongum
vulnus in te
poribus.

In temporibus etiam oblongum vulnus non fracto craneo contingit cum planities quædam ibi sit, quæ huiusmodi vulnus facile admittit, ut hæc figura ostendit.



Et itidē per transversum magnum vulnus esse potest non penetrans in temporibus ut hæc pandit figura.



At in contusionibus etiam magnis, per exiguum vulnus exterius accidit, cum quo interdum ossa interiora franguntur, ut passim fieri videmus, unde indicium hoc, quod à quantitate, seu magnitudine vulneris sumitur, ut superius admonui, non semper verum est: imo absque ullo exteriori vulnere, calvaria os sæpe frangitur, quale in aliorum membrorum fractura euenire solet, ut Aunc. 4. tract. 3. cap. 1. docuit: cuius causa præcedenti capite à me tradita est. Ad hæc dolor ingens, & quod æger ad vulnerati locum manum frequenter apponit, & quod dum specillo cutem innittente,

In magnis
contusioni-
bus & cum
exiguo vul-
nere inter-
dum frangū-
tur. Ossa ca-
pitis

Signa fractu-
re calvarie
ex nervorum
tensione

locus

De Vulneribus capitis.

23

locus exploratur, extenuata cutis, & ab osse separata apparet, indicium fracturæ cranei præbet. Quod signum, à Guidone traditum, in confusa percussione absq; vulnere, sæpe verum experimento reperi: Cuius causa est, quia cum quid molle à solidioribus corporibus duobus, in medio positum comprimitur, (quale euenit in casu, & contusione,) vbi durum os interius, ac solidum telum exterius, mollem carnem contundunt, extenuari illud necesse est: sic cutis, qua parte telum magis incubuit, tenuior redditur, vt verissimile sit intrò fractum os esse, ex cuius fractura dolor ingens attollitur, qui egrotantem, manum capiti ad mouere cogit. Quod cum prudens chirurgus viderit, ad operationem properandum illi est. Sed addubitabit quispiam fortasse, qua ratione confectum os dolor sequatur: cum contrariam, illud suadeat, quòd os sensus expers, & terrena natura est, ductilibus nervis, per quos sensus defertur, carens. Respondendum tamen est, quòd licet os sine sensu sit, ipsæ tamen adiacentes partes fracto osse vehementer dolent: qui vehemens dolor, validissimæ percussio- nis, perindeq; contracti ossis argumen- tum est, fortis enim effectus fortem cau- sam arguit. Cæterum si fractura cum ex- terno vulnere contingat, specillo imme- diatè exploratur, quanuis eiusmodi ex- ploratio non certam penetrationem, sed ipsius teli duntaxat sedem indicet, quod Hipp. loco sæpe citato animaduertit, nisi eo vsq; ampla fractura sit, vt liberè ad in- teriora penetrare specillum possit.

Præterea si à retento spiritu, seu anhe- litu per ossis fissuram humor aliquis san- guineus, vel effluat, vel ægroto sufflante, manifestum indicium est intrò penetra- tionis. Verum aduerrere oportet, non semper prodeuntem per fissuram sangui- nem, arguere penetrationem, sed ita de-

mum si ab interioribus partibus mittra- tur, quod tunc coniectari licet, cum san- guis cum pulsatione exit: aliquando enim ex venulis intra vtranque tabellam con- tentis, sine hac pulsatione effluit, quem falsò arbitrantur imperiti chirurgi ab in- ternis promanare. A symptomatis etiam indicia à quæ percussio- nis tempore occurrunt: in- dicia non incerta colliguntur: illa sunt: apostima: scotomia: vocis amissio: vo- mitus: casus: oculorū caligo: & vulnerati oculis quasi varia lumina sese offerunt. Apostima quidem, meo iudicio, statim à percussione raro contingere potest: cum ex triplici morbo, nèpe ex vnitate solu- tionis, intèperie, & praua cōpositione i- psum consilari certum sit, quæ nisi contra- cta mora coniungi nequeunt. Quod apo- stima, cum egrotantem adoritur, non pe- netrationem tantum, sed membranarum cerebri læsionem, vitiatis nimirum, tum membri vnitate, tum eius temperatura, & naturali compositione, indicare solet. Scotomia, fracto iā prorsus craneo, sau- ciatus tentatur: ob oculos enim verti- cosa quædam, & rotalia circumagi tunc temporis videntur, & cum pedibus sau- ciatus se continere non valeat, concidit. Scotomia enim Græcè, vertigo interpre- tatur. Accidit hæc ob vapores ad oculos, & caput percussio- nis tempore conscen- dentes: qui visorij spiritibus commixti, imaginatiuam potentiam corrumpunt. Loquelæ, seu vocis amissio cranei fractu ram penetratè sapius comitatur. Quia cum articulata vox ex voluntario quo- dam motu conflat: vt Gal. lib. de moti- bus liquidis testatur, cuius principium ce- rebrum est, & hic reuersiuis, seu vocali- bus nervis ducatur, compatiens cere- bro, ipsiq; reuersiuis nervis propagatis ab illo, valida percussione, vocis iacturā fieri uecessè est, cum munus suum nervi obire non possint. Vocis autem amissio

Quando vocis aris: non semper fracturam cranei portendit:
in craneum fractus interdum enim citra fracturam ob ca-
non ostendit.

Vomitus.

Vomitus cranei fissuram penetrantem
consequitur, propter cerebri cum ventri-
culi ore confensum, atq; connexionem:
In quē ventriculū, definit quædā insignis
nervorum coniugatio à cerebro deriva-
ta, ex anatome satis cōspicua: quō fit, ut in
ingenti capitis percussione ventriculus
imbecillus reddatur, & biliosus succos à
capite, & alijs membris ad se demissos,
continere nequeat, sed euomat. Cui senten-
tientiæ Hipp. Aphorismorum. 6. Aphor.
50. & Galibi, & 3. de locis affectis cap. 5.

percutsa, aut verius æneo filo identidem percusso, exploratur. Neque enim si fractum os sit, sonitum vulneratus sustinet, quin potius dentibus studet. Attramentum, & mastichis linimento cranei fracturæ explorari solet. Nanque si dum os raditur, attramentum suffusum interius penetret, & penetrare fracturam necessarium forebimur. Contrario vero contrarium. Idem erit, si pulueris mastichis, cum candido oui, linimentum, linteolo apparenti fracturæ applicetur, & ad sequentem diem dimissum, parte fracturæ correspondenti ficiis quam cæteris partibus appareat, nam spiritus, & genuinum calorem per fracturam exhalatos, linimentum exsicasse significabit: hoc tamen linimento curationis principio, pure nondum genito, vtendum erit: nam post pus confectum, quod linimentum totum ma defaceret, imo obrueret, neq; exsicari p mitteret, nullum certè indicium suppeditaret. Hoc tamen signum ad apparentem fracturam, de cuius penetratione addubitamus, pertinet: non autem ad occultam, vt alia signa. Sed de hoc alibi latius.

CAP. V.

De signis vulneratarum cerebri membranarum.



Roximum est, vt de signis
que vulneratas cerebri mem-
branas esse, arguunt, disera-
mus. Primum, dolor & Scom-
mentius quam in fola cranei
stant. Facies, & oculi rubet,
pustulis obducitur, idq; ob-
sistit in cerebro, aut eius mem-
bratur, vel ob musculorum fa-
uaria consensum, & conne-
ad gulam, & pectoris par-

Quomodo :
exploretur :
cranei fra-
ctura.

notas sobre
experimenta-
ção de
finito.

Quo tempore
re utendum
sit linimen-
to ad fractu-
ra explorat-
tionem.

Signa vulne-
ratarum ce-
rebrum mem-
brarum.

Dolor , &
Stomatia.
Facies, & o-
culorum ru-
bor & faciei
pustulæ.

chondula
 nom. periphrastice
 unum et multum chor:
 chor dentibus munitus
 chor sensa, e manu Byssini
 chor manu tangit chorda
 somn edat, quem somn minime
 componit videretur, q si chorda
 quid linea artius multo
 200.

De Vulneribus capitis.

25

tes, atque respirationis instrumēta mem-
branarū cerebri, ac nervorum qui ab illo
propagantur, cōmunicato nōcumento.
Vnde consequitur anhelitus adeò fre-
quens, & malignus, ut respirationis anxie-
tate facies, & rubeat, & pulsus scateat.

Oculorum
eminētia,
& obscura-
tio.

Oculi etiam præter ruborem eminēt, &
obscurātur, rōne, scilicet, communionis,
quā mēbranæ oculos cōstituētēs, cum cere-
bri mēbranis habēt. Cōiūctiua eīm oculi
mēbrana, ex perioſteo, cornea ex dura ce-
rebri meninge, vtea ex tenui, ex nervo
aut optico aranea tunica, ortum habent.

Profluxio
sanguinis.

Sāguis ad exteriora per os, per nares, aut
per aures profluit, ut periculo ipsi vidi-
mus in vulnerato quodam cum fractura
penetrante, & duræ cerebri mēbranæ in-
cisione. Non solum enim ille sanguinē,
sed saniem, & muliebre lac supra vulnus
emulsum per aures emittebat. Sed & ce-
rebri lædūtur potentiæ, fit sauciatus, stu-
pidus, ac veluti expauescens, redditurq;
immobilis, ob cerebri, scilicet, noxam, à
quo nervi (per quos particulis omnibus
sensorijs, atque motuius sensus, & motus
impartitur) originē ducunt. Vnde Hipp.

Potentiarū
cerebri læ-
sio

Febris, & quā
lethalis.

7. Aph. 14. In capitis, inquit, ictu stupeſcē-
tia, & desipientia, malū. Febricitat æger,
propter humorū, & spirituiū maximam
commotionē: qui, cum incens, ad cor, ge-
nuini caloris sedem, tendant, consequen-
ter & ipsum cor flagrat, & inde totū cor-
pus. Verūm si rigores febrem non præ-
cesserint, non perinde lethalis illa cēsen-
da est, ac si cerebri, & inordinati rigores
præcessissent. Conuulsionem enim mi-
nantur. Nec solum rigores conuulsionis
signa sunt, sed olcitationes, & membro-
rum exporrectiones, si creberrimæ fue-
rint: Sunt enim rigoriū species. Arguunt
rigores materiam super cerebri membra-
nas consistentem: quam dum natura ex-
pellere nititur, rigor, aut tremor excita-
tur: quibus febricula commiscetur. Vn-

de Hippocrat. Aphorif. 4. Aphorism. 46.

Si rigor, inquit, inciderit febre non defi-
ciente, iam debili existente virtute, letha-
le. Riger sauciatus, id est ceruices, & ma-
xillæ illi tenduntur. Quod symptoma
ex Celsi libr. 8. capit. 4. traditione, ex ip-

Rigor cer-
uicis, & ma-
xillarum si
accidat vul-
neratis, le-
thalis cenſe-
tur.

saque praxi, moriferum censetur, præ-
sertim si non inter initia, sed temporis
tractu, infestet. Vigiliæ vexant: quarum

Vigiliæ.

ea causa est, quod cum somnus in cere-
bro concilietur, idque læsum fit, aut vi-
gilare, aut malè dormire infirmus cogi-
tur. Cibus fastidit, nausæat, & euomit,
ventriculi, scilicet imbecillitate, quem
sensorius princeps nervus cum cerebro
colligat. Nam si solo fracto craneo vo-
mitus excitatur, multò magis cerebri in-
cisis membranarum. Eueniunt hæc potissi-
mum, cum vulnus anteriori capitis par-
te consistit: ex ea enim prædictus ner-
uus deriuatur: quo fit, ut in occipitali
vulnere, symptomata hæc non identi-
dem assurgant. Male excrementa emit-
tit, & lotium reddit: vel ob febrilem ca-
lorem, expellendas humiditates exci-
cantem, naturalibusque operationibus
nocentem: vel ob materierum, & va-
porum ad vulneratam caluariam, ra-
ptum: vel quod mentis alienatione vul-
neratus lotij reddendi, excrementorum
que obliuiscitur, ut inquit Auicēn. Fen.

Cibi fasti-
dium, nau-
sæa, & vom-
itus.

Excremen-
torum, & va-
rinæ diffu-
cultas.

prima. tertij. tract. 3. capi. 1. de charabito,
vel expultricis virtutis vesicæ, & sedis,
musculorum, & ac nervorum imbecillita-
te, quæ à cerebri nervorū consensu, com-
pathia, vel media affinitate nascitur, aut
propter nervorum musculorum illarum
partium conuulsionem: aut conuulsioni
proximam dispositionem: quæ in cau-
sa est, ne excrementa, & vrina, aut mini-
mè, aut malè reddantur. Plurima ex fi-
gnis istis ex Guid. tract. 3. ca. De notis in-
cisionis mēbranarū cerebri, atq; ex alijs
authoribus collegimus, præter quæ, lon-

ga experientia alia nobis suppeditarunt, qualia sunt, luctuosa suspiria. Vnde Hippocra. Aphorif. 6. Apho. 54. In acutis, ait, passionibus, quæ cum febre sunt, luctuosa suspiria malum. Nascuntur hæc ab aliqua musculorum pectoris quasi cōuulsiua dispositione, vt ex Gal. in eius loci cōmē. constat.) Alterius etiā oculi lippitudo, vel obsecena, atq; crassior lachrymula, & lucis intolerantia oboriri solent, vt Auicē. i. tertij. capit. 2. probat.

C A P. V I.

De Notis incisæ cerebri medullæ.

Incisæ cerebri medullæ, notæ.



Cerebri medulla ex quibus desphenatur incisæ esse.

Chirurgorum quorundam error, aut fraus.

V C pertinent incisæ cerebri medullæ, notæ. Quarum prima est ipsius medullæ exitus. Agnosces cerebri esse medullam, cum crassam globosam, nec saniosam prodeūtem substantiam conspexeris, vt ipse Guido citato loco inquit. Non saniosam, dixit, vt errorem, aut fraudem chirurgorum quorundam detegeret. Quippe qui cum sanies, vel interiūs contenta humiditas, ex illapso ad interiora per rimulam sanguine; cōfecta, ibidemque genuino calore concreta, exteriūs prodit, medullarem cerebri esse substantiam, aut credunt, aut fingunt: idque apud vulgus magis clamoribus testantur, & me puero, insigne certè scelus circa hoc commisit chirurgus quidam, qui ad curandum vulneratum ex magna, ac penetranti fractura accersitus, panis pramanfam medullam vulnere applicauit, & cum ad secundam curationem accederet. Ecce, puri panem commixtum cerebri medullam referentem; astantibus, multis vocibus ostendit, medullarem cerebri affirmans

esse substantiam. Quod postea cum eger ad sanitatē reduceretur, tanq̃ grande miraculū habitū est, & chirurgus ille alter Apollo deinceps credebatur. Sed quò fallaciæ huiusmodi pateant, ad ignem in tegula exploranda substantia est. Si enim cerebri sit vera medulla, coagulabitur: si pramanfus panis, exsiccabitur: si concreta sanies, liquecet, ac tandem consumetur. Sed & veram esse cerebri medullam, quæ prodijt, lethaliora significant symptomata, nempe morbus comitialis, & illa quòrum suprà meminimus. Euenit etiam aliquando, vt mammillares carunculae, quas mammillares additiones, quòd mammillares papillas simulant, vocant, inter supercilia consistentes, de quibus in Anatome dictum est, ex penetranti vulnere, foras citra vitæ periculum egrediantur: quas cum astantes, & ipsi chirurgi parū exercitati conspiciunt, statim medullarem esse cerebri substantiam arbitrantur, eo decepti, quòd quodammodo caruncula ipsam substantiam referunt. Quem errorem facile præcauebis, si obseruaueris inter vtranque substantiam non obscuras differentias. Nanque sunt carunculae, non adeò albæ multò folidiores, & præter hoc, inter supercilia situm obtinent. Aliud indicium à Guidone notatur, quòd si in anterioribus partibus læsio est, ratio amittitur: si in posterioribus, memoria.

S E D quæret aliquis, cum potentia rationis in medio capitis ventriculo, nec in anteriori, domicilium habeat, vt in anatome diximus, cur læsa anteriori parte, ratio amittatur, vbi potius sensus communis ~~est~~ imaginatio destrui debuisset. Cui ego respondebo, cum anterior pars offenditur, non immediatè rationis fieri iacturam, sed per illam ipsi medio ventriculo, quò ratio sita est, cōmunicato damno. Aut dicere poteris, medium ventriculum,

Chirurgi eundem doctus.

Cerebri medulla quomodo exploratur.

Mammillares carunculae extravulnus interdū prodeuntes in quibus à cerebri substantia differant.

Aliud indicium.

Responsio duplex.

27

Aliud indi-
cium incisæ
cerebri me-
dullæ.

CAP. VII.

De notis inflammationis, quæ
cerebro, aut eius membra-
nis vulneratis superue-
nire solent, de quæ eius
causis.

Quot mo-
dis contin-
gat cerebra
membranas
inflāmari.

Internæ
causæ.

Aduerte for-
licem vel in-
foelicem euen-
tum vulne-
ratorum ex
infixo co-
lecti in castra
prouenire.

Ex

arcti

arcta super imposta verum si propter frigus: calfacientibus medicamentis actu atque potentia in capite, collo, atque ceruice vtendum mollissima lana æsiipi super inuoluta: quorum narratio in antidotario latius dicitur, si autem ob malam vitæ rationem, ad optimam reducat. Si verò inflammationis causæ occultæ, vel humorales, vt plectora, vel cacochimia sanguinis missione, vel alui solutione eidem subueniendum est. Cæterum si olei vel aliorum medicamentorum mollificantium vsus plus iusto in causa sit auferenda statim sunt, atque abstergentibus vtendum. Si verò ex cœlesti infelici influxu, per quàm difficile, vel pene impossibile est huic malo subuenire.

Signa calidapostematis, quod à cerebro aut eius: membranis superuenit.

Membrana rû inflatio.

Membrana rû fungiformis prominetis & quæ ratione ei succuratur.

Anice, locus restituitur.

Anice, locus restituitur.

Anice, locus restituitur.

Anice, locus restituitur.

Anice, locus restituitur.

Indicia igitur quibus huiusmodi inflammatio dignosci possit hæc sunt. Primum à tumore sumitur: inflantur enim membranæ ob calidam materiã, omnes membranarum partes distendentem. Secundum verò signum vel indicium probent ipsæ eadẽ ratione prominentes membranæ: solent enim adeo intumescere, vt siue per cranei amplam rimam, siue per terebrationẽ factam, prodeuntes, totum vulnus replcant, ad cutem vsq; delapsæ: quem membranarum exitum fungalem eminentiam, quod fungos tunc temporis simulent membranæ, medici nuncupauere: vt ex Auic. 5. 4. tracta. 3. cap. de fractura cranei constat. In quo aduertito frustratem pro Alphuturati, hoc est, fungo interpretis errore legi idque ex ipso Auicena prima. tertij tracta. 4. capit. ultimo. satis colligitur, atq; ex sententia Rasis decimo quinto continentis, aliorumque recentiorum, hinc Dini Florentini in Auicena Commentario errorem notabis, qui frustratem, idem quod frustra esse falso arbitratus est: quasi frustra in curando huiusmodi vulnerato medicus laboret. Et ipse mea tempestate in vulnera-

to puero huiusmodi fungiformem prominentiam vidi: quæ in eam magnitudinem creuerat, vt alijs nullam opem afferentibus bis, terque eam coactus rescauerim, & Alchimiistarum aqua adusse rim, quod alias satis fuisset absurdum velut longo iam experimento, ac maturiori consilio atque ætate, nil huic malo vtilius esse reperi, quàm cranei fracturam amplificare: sic enim cranei fissuræ angustijs vindicata, membranæ deturgent, neque ita foras prorumpunt. Quare non inconcinne hic textus Rasis decimo quinto continentis, difficilis quidem declarandus sese offert. Quoties (inquit) frangitur os capitis, si incipit panniculus indutus super cerebrum in aliquo pati apostima vitium sit in eo quod medici appellant fatra, siue Alphuturati, id est, fungum, videlicet quod eleuatur ad superiora, & intumescit donec egreditur in modum fungi terrestris per craneum disruptum, vel perforatum: & subdit, quod si coarctatur talis panniculus à Chirurgo accidit laboranti defectus sensus, & motus, dico tamen illud vitium erit instabile nisi perforetur panniculus, & rumpatur. Hæc ille. Sed discrucari solent Chirurgi in intelligendis verbis illis scilicet. Vitium illud erit instabile. Quæ ego bifariam interpretor, aut quod non stabile erit vitium illud eminentiæ fungiformis, hoc est non permanens si vulnerata non fuit dura cerebri membrana: euaporabit enim contenta materies, & deprimetur panniculus. Sed si rupta membrana fuerit, periculum imminet quod dum materia cerebri pertigerit conuulsio, atque inde mors sequatur. Aut contrario, videlicet, quod erit instabile vitium illud, id est, instabit ad mortem, nisi perforetur panniculus, hoc est fungiformis illa caruncula super cerebri membrana ad na-

Casus notandus.

Rasis locus interpretatur.

ta, per-

De Vulneribus capitis.

29

ta: perforatur autē, vt nonnunquā feci
subtili scalpello crebris factis scissuris.

Membrana
rum cerebri
rubor & im
mobilitas.

Rubent etiam nec mouentur cerebri
membranæ: ruboris causa est praua cali-
da tēperatura à malis calidis succis crea-
ta ex quibus vapores ad superiora ascen-
dere aptiores nascuntur. Immobilitatis
autem membranarū inflāmatio & con-
uulsio causa sunt: quæ cum mēbranas ten-
nent ac replent naturalis motus necessa-
riò impeditur: qui constrictione & dilata-
tione aere ore à naribus attracto, atq; ad
caput conscendente conflari solet, deter-
rima hæc symptomata esse solent quāuis
ad Dei gloriā vulneratos nōnullos, quos
talita vexabant, nostra curatione incolum-
es redditos viderim etiam per quindecim
dies membranarum motu deficiente
liuescenteq; dura cerebri membrana.

CAP. VIII.

De notis humiditatis prola-
psæ super cerebri mem-
branam, eamque gra-
uantis.

Illapsæ hu-
miditatis su-
pra cerebri
membranā
notæ.



QV AE membranarū cerebri
incisionē signa arguere dixi-
mus: eadem materiā supra
membranam delapsam esse
coarguunt. Si post vulnerationis initia
paulatim veniant. Signa tñ hæc membra-
narum incisionem non necessariò expo-
stulant nanque si puncta vel aliquo osse
compressa membrana est materiei per ri-
mulas delapsam etiam prædictum, sed
nec sensum, nec post vulnerationis prin-
cipium symptomata illa semper pro ri-
tantur. Si enim ampla fractura sit mul-
tusque consequenter sanguis intrò ceci-
derit, è vestigio irruunt, sæuiuntq; neq;

villas præbere solent inducias. Quare re-
gula hæc quæ à Guido. traditur instricta
fractura accipienda est. De qua intelligi
non ineptè poterunt Hippocr. verbalib.
De vulneribus capitis, dum ait, Mala vul-
nerum capitis non statim patēr. Quibus
Dinus, Nicholus atque alij subscripsere.
Et sæpè post decimumquartum, & inter-
dum post vigesimum primum diem, eue-
nire symptomata illa vidimus. Sed & in-
tegro, ac illæso craneo, non semel prædi-
cta horrenda symptomata concitantur.
Quando nimirum ex ingenti percussio-
ne, aut casu, venulæ quædam subter cra-
neo dirumpuntur, ex quibus sanguis sen-
sim instillatur, coaceruatur, atque in pus
conuertitur. Post temporis enim inter-
capedinē sæuiunt mala illa, non sine cer-
to vulnerati dispendio, vt plus satis expe-
rientia docet. Et Cornel. libr. 8. c. 4. alijq;
recentiores, eius secuti vestigia, testātur.

Prædicta
symptomata
integra
ac illæsa
craneo quando
cōcitantur.

Qua in re, tria scitu digna mea tempesta
te notavi. Primum, vel nullos, vel raros,
ex huiusmodi fauciatas præsertim in capi-
tis vertice, quos dicta inuaserunt sympto-
mata euasisse, quāuis perforato osse exiis-
set pus, duobus, aut tribus, in caluariæ la-
teralibus ossibus, vulneratis exceptis, qui
bus hyemali tempore coactè sera ossis
apertione, Deo duce, subuenimus. Præ-
ter quos alium etiam curasse memini, ad
motu post. 14. diem perforatione, ex qua
non modicū puris prodijt, & ad Dei glo-
riam, sanatus est: etsi illum sæua distorsif-
sent symptomata, & mensis esset Maius.
Secundum, quod vbi sub tenui meninge
venulæ rumpuntur, sicque coaceruata sa-
nies est, parum, aut nihil interest craneū
aperiamus, aut non: hibernum, aut vernū
tempus sit, cum vtroque casu, certissima
mors speretur. Tertiū, symptomata quæ
craneo integro ex interna noxa concitan-
tantur hyemali potissimū tempore, non
nisi. 14. & quandoque. 21. die irruere.

Tria notata
digna.
Primum.

Secundum.

Tertium.

CAP.

Dicta sym-
ptomata
quo tempo-
re assurgāt.

CAP. IX.

De iudicijs, seu præfagijs in
Capitis vulneribus, tam
ex ipsis quàm ex sym-
ptomatis.

Capitis vul-
nerum varia
præfagia.
Iudicium à
cranei fra-
ctura.



ARIA sunt vulnerum ca-
pitis præfagia, ex quibus
indicationem fumere li-
cet, vulnerati vitæ, spes, an-
certa desperatio sit. Et pri-

mò, cranei penetrans fractura periculo-
sa ab omnibus censetur, propter sangui-
nem, scilicet, qui super cerebri membra-
nam illapsus interius putrescit. Vnde le-
thalia proritantur symptomata. Incisio
membranarum cerebri, maximè ipsius me-
dullaris substantiæ, & corrosio, ac læsio,
lethalis, iuxta Hipp. 6. Aph. 18. nisi parua
fuerit, vt ibidem interpretatur Gal. Sed
etsi ferè semper lethalis incisio cerebri
censeatur, memini tamen in Abulensi ci-
uitate me degentem, puerum oppidi Bla-
sco Helez curasse, cui lancea percussio,
non modicum medullaris substantiæ exi-
uit, & cum de eius vita millies desperas-
sem, tandem Dei nutu sanatus est. Simi-
lis casus contigit Gal. vt ipse in Commé.
dicti Aphorismi narrat, & libr. 8. de vsu
partium cap. 10. Nam in morbis, quæ ad-
modum in natura, nonnulla monstruosa eue-
niunt, vt ait Auerroes. 7. colliget. Febris
acuta periculosa valde, sed ea præsertim,
quæ elapso vulnerationis principio, circi-
ter septimum diem crebris, atque inor-
dinatis rigoribus, nunquam intermissa
molestat. Nanque præfagire solet, vel in-
ternum aliquod nocumentum inflam-
mationis cerebri, aut eius membrana-
rum, vel illapsæ, vel interius genitæ ma-
teriæ, quam dum natura, vt nocentem
rem, expellere conatur, rigore, ac inter-
dum tremores ciet, & simul nausea, at-

Incisio mè-
branarum ce-
rebri, & me-
dullaris sub-
stantiæ.

Casus admi-
randus.

Casus q con-
tingit Galeo.

In morbis,
vt in natura
monstruosa e-
ueniunt.
Febris acu-
ta in vulne-
ribus capi-
tis quædole-
thalis.

que vomitus nascuntur, ipseque vulnera-
tus indies in deterius vergit, vel quam-
piam aliam noxam significat. Verum fe-
bris in vulneribus non itidem malum præ-
fagire solet, quando ab alijs causis inter-
initia originem trahit: vt si infestet do-
lor, & tristitia ex quibus prouenit spiri-
tuum, & totius corporis agitatio, & hinc
febris, interdum diaria: Aut ratione con-
fectionis puris in vulnere, quia Hippocr.
Aphorismus ille. 2. Aphorismorum. 47.
Dum pus conficitur dolores accidunt, ma-
gis quàm iam confecto, non in inflam-
mationibus solum, sed & in vulneribus
locum habet. Aut quia à procathartica,
seu externa causa conflatur, quæ antee-
dentem internam sæpè concitat, vt A-
uic. 1. 4. tract. 1. cap. 5. de diarijs febribus,
nec non Guido multis in locis sensere.
Humor namque corporis superabundans,
& etiam in parturienti, vt docet Auic. 2.
1. doctri. 1. cap. 5. qui alias quiescebat, vul-
neratione commouetur, & febrem gignit
sanguineam assiduam, si sanguis redun-
dauerit: tertianam intermittentem si bi-
lis flaua cum siti, & oris amaritudine: quo-
tidianam cum rigore, spirituita. Aut denique
comparatur febris ab externa capitis inflam-
matione, sanguinea, aut biliosa, vel mix-
ta. Quod manifestè ex tumore, & loci ru-
bore cognoscitur. In febribus his non lethalia
libus, intermissiones accidunt, nec inordi-
natis rigoribus æger discruciat. Vulne-
ris color hilaris est, labia tument, sanies
laudabilis non deficit, mens constat, vom-
itus cessant. Adhæc inter initia febricitare,
nullo alio symptomate apparente, bo-
num signum apud omnes perhibetur, & vul-
gare solet esse verbum, sed quod ab ipso
Hipp. originè ducit. 2. prædictionum post
mediū, non quod ipsa febris vlllo tpe salu-
bris sit, sed respectu eius quæ quarta, aut
septima, aut vndecima die incipit. Quæ
esse lethalem testatur Hipp. dicto loco.

Denique

Febris non le-
thalis signa.

De Vulneribus capitis.

31

Deniq; si bona victus ratione, sanguinis missione, & alui solutione febris sensum remittatur, indicium est, ab aliqua ex prædictis externis causis, non ab interno nocu-
mêto prouenisse. Ne aut in prædicendo decipiaris, illa pereuntium sunt minime fallentia signa, ex Hippocr. sententia libr.

Pereuntium
ex vulnere
non fallentia
signa.

Pos visco-
sum.

Vulnerum
marcescen-
tes, & exte-
nuatæ oræ.

Os varium
assumit co-
lorem.

Sab lingua
bullæ, & pu-
stulæ.
Maxillæræ,
& ceruicæ
rigor cū bi-
lioso vomitu.
A Egroratis
ingetudo.

Prædicta
symptoma-
ta non om-
nia simul in-
vadunt, sed
nunc hæc,
nunc illa.

Aduersio.

De vulneribus capitis collecta, atque longa experientia comparata. Pus viscosum, veneti interdum coloris, interdumq; veluti salfamentum. Vlcera oræ, & marcescunt, & extenuantur, exuta exterius, ac interiorius infarta humiditate. Salitæ carnis colorem referunt, atque interdum liuidum, quod in ægrotante offe, malum ab ipso Hipp. 7. Apho. 2. censetur. Os alium assumit colorem, eo iam corrumpi incipiente. Fit enim nigrum, postea pallidum, aut valde album. Caliditas enim agens inhumidum, denigrat, consumpta verò iam ossis humiditate, ipsum dealbat, ex Auic. 1. 1. doctr. 4. cap. 1. & 2. 1. tracta. 20. capit. 3. Subter lingua bullæ, pustulæque nonnunquam suscitantur. Glandulæ in collo nascuntur. Maxillarum, & ceruicæ adestrigor, ac simul biliosus vomitus: huc illuc diuagatur æger, villos ex stragulis inaniter apprehendere intendit. Quæ symptomata ex Auic. constant. 1. 3. cap. de charabito, & cap. de phlegmone accidente substantiæ cerebri, ac tandem desipiendo perit æger, ut inquit Hipp. loco citato. Porro symptomata hæc non omnia simul perituros vulneratos inuadere solent, sed nunc hæc, nunc illa, & nonnullos iam perijisse vidi cum solis oscitationibus, ac membrorum ex porrectionibus. Verum circa ceruicæ rigorem, tensionem & glandulas illic obortas, sedulo aduertito: si reliqua deteriora signa deficient, lethale id indicium non esse arbitrandum, vulnere videlicet in capitis laterilibus partibus inflicto. Quod auribus, vel collo correspondeat. Nam ea directione, &

propinquitate sit, ut materiæ ad ea spongiformia loca à dolore trahantur, illicq; infarta in glandulas conuertantur. Consensum id est Galeni doctrinam. 1. 3. Meth. cap. 5. in quo nobis hæc condētib; non vulgares Medicos, atque chirurgos deceptos Segouiz vidimus, in cuiusdam nobilis viri vulnerati curatione. Credebant enim ceruicis tensionem, & glandulas, conuulsionem ominari: & cum eo errore ducti, nullis alijs obortis symptomatis, perforationem ossis, qua procul dubio egere ægrotantem contēdebant, parassent, ea à me prætermissa, auxiliante Deo, illum curauimus, & sanatus est, quæ uis de eius vita ceteri desperassent. Conuulsio vulneratum corripit, cuius causa cerebrum est, immediata, scilicet, secundum medicorum placita, neruorum origo, à quo sensoria, atq; motiua virtus mediantibus musculis, & lacertis, proficiunt. Nam dum malè affectum cerebrum nocumentum à se pellere conatur, contrahitur, secumq; consensu quodam, neruos, ac lacertos cōtrahit, & conuulsio fit: quæ nihil aliud est quàm prædicta neruorum versus suum principium contractio. Hæc enim siue ad materiam non proportionata, siue compassiua, siue proportionata, siue ex repletionem, siue ex inanitionem fit, lethalis ab Hipp. Apho. 5. Aphor. 2. perhibetur, dum inquit: conuulsio ex vulnere lethalis, sed iam ad Dei gloriam, eiusque Sacratissimæ matris, duos pueros curavi in lateribus capitis vulneratos, qui cōuulsi euaserunt, ex his, alter per quinquaginta dierum spatium, octauo quoq; die comitialis morbi symptomatis sensus, & motus expers, periodicè corripiebatur, cui, tunc, ex naribus haud parum puris effluebat, & statim ad se redibat: tandem sine vomica, aut fistula superflite, sanatus est. Istius salutem his ego tribuebam, quod à retenta sanie co-

Casus q Segouiz con-
tigit:

Conuulsio

Casus nota-
bilis.

nie co-

nie comitialis ille morbus procedebat. Quæ per narium instillatoria aptissime expellebatur, sicque à causa separatu facili, lethalis autem conuulsio non itidem. Quod vulneris lateralis, & proclivis situs erat, nempe inter supercilia, cerebro inde minus molestato, quoddamque vulnus eo loco consistebat: quo verè cerebrum non est, sed mamillares potius caruncule: ut anatome manifestè demonstrat. Neque his præfatus Hippocratis Aphorismus obest, qui de cõfirmata conuulsione ex inanitione intelligendus est.

Declaratur
duo Apho-
rismi Hip-
pocratis.

Inter super-
cilia sinema-
nente fistu-
la cararivol-
nus difficil-
limum.

Nec alter Aphorismus. 42. 2. Sectionis. qui ait. Soluere morbum, quem apoplexiam vocant fortem, impossibile: debilem verò non facile: cum impossibilitas ibi pro magna difficultate, ut sæpe à Galeno in Commentarijs declaratur, vsurpetur. Notavi prædictum puerum sine vomica, aut fistula euasisse, ut rem novam, aut per quam difficilem, ut ex Cornelio libr. 8. capi. 4. Satis constat. Quod si incidit, inquit, inpergenda scamma æris est, ut id reprimat, cohibeatque, ea carni superdando, quæ ad cicatricem perducant, omnibusque ea commodè inducitur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super, id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, ut per omnem ætatem sit exulceratio: quæ lintheolo medicamentum habente contegenda sit. Hæc Cornelius. Causa autem cur inter supercilia vulnerato, fistula ferè semper manet, loci cavitatis est, quæ generandæ carni inepta censetur opus enim habet producenda caro solido fundamento. Adde excrementa ipsius cerebri, ipsumque aerem per narium duci canalem, magnum scilicet, consolidationis impedimētum. Accedit varius, & reuolutus musculorū loci illius inaccessus, qui quā in parte reperitur: difficillimam vulneris glutinationem reddit. Est etiam deterrimum aliud

symptoma commune quidem & capitis & neruorum vulneribus, ex quo prædictio non obscura sumitur, sudores nempe vulneratum inter febriendum instantes. Nam sæpe conuulsionem minari solent. Quod præter assiduum experimentū, ex Galeno colligi potest in commento libri. 1. Hippocrat. de morbis vulgaribus Commento. 2. §. Sudores multi. &c. Et ex Auic. 2. 3. tracta. 1. capi. 6. & 4. 1. tract. cap. 20. Indicant enim ut Gal. aduertit, corporis humiditates conuulsioni vi, veluti torculari quodam exprimi.

Sudores in-
ter febrien-
dum venien-
tes conuul-
sionem mi-
nantur.

Mentis alienatio quando ab interna noxa capite vulneratis prouenit, lethalis est, ut Hipp. docet. 7. Aph. 14. In capitis, ait, ictu stupefcentia, & desipientia malum. Idemque asserit libr. de vulneribus capitis. læsionem enim cerebri potentius insitam esse, auspicandum tunc est. Prædictum autem symptoma anterioris cerebri partis vulneribus crebrius euenit, quippe qua, communis sensus, ac imaginationis potētiae propriè domicilium habet, ut in anatome declarauimus. Syncope vel animi deliquium capite percussis non sine mortis suspitione occurrere solet, si fauciatus tali morbo corripitur solus, si alia prava comitentur symptomata. Id enim malum ex putri aliqua materia cerebri membranis, & ipsi cerebro officiente, attolli, & à corde ad cerebrum consensu quodam deferri, verisimile est. Veram autem causam doctus medicus tum solerti indagatione, tum crebra interrogatione perdiscet.

Mentis alie-
natio.

Syncope.

Solet etiam aliud pessimum symptoma interdum occurrere, vulnere præsertim propè coronalem futuram, vel inferius influcto. Oculi enim à vulneris initia intumescunt, deinde prorsus detumescentes, iterum vndecimo, vel decimoquarto die inflantur. Idem etiam omina mur, quando prædictis diebus tumor incipit,

Oculorum
varius tu-
mor.

De Vulncribus capitis.

33

capit, et si non præcessisset. Namque im-
partitur à cerebri membranarum nocumen-
tum oculorum tunicis, ab illis ortum ha-
bentibus. Quod ex pulsu, & vrina præsa-
gium aucupari non possit: ex neothericis
nonnulli contendunt, inter quos Pe-
trus Argelata, alioqui vir doctus, his ver-
bis significauit: in fractura cranei non fa-
ciatis iudicium per pulsum, neq; per vri-
nam, quia multoties eritis decepti, sed si-
gna verissima significantia mortem sunt
hæc. Vulnerati percipiunt vnum pro a-
lio, loquellam amittunt, partimq; non in-
telligunt, non audiunt, ac vulnus exsicca-
tur. Hæc ille. Quod quidem vaticinium
(parcat Argelata) mirari, imò ridere satis
nequeo: cui non malè vulgare verbum il-
lud conuenit, in nihilo multum sapere,
propè mortuos enim iam fauciatis, mo-
rituros fore grandiloquus præfagit, cum
non sit, qui non videat, talibus correptos
symptomatis, parùm à mortuis interesse.
Quod verò ad pulsus, & vrinæ præfagiū
pertinet, ego in ea sum sententia, vt non
paruifacienda sit indicatio, quæ ab illis
præstat. Nam cum deteriora sunt, si a-
lia vrgeant symptomata, mortem præ-
nunciant. Significant enim, radices suas,
cor nempe, atq; hepar, malè affectas esse.
At contrariò bonus pulsus, bonaq; vrina
cum alia discruciat symptomata, non sa-
lutis certa signa censentur, cum possit a-
desse malum quod nondum ad longin-
quas cordis, & hepatis vias peruenerit, in
vrinæ potissimū iudicio, quod in inferio-
ribus ab hepate partibus: magis quàm su-
perioribus approbari solet, vt doctores fa-
tentur, idque Auicennæ consonat senten-
tiæ. 1. o. 3. tract. 4. capit. 9. vbi in pleuritico
morbo vrina bona, si alia indicia mala
sint, parui penditur. De oculorum eminē-
tia, tenebrositate, & rubore iam superius
capitu. 5. de signis vulneratarum cerebri
membranarum petraçauimus. Sed ad-

uertere oportet: prædicta symptomata
hinc agrotantis mortem ominari, cum
pertinacia sunt, & sine intermissione ve-
xant. Verum si remittantur, salutis spes
manere solet. Nunc in quodam progno-
stico à Guidone tradito immorandum
paululum est, quod Guidonis series non
obscuram repugnantiam, & dubitatio-
nem continet. Amplius, inquit Guido, di-
cit Auic. 3. de plaga & incisione: cutis ca-
pitis. cap. 14. & in vulneribus peruenien-
tibus ad panniculum cerebri, accidit laxi-
tas in latere vulneris, & palmus in late-
re opposito, & subdit: & propter illud
vult dicere Guilielmus, quod quando
vulnus est in parte dextra paralyticatur
sinistra, & e contrà, quia nervi qui veniunt
ad partem dextram, sunt radicaliter in si-
nistra, & e contrà, vt dicit. Considera si li-
tera dicit hoc, & super hoc consule se-
cundum de ægritudine, & symptomate.
Hactenus Guido. Qui quidem mirum
est, quàm in hoc textu cum medicinæ le-
gibus, & inter se pugnantibus verbis vta-
tur. Nam primum postquam Auicennæ
authoritatem. 1. 3. cap. 14. retulit, assue-
rantis, in capitis vulneribus, cerebri me-
branam perungentibus, latus è regione
vulneris paralyti corripit, oppositumque
conuelli, statim, quasi ad huius confirma-
tionem, Guilielmum citat libi. 2. capit. 1.
Quo in loco, eius doctrina aduersissima
est & Guidoni, & Auicennæ, cum dicat:
vulnere in dextra parte consistente, fini-
stram resolui, & e contrario. Secundo du-
Guilhelmi textū recitat, illius rationem
illam esse ait, q. nimirum crucis figuram
inter se constituunt nervi. Inquit enim
quia nervi, qui veniunt ad partem dex-
tram, sunt radicaliter in sinistra, & e con-
trà. Quæ quidem, nihil esse potest Me-
dicinæ authoribus contrarius. Tertio
vbi Guilielmi sententiam in medium
attulit, de veritate literæ dubitat, & nos

Symptoma
ta prædicta
cum conti-
nua sunt,
mortis præ-
dicationem
si intermit-
tentia sunt.

Resolutio
in vulneris
latere, & co-
uulso in la-
tere opposi-
to in quibus
vulneribus
capitis acci-
dat.

Triplex da-
bitatio ad
Guidonis
textum.
Prima.

Secunda da-
bitatio.

Tertia.

ad Galenum de ægritudine, & sympto-
mate remittit, & tamen nemo dubitabit,
& Guilielmi, & Galen. textum Guidoni
innotuisse. Sed his ego trifariam satisfac-
cio. Primò quod per ironiam Guido Gui-
lielmi opinionem recitauerit. Neq; enim
credendum est, eius sententiam de para-
lysi, & conuulsione, hoc, vel illo latere
contingente, serió attulisse, aut probasse
cùm contraria procul dubio sit tū Hipp-
lib. de vulneribus capitis duobus in locis:
tum Auicennæ citato loco. Quo modo ac-
cipienda & ratio illa est de neruorum fi-
gura in crucis similitudinē, ne manifestè
Guido aduerfetur Galen. lib. 2. de differē-
tijs morborum & causis symptomatum
cap. 7. & 4. de locis affectis cap. 4. atq; e-
tiam. 10. de vsu part. cap. 12. vt Guido di-
cat, & propter illud, id est, extra rem, &
ex suo capite, dissonus à grauisimorum
sententia, vult dicere Guilielmus, quòd
quando vulnus &c. Aut secundò parciùs
dicendum est Guidonem Auicennæ, &
Guilielmi, sententiam pro eadem vsur-
passē, quasi symptomatis substantiam, nō
locum respexerit Guido. Vterq; enim.
Doctores resolutionem, & conuulsionem
ex capitis vulnere prouenire voluit, quā-
nis in latere, & situ contrarij sint. Aut ter-
tiò, nec forsan inconcinne dicere pote-
ris, qd subobscurè, ac sub verborum inuo-
lucro Guilielmus à Guidone reprehē-
datur, ne doctissimi viri, quem & ipse vni-
uersali capite sui operis summis laudibus
extulerat, errorem proderet, & ob id di-
xit: considera si litera dicit hoc, & super
hoc consule secundum de ægritudine,
& symptomate. Remittens, scilicet, nos
ad ea loca, ex quibus Guilielmi lapsum
luce claris videremus. Cæterum sym-
ptomata hæc resolutionis, & conuulsio-
nis, non solum capitis vulnera ad cere-
bri vsq; membranam penetrantia, sed e-
riam omnem noxam mediata, aut imme-

diata interiùs impartitam comitantur.
Sed si quis circa symptomata hæc cau-
sam sciscitetur, cur latus è regione vulne-
ris resolutione afficitur, oppositum verò
cōuulsio, illa à Doctoribus redditur, qd
repletio ex vulneris affinitate proueniēs
cerebri cōtractionē impedit, & sensorij,
ac motui spiritus ipsa repletionē, ad mē-
bra lateris ipsius vulneris deferri phibē-
tur, vnde ipsa nō contrahi, sed resolui ne-
cessē est. At in latere opposito, cū ma-
teries non repletiōis vi, sed magis cōsen-
su quodam nocumentum deferat, fit, vt
membra contrario lateri supposita, no-
xam fugientia, versus cerebrum contra-
hantur, & conuulsio nascatur. Illud ta-
men perpetuò meminisse oportet, quod
licet Hippocratis, Auicennæ, communif-
que doctrina magna ex parte vera sit,
Guilielmi tamen sententia possibilibus est,
quam & ego vsu euenisse iam vidi. Sed
& conuulsionem solam citra resolutio-
nem, & resolutionem sine conuulsione
contingere scio, penes variam materie-
rum, & corporum dispositionem, aliasq;
causas. Sed ratio Guilielmi circa hunc
euentum, scilicet, crutiatio neruorum
est absurda. Duræ meningis denigratio
quæ melle non tollitur mortem signifi-
cat, inquit Guido, ex Pauli sententia lib.
6. cap. 90. Quæ trifariam contingit: aut
ex atramento ad explorandam fracturam
super cranei rimulam, vel ex quoppiam
~~alio linimento~~ super ossis fissuram illa-
pso, ibiq; in atros grumos concreto, vel
ex natiui caloris iuteritu, quo membra-
na ipsa corrumpitur, & nigrescit. Si pri-
mo modo nigredo contigerit, puro mel-
le, quod Græci acratō dicunt, diluitur. Si
secundo, post confectum pus sanguineis
grumis in saniem conuersis, nigredo pa-
riter abstergitur. quæ dum his modis eue-
nit non lethalis necessariò iudicanda est.
Sed si tertio modo consistat, mortem præ-
dicat,

Cur resolu-
tio in latere
vulneris, &
conuulsio in
opposito co-
tingant.

Guilielmi
opinio, ali-
quando ve-
rum tenet.

Duræ me-
ningis deni-
gratio ex tri-
plici causa.

sanguine
vel super
duram men-
branam

De Vulneribus capitis.

35

dicat, cum iam corruptione æger tentetur. De hac Auic. 5. 4. tract. 3. cap. 1. de fractura cranei secutus Paulum loco citato, Inquit, quod si accidat siphac nigredo ex seipso, & peruenerit vsque ad oculum, præcipue cum alijs signis malis, tunc oportet, vt desperes de salute huius infirmi. Quæ quidem verba perscrutationem expostulant, vel enim nigrities illa in oculi ambitu (qualis in sugillatiõibus euenire solet) duntaxat apparet, & satis quidem ineptum esset credere, exteriorem eam nigritiem mortem prælagire, Auicennam intellexisse: quandoquidem ex paruula prope oculos, vel in parte illis correspondente, percussione, præsertim contusiuâ, facile contingat, nigricantes fuggillationes citra periculum attolli, vt assidua fatis docet experientia. Vel de interna nigritie Auicenn. intellexit, quæ à cerebri membranarum consensu quodam vsq; ad oculum protendatur, Quia oculorum membranæ à cerebri meningibus ortum ducunt: & non minus absurdum hoc videtur. Nam si membranarum cerebri tam insignis corruptio esset, vt iam oculis interius impertiretur, nulla certe alia ad mortem spectanda indicia essent, & tamen illis opus esse faretur Auic. Quinimò antequam nigredine illa oculi obducerentur æger è vita discederet. Quare verba illa Auicennæ, scilicet, quod si accidat siphac nigredo ex se ipso & peruenerit vsque ad oculum, & cætera. Sic ego interpretor vt si nigredo non ex tinctura atramenti, vel linimenti, neque ex concreto sanguine, sed ex se ipso, idest, ex corruptione ipsius membranæ prouenerit, & peruenerit vsque ad oculum, non ipsius vulnerati, sed medici, hoc est, si viderit medicus aperte ex membranæ corruptione altam nigredinem, oboriri: læthalis censenda est. Quod clariùs intelligitur ex origine Pauli libro. 6.

cap. 90. qui in hunc modum scribit, At si nigricies sua sponte prouenerit, idque in imo potissimū. &c. Nec incōsultò dixit, cū alijs malis indicijs: quia cū alia nō infestāt, interdū periculo euenit egrotantem euadere, vt iam ipsi vidimus. Simili ego interpretatione vt or ad alium Auicennæ, locū. 10. 3. tracta. 4. cap. 3. vbi designis nō verè pleurefis agēs, inquit: & in nō vera existit subtus pectinē plātæ dolor. Nā quidā arbitrātur ob neruorū cōsensum, qui à pectoris partibus, ad manus volam, quam pectinis plantam ibi vocat, perducantur, dolorē in non verā pleuritide, ad ipsam volā deferri. Sed longè aliter interpretanda sunt verba illa, vt nimirū nō vera pleurefis signū sit, quod applicata manudolēti loco, statim dolor vrget. Quod ex Gale. depromptum est. 5. de locis affectis cap. 2. Sunt, inquit, nonnulli, qui pfecto extrinsecus inflammato loco, dolere sese fatentur esset enim merum commetum dicere, in pleuritide, ad manus vsq; volam peruenire dolorem. Adhanc etiā nostram interpretationem alludit Iacobus de partibus in Auicennæ commentario. An autem melle, an verò alijs duræ meningis denigratio abstergenda sit, cū de curatione tractemus dicetur.

Cranei fractura in plenilunio verenda est. In eo nanq; cerebrum quod humilissimum, & spongiforme, angescit, vt reliquæ aliæ medullæ, & humiditates. Luna enim humiditatis mater. ab Astrologis dicitur. Sed de hoc inferius latius in quarto documento penetratīs vulneris.

Carnis productio cum apparet in vulnere, præsertim si rubicunda sit, salutis spes est. Nanq; generatio carnis naturæ opus est, sicut subtractio artis, vt ait Galen. 3. Meth. cap. 6. & oboriens caro virtutis robur. & ipsius corporis eucrasiam, siue bonam temperaturam demonstrat, & inde ocysimam calli productionem

Nona Auicennæ declaratio.

Cranei fractura in plenilunio periculosa.

Caro rubicunda apparet salutis signum.

(quo dissidētia ossa glutinātur) pollicetur. Cū em̄ res benē cedit, vbi florescere coepit prima caro, ex illa callus cōsurgit, eiq; innititur: qui dū carūculā diploes. i. duplicati ossis, ptingit, eiq; adhērescit, p̄ficiū. Qđ animaduertēs Cornel. lib. 8. c. 4. spē, inquit, certā faciūt mēbrana mobilis, ac sui coloris caro increfcēs rubicunda.

Tumor par-
uus bonū in
dicium.

Tumor parū nō in capitis vulnerib; solū, sed in quolibet alio vulnere indicū bonū phibetur naturā em̄ virtutē indicat, & inter duo extrema, magni. f. & nulli timoris, mediū seruat. Nāq; magn⁹ tumor ingētis inflāmatiois signū esse solet: nullus verō, morietis hoīs. Idq; est qđ ait Cels⁹ lib. 5. c. 2. 6. versiculo đ rōne vict⁹, & notis vulnerū: nimis intumescere vulnus periculosū: nihil intumescere periculosū finitū: Illud, indicū est magnā inflāmatiois hoc, emortui corporis. Qđ tu adde, accidere naturā imbecillitate. Vñ Hipp. 5. Apho. 66. Si in vulneribus ait, fortibus, & prauis, tumor nō appareat. ingēs malū.

Bona sanies
bonū signū
& quale pus
optimū sit.

Sanies bona, atq; laudabilis in capitis vulnerib; maximē probatur ab Hipp. in fine primi p̄gnosticonū, & Gale. in ei⁹ cōmētario, alijsq; in locis, & Auic. 3. 4. tract. 1. c. 2. 3. pus optimū Hippocrati est, cādīdū, æquale, lene, & q̄ minimē foetidū: albū: qđ qđ in corp⁹ humanū agit, naturā p̄res radicalibus mēbris simile reddere co- natur, quē radicalia mēbra, ex duob; cādīdiorib; veluti gñrationis primordijs cōstāt, & cū succū in corporis substantiā debilitata vulnerata particula cōuertere nequit, albū p̄ saltē efficit: A Equale, & lene qđ genuin⁹ dominatur tūc t̄pis calor, qđ in oib; puris partib; æquē operatur: Quā minimē foetidū, qđ vt vehemēs foetor putrefactionē indicat, in q̄ extraneus im- perat calor, sic cōtrā, nō malē olere humoris benignitatē, cū q̄ natiuus calor cōcurrit, ostēdit: siquidē materiei alteratio triplex ā Galen. 2. Aphor. 47. in cōm. alijsq;

plerisq; in locis recēsetur: Quā dā ā solo natiuo calore inducta, sicut in nutrimento qđā ab extraneo, p̄r̄, sicut in putrefactione: quā dā ab utroq; veluti in sanie laudabili, qđ haud immeritō inter bona indicia cōnumeram⁹. ¶ Deterrimū aliud Guidō ni signū est, cū magn⁹ apparēs tumor citrā illā effatu dignā cām, postea d̄litescit. Esset aut nō insufficiēs cā corp⁹ euacuatio, sanguinis missio alui solutio, optimū aliqđ discutiēs medicamētū tumori foris adhibitū, vel aliqua admota scalpellatio, seu scarificatio. In quo Guido Hipp. imitatur. 5. Aphor. 65. dū inq̄r: Quib; tumores in vlcērib; apparēt, nō cōuellūtur maxime, neq; insaniūt, & statim subdit: Verū his euanescentibus de repēte, qđusdā ā tergo cōuulsiones & distēsiōes fiūt. Retractē em̄ retro materiei ad neruos, & il- linc ad cerebrū, eorū principiū, naturēq; imbecillitatis, quā nequeat materiei resistere, argumētū est. Vñ cōuulsio, & mors p̄ueniūt. ¶ In cranei fractū trigintaquin- q; dies porū debile & rarū expectam⁹ ex Guidonis sentētia. Sed cur tā lōgā cōtra- hit morā. Tenuis call⁹ iste capitis, cū ro- bustissimū cubiti os ex Hipp. traditione tū lib. de alimēto, tū đ fracturis, triginta dieb; robustissimo callō mediāte ferru- minetur, & iudicio meo in cā illa sūt. Qđ cerebri medulla frigidissima, atq; humi- dissima subtrus craneo est, teste Auic. 1. 1. doct. 4. c. 2. Medulla verō brachij, aliorū q; ossiū calida & humida iuxta Philoso- phi placita. 2. đ partib; āimal. c. 7. qđ calua- riā ossa tenuia, cubiti robustiora sunt, qđ craneū exigua carne vestitur, os brachij plurima. Accedit, qđ alimētū, gñrādi cal- li materies, vnicuiq; mēbro secūdū eius exigētā imp̄t̄ur, vñ quo crasiorē brachij os alimēto nutritur, eo crasior call⁹ gñratur. Qđ in capite, cōtraria rōne, cō- trariō euenit. Ex quib; oib; fit, vt in bra- chio & robustior call⁹, & breuior ei⁹ or- tus,

Tumor ma-
gnus appa-
rens qui si-
ne causaeua-
nuit deterrī-
mum signū.

fractura.
Tempus ge-
nerandi cal-
li in capitis
vulneribus.
Dubitatio.

Responso.

De Vuneribus capitis.

37

tus, i capite vero, debilior, rarior, atq; tardior cōparetur. Qd nō abse; magna natu-
re puidētia factū est. Si enī fraqū brachij
os debili callō glutinaretur, imbecille ad
modū ad motū exercēdū, pmaneret. At
in capite dēfus, ac solid⁹ call⁹ trāfariā lede-
ret. Nā sui duritiē, totius corporis exalatio-
nes impediret. Cerebrū atq; eius mēbra-
nas in cōtinuo existētes mouet, cōprime-
ret, & medicāmētōrū virib⁹, quā foris ad
mouent, resisteret cū ad interiora pene-
trarēt. ¶ Ceterū pducēdi calli tps non æ-
quē in oib⁹ pscribi pōt. Citi⁹ em̄ pueris, &
adolescētib⁹, sanguinea pferūm pditis tē-
peratura: At verō ex alio morbo cōuale-
scētib⁹, vel frigida incolētib⁹, regiōne vel
tenuissima, dū call⁹ pducit, vtētib⁹ victus
rōne lōgē feri⁹ call⁹ cōficiat. Quare Hipp.
lib. de alimētōvariā hāc pductionem cal-
li sentiēs. Osiū (inquit) alimētū ex cōfra-
ctiōe, naso bis quinq; .i. decē dieb⁹ maxil-
lā, & clauiculā, & costis duplicia .i. vigin-
ti: Cubito triplicia .i. triginta. Tibiē & bra-
chio, qdruplicia .i. qdraginta, femori qn-
tuplicia .i. qnq̄ginta diebus, & si qd in his
plus aut minus pōt. Quibus verbis postea
q corpus effractarū partiū gnādi calli ter-
minū assignauit qbusdā reb⁹ tps hoc vel
pducī vel morari posse significauit, Idq;
apert⁹ edocuit lib. de fracturis, vbi nullū
certū tps pscribit, sed ait, multū naturā à
natura, ætatē ab ætate differre. Sub quib⁹
verbis dñz aliq̄ calli terminū mutāt, cō-
phēdi pnt. Vbi obiter aduerte. Virū quen-
dā alioq doctissimū in expositione text⁹
libri d alimētō Hipp. nuper citati dceptū
admodū in prima eius editione fuisse, cū
dixit hūc Hipp. dignū textū nō fuisse, hēc
scribens verba, Textus hic Hipp. nequaq̄
est, Absurdū nāq; sibi videret futuras de-
cē in naso esse, & subdit qd si aliq̄ mihi
eū exponat erit mihi magn⁹ Appollo dū
modo cōsentanea rōni afferat secus em̄
facile est de q̄cūq; re delirare. Quā expo-
sitionē ex verbis Hipp. li. de fracturis atq;

de articulis exaratavi supra dixim⁹ cū pro-
pria epistola ad ipsū misissem; scdm e-
ditionē sup eūdē librū Hipp. edidit vbi in
nōminato authore eandē sibi vēdicauit,
oblit⁹ forsan textus Plinij in p̄fatione sen-
pennio ad libros d naturali Historia, vbi
sic inq; Obnoxij pfecto animatq; inge-
nij est i furto apphēdi malē q mutuū red-
dere pferunt cū fors fiat ex vlura. ¶ Nūc
eireā prognosticorū tractatū opportūne
quæredū est, q̄s sit iudiciorū termin⁹ quā-
tūnuē tps expectare debeam⁹ vt cū fida-
cia medic⁹ dicere possit in portu securo
vulneratū rā esse: & Guido varias in hoc
retulit opiniōes, ait em̄ scdm Rogerium
ad cētū dies vulnerū capitis protēdi peri-
culū, sed scdm iudices, ac legū peritos ad
quadraginta, qd vltim⁹ terminus acutarū
ægritudinum sit, scdm verō quatuor ma-
gistros, ad decimūquintū, q cōis ter-
min⁹ est acutorū morborū. Quā in re de
tribus ego dubito: primū cur tm̄ sit in p̄sa-
giēdo vulnerū capitis periculū, inter do-
ctores disidiū. 2. cur acutorū morborū
modò quadagesimū diē vltimū esse ter-
minū, mō verō decimūquintū, cōmunē
terminū earūdē ægritudinū esse asseuera-
uerit. 3. cur iudicium ac iurisperorū cēsu-
rā in re medica attulerit. Ad primū dicē-
dū, Rogeriū, quatuorq; magistros, Vgo-
nē, Theodoricū, Henricū, Almanū, iudi-
ces, ac iurisperitos in p̄sagiēdo periculo
scdm varios tēporū suorū capitis vulne-
rū successus, variasse, quo, vel breuius, vel
feri⁹ ē vita discessisse fauciātos viderunt,
siuē ætatis, siuē tēperaturæ, siuē tps, siuē
victus, rōnis siuē regionis varietate, siuē
mala curatiōe id accidisset. Nā vt quisq;
vlu euenisse vidit, monumentis suis scri-
ptū reliquit. Ad 2. Rndendū est, vtrūque
terminū, & qdraginta, & qndecim dierū,
penes variū successū, in acutis morbis cō-
siderari posse. Nāq; acuti morbi duplex
est terminatio, vt ex Gal. 2. de diebus de-
cretorijs. c. 12. colligit: altera ipsi⁹ exacti,

Secundam

Varie opi-
niones cir-
ca prognos-
ticorum ter-
minum.

Triplex da-
bitatio ad
Guidonis
textum.
Secunda.

Tertia.

Responso ad
primum.

Responso
ad 2.

Duplex ter-
minatio ac-
ti morbi.

& simpliciter acuti, ipso sic manente, acuto, quæ intra quatuordecim dies fit. De qua Hipp. 2. Aph. 2. 3. Acute (ait) ægritudines quatuordecim diebus iudicant: altera verò (ipso non permanente acuto) quæ morbum tropicū, seu cōuersiū ex decidentia medici appellauere: & hæc quadraginta diebus cōficiū. Quæ Gal. in cōm. prædicti Aph. & lati⁹ dict. c. 1. 2. optimè declarauit. Exemplo est ex quatuordecim diebus, quæ duplicè habet terminationē: alterā, dū acuta manet, & i quatuordecim diebus terminat: alterā, lōgio rē, cū in empyema, siue peripneumoniā mutat: quæ mutatio intra quatuordecim dies efficit, aut in sexaginta, quā prius cōuertit. Quæ terminū non ex quatuordecim decretorijs diebus, implētib⁹ quadragēsimū, cōstare credas: ut quidā malè arbitrabant. Quos reprehēdit Gal. dict. c. 1. 2. de diebus decretorijs lib. 2. Ergo, quæ Guido noster inquit, decimūquintū die acutus morbus cōem terminū esse, ad morbū simpliciter acutū qui acutus manet, referēdū est. Quæ verò de quadragēsimovltimo termino inquit, decimūquintū ex decidentia intelligi debet: sicquæ nullā continet Guido repugnantiā, & hoc modo Gal. in cōm. præfati Aph. & 2. De diebus decretorijs. c. 1. 2. conciliās Hipp. variā ap parentē sententiā. Qui in pronosticis acutos morbos in quatuordecim diebus terminari inquit. f. pronostico. 28. verū. 2. Aph. in quatuordecim. Quæ si dixeris, de decimoquarto nullū apud Guidonē verbū esse, sed de decimoquinto, rēdebo, in antiquioribus, & emendatoribus Guidonis codicibus, non decimūquintū diē, sed decimūquartū legi, ut ex ipso Guidone vniuersali capite vulnerū colligit. Sed scite (quæ vulgo circūferunt) litera, quæ decimūquintū habet, parū referre, decimūquartū, an decimūquintū legatur: ut enim virtute forti crisis sepe decimūquintū diē vix attingit: sed in fine decimi tertij sit, quale in capitis vulneribus cōtingit, sic virtute imbecillā, ad decimūquinti principij prædicit. Tertiū dubi. illā habet

rationē, quæ cū iuris prædētia ex morali, atque etiā naturali Philosophia permanuerit, qua antiqui iuriscōsulti mirè scaturiebant, haud immeritò, ad vulnerū præfagiū, illorū vtiū autoritate Guido. Vel ea ratione illorū meminit, quæ cū huiusmodi cāx apud iurisperitos contrauerent, & capite vulneratos quadragēsimō diē vitæ discedere sepe probaret, salutis vel mortis in capitis vulneribus illū esse terminū, scriptū reliquerunt. Vnde Angel. Perusinus in l. vnica. C. de emendatione seruorū, & Augusti. Ariminensis in additionibus ad Angel. in tract. malefic. in verbo, Et ex interuallo. col. 2. & nouiter Carreri⁹ alios referēs in practica causarū criminaliū. §. homicidiū pag. 47. 1. num. 324. atque nouissimè AEgidius Bosius in practica criminali tit. de homicidio. fol. 159. num. 115. vulnerū capitis periculū ad quadragēsimū diē protēdi tradidere. Quauis ex dictis doctoribus multi totā hanc rē medicis tādē relinquēdā censent: ut tradit Couar. in Clem. si furio. 2. part. §. 2. num. 9. de homicidio: sicque & medici iurisperitos, & ipsi medicos allegāt, & nominatim Guidonem nūm. tract. 3. c. 1. de vulneribus, & solutione cōtinuitatis refert Boerius decisione. 323. Ergo mirū non est, si in re medica iuriscōsultos attulerit Guido. ¶ Sed cur Rogeri⁹ vulnerū capitis periculū ad cētū dies protrahit, & certè non sine ratione, cū interdū lōgi⁹ tēpus excedat, & ad octo mēses mortuā fuisse vulneratā mulierē, ex facto accidisse referat text. in ca. 2. de clerico percussore, vbi Abbas ait, ad iudicandū si decesserit vulneratus ex vulnere, nec ne, curādū non esse tēpus, sed solū an post illatū vuln⁹ semper à malo in deterius properauerit. Cuius opinionē præbat Hipp. de Marfil. in lege si in rixa num. 57. digestis ad legē Cornel. de sicarijs, cōtra glossā in dicta lege. 1. de emendatione seruorū, quæ in triduo vulneris periculū coarctauit, dū inquit: Surgēte infirmo, & post triduo bacu

Turipertio
rum opinio
circa iudiciorum
terminū in
vulneribus
capitis.

Rogerijopi
nio defendi
tur.

De vulneribus Capitis.

39

Aduerte.

Incumbendo ambulante, non vulneris periculo, sed excessui ab ægrotante commisso, mortem tribuendam esse; & ita, inquit, distingui in lege Mosæica exodi capit. 2. 1. cuius sententia iure optimo non admittitur. Quis enim tam lethali vulnere percussus iacet, ut post triduum, baculo innitens aliquantulum ambulare nequeat? Neque obstat exodi. 2. 1. nam ibi nulla de triduo mentio fit, sed solum dicitur, si surrexerit, & ambulauerit foras super baculum, quod post longum temporis intervallum intelligendum est. Ego autem mea tempestate, modò ad decimam quintum, modò ad quadagesimum, semel ad septuagesimum, capite vulneratos discussisse vidi, & apud Madritum in curia Caroli. 5. Imperatoris maximi, Commendarius Solis à Garzia Carabaiolo capite percussus, prope centesimū ferè diem naturæ concessit, & occisor capite puntus est.

C A P. X.

De capitis vulneribus ab incidente telo lateralibus partibus inflatis, & an ipsis comperat futura, demum de curatione.



T à leuioribus sermonem exordiamur, de capitis vulneribus, quæ ab incidente telo lateralibus capitis partibus inflantur, disseramus. Namq; vulnera hæc (ut in superiori diuisione etiā admonuimus) aut in summo capite, aut in eius lateribus consistunt. De prima parte postea tractaturi sumus. Quod verò ad lateralia vulnera pertinet primo limine sese offert dubitatio: in his ne vulneribus futura conueniens sit. Et non conuenire. 1. suadebat vulgaris receptissima, & quæ inter quam plures non solū rudes, & Medicinæ igna-

ros, sed etiam Medicos invaluit opinio, existimantium, in capitis vulneribus minime ad mouendam esse futuram. & Philosopho teste. 7. ethicorum cap. 5. popularis fama non prorsus vana est. Præterea si carnem ebaseremus, quo pacto incisum periosstrum emundaretur? Cui, quia à dura membrana per caluaria commissuras ortum ducit; facile nocumentum communicaretur. Sed contraria sententia & longè venior, & receptior est: cui prædicta argumenta non obstant. Nam primum, quod de vulgari opinione non prorsus vana, dicitur, non negamus: neque enim omnino vanum est dicere, in capitis vulneribus non conuenire futuram, cum in summo capite non ferenda vulnera, sed perforatione in eis utendum sit, cum apta saniei effluxione careant. Secundum de periosstri purgatione non procedit: quia, etsi scissum sit, & futura resectum, de siccatione, & vitione, magis quam emundatione eget. Neque in hac re paradoxus ego sum: sententia enim ista veteres habere auctores; nempe Galenum sexto. Methodi in fine; dum inquit. Quod si nulla ex superiacentibus partibus sanies intro conflueret, superfluum esset, os eximere, & apertius. 2. de compositione medicamentorum secundum locos etiam ex mente Archigenis, ubi sine exceptione vulnera, & cum cranii fractura consui iubet, quod est fortius & Auicennæ. 5. 4. cap. de fractura cranei, Aetium. 1. 4. sermone cap. 26. Guidonem tribus distinctis locis, & Nicolū Florentinum sermone. 7. cap. de fractura cranei. Serapionem cap. 12. suæ practicæ de cura sode ex percussione; Lanfrancum, Henricum, Dinum Florentinum in commentis. Auicennæ citato loco, & Guilielmo de Saliceto. Sed & id sensisse ut Hipp. sæpe citato lib. De vulnere capitis, ubi in fronte, & capillorum expertibus locis vulnera

Dubitatio an in vulneribus capitis competatur, & quando.

arguuntur, ut in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis.

in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis.

in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis.

in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis.

in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis, ut in vulneribus capitis.

opponendi
ad hunc
modum
ad hunc
modum
ad hunc
modum

constringi præcipit. Quos recetiorū tur-
ba quasi foedere percusso, insequitur: &
est non solū Hispaniæ, sed exterarū natio-
nū insignium chirurgorū praxis receptis-
simā, vt sedula indagatione certō scio qđ
non in summo capite, cui terebratio pō-
tius cōuenit, vt supra dixi, sed in laterali-
b' partib', ab incidēte nō cōfundēte telō,
factis quæ puris expulsionī aptæ sunt, ob-

Apta figura
ad puris ex-
pulsionem,
plurimū va-
let.

seruādū est. Etenim expulsionī apta figu-
ra plurimū in vulnerib' facessit negotiū,
vsq; adeo vt Paul. lib. 6. c. 9. q. scribat, in oc-
cipitali parte, loco, scilicet, ad pus expel-
lendū accommodo, cū fractura cranei pe-
netrante vulneratū post annū quā vul-
nus accepisset propter aptū emissarium
seruatū fuisse. In capite autem præter cō-

Fibularū su-
tura.

munem, quā vulgō vtiuntur, & acu perfici-
tur, alia est fibularū vel triangularium lig-
amentorū futura, quā vulgares antiqui medi-
ci plumacellorū vocabant, alia etiā, quam
ego excogitavi cū prolis capillis Hi-
spaniæ vteremur: nā pertuso vulneris am-
bitu, capilli, instar funiculi contorti, ita v-
tring; connectuntur, & nodantur, vt vul-
neris oræ acū confutæ essent, cohereant.

Nonā futu-
ra, quæ ca-
pillis noda-
tis molitur.

Quā futuram illis moliri solebant, qui cō-
munem formidabant. Ideo autē confuso
vulneri capitis vt plurimū futuram non
admoquemus: quia cum confusum omne
in sanie conuerti necessum sit, iuxta Hip-
po. lib. de vulneribus capitis, & Galen. 4.
Meth. cap. 5. facile putredo per caluariæ
futuras, vel cranei rimulā ad interiora illa
beretur: prohibēte nimirum futura puris
expulsionem. Laterale autē incisum vul-
nus distinctionē recipit. Nam aut secun-
dum rectitudinē, seu longitudinē contin-
git, aut pertrāsuersum, primo casu futura
sine discrimine quadrat, siue incisum cra-
neū profusus, siue nō incisum sit: quæ futu-
ra absterfo prius vulnere, & ossis fragmē-
tulis, siqualabēt, & ex facili remoueri pos-
sunt, expulsis adaptari debet. 2. casu, si in-

Discrimen
seruandū
in laterali
vulnere quo
ad futuram.

cute, & carne segmentū sit, idēst, abscissa
pēdeant, quāuis craneū incisum sit, futu-
ra faciendā est: si verō hæc non pendeāt,
sed telum ad inferiorem partem cauita-
tem fecerit, tunc ad sanum locū apertio-
ne facta, ibidemq; indito linamento, su-
perius vulnus tutō confui poterit, cū a-
perture illā puris expulsionī locus datus
sit: modō memineris, vt si os abscissum
super sit, quod faciliē remoueri queat, an-
te futuram expellas: linamentū verō,
ita affabre fiat, vt vulneris osculum mini-
mē occludat, sed expellendo puri via pa-
teat. At si cum cute, & carne incisum os
pendeat, si remotu non difficile sit, remo-
uendum subtiliter à te erit, potissimum
si ex secunda lamina sit, deinde ampliōrē
ad partem sanam decliuiori loco apertio-
nem facies, ac immisso ibidem linamen-
to, superius vulnus confues, aliquantu-
lumq; in nouo à te facto vulnere pus mo-
uebis, postea ad eius emundationem, &
exsiccatōem properabis, maxima adhi-
bita cura, vt ligamenta vulnus minimē
comprimant, ne cerebri membranæ cra-
nei orbatæ tegmento, irritentur. Si verō
os remoueri nequeat, prædicta apertio-
ne facta, linamentum ingeniosē con-
structum immittito, atq; vulnus confui-
to. Sed etsi regulare sit in summo capite,
& in confuso vulnere minimē conueni-
re futuram, euenire tamen poterit casus,
qui & mihi iam vsu contigit, in quo con-
currentibus his, suendum sit: vt si ex in-
genti casu tam insigne vulnus confusum
fiat, vt tota carnosā mēbrana, atq; perio-
stium à maxima capitis parte auulsa, &
separata sursum eleuentur, hoc casu ad-
moui futuram, non glutinatricem, nec
quæ sanguinis profluium sifteret, sed
laxam, & vulneris orarum ad tempus
seruatricem. Quam Guido tractatu ter-
tio. capitulo vniuersali, confusis, & dilace-
ratis vulneribus descripsit. Cuius futuræ
inten-

notanda

Casus par-
ticularis in
quo vulnere
confuso fu-
tura compe-
tit, & quæ.

De Vulneribus capitis.

41

intentum est, impedire ne extranei aeris
offensa, & narium caloris, atque spirituum
exhalatione, tota illa separata pars corru-
patur. Laxior autē alijs idē futura hanc
fieri debet, quia cum prima intentione
vulnus hoc contusum glutinari nequeat,
sed in saniem confusio prius vertenda sit,
si constringens futura esset, aut puris ef-
fluxione rumpere, aut eius expulsio-
nem impediret. Sunt tamen hoc casu de-
cliuioribus partibus scissurę faciendę quō
vulnus inditis ibi linamentis purgari com-
modē valeat.

Curatio la-
teralis vul-
neris postea
motam futu-
ram.

Post admotam futuram, statim tere-
binthinam in panno extensam vulnere
adaptabis, de super stupam agitato oui al-
bumine infusam; & si sanguinis pro fluxu
uium accidat, amplo exposita, madefacto
panno caput obuoluatur, sequentibus ve-
rō curationibus bona, atque tenui adhibi-
ta victus ratione, factaq; conuenientivni-
uersali corporis euacuatione, & extremi-
tatum frictiōibus, & deligationibus quō
& materies a capite reuelatur, & inflam-
matio arceatur, stupico vino, abluendum
vulnus est, deinde aureo Guido, vnguen-
to olei experte, vel quopiam alio illinien-
dum: vulnere verō ambitus rosaceo, cali-
do fouendus, & oui albumine, cum rosa-
ceo, vel medicamēto ex Omphacino ro-
saceo, boli Armenici, & sandali puluere
cum pauca cera commixtis perungendus
est. Temporis autē quo rescindere pun-
cta oporteat, certa regula tradi non po-
test: alteris enim citius, alteris serius secū-
dū vulnere variā glutinationē, rescant.
Post septimum verō, glutinātibus medi-
camētis, ac stupico vino, & alijs laterali-
bus his vulneribus satis accommodis (quę
in antidotario late describuntur) vtendū
est. Sed meminisse oportet, in plagis his,
vbi per futuram curationem molimur, si
dolor, & symptomata essent, quantō ra-
tius iterabūtur, tantō maturius & grotan-

tem ad sanitatem peruenturum. Imo Ni-
colus Florent. serm. 7. cap. De vulner ca-
pitis, predictis concurrentibus post futu-
ram, vsque ad vulneris glutinationē, non
iterari curationē precipit. Namq; vbi de
glutinando vulnere agitur, irridenda vul-
garis opinio est. Quę sine delectu, pro le-
ge obseruatur, id quod a vulneratione, & in-
vere bis, in hyeme semel vulnus curari
oportere. De quo errore. 2. lib. De vulne-
ribus neruorū latius agemus: si verō obo-
riantur symptomata, quę primariā hanc
(quę futura comparatur) intentionē im-
pediant, facile erit futura distumpere, &
aliā intentionē aggredi, quę alijs vul-
neribus accommodat. Meminisse autē de-
bemus quāuis vulnera, quę in temporibus
consistunt, periculosa admodū cen-
deantur, vt Gal. de vsu partium lib. 1. ca-
pit. 1. ex Hippocr. autoritate eleganter
docet; nihil tamen inter illa, & reliqua la-
teralia vulnera, quod ad futuram, & cura-
tionem pertinet, interesse: in eis enim fu-
turam recte adaptamus. Nam licet inci-
sum os esse contingat, a perforatibus fer-
ramētis, quibus in summo capite ege-
mus, capendum notis est. Cum tempo-
ralia hęc vulnera ad expellendum pus
aptissimum emissariū habeant, illa ve-
rō, quę in altiori loco facta sunt, emissar-
io careant. Accedit loci, & musculorū,
ac neruorum nobilium præstantia, & in-
cessus, maximaque sensus, quo præditi
sunt acrimonia. Quare Gale. 6. Methodi
cap. 6. Temporum vulnera perforare nō
ausum fuisse ingenue fatetur. Ceterū
si laterale vulnus per transversum, & cū
cutis carnis, atq; vtriusq; ossis laminę in-
signi abolitione, seu perditione infligan-
tur, vt cerebri dura membrana detecta
prorsus maneat, futura adinuenire, delira-
mentū esset, cum tūc temporis partes quę
committi futura debuissent minimē exte-
rius iterabūtur, tantō maturius & grotan-

Temporum
vulnera quā-
uis periculo-
sa valde nō
differūt quo
ad curatio-
nem a ceteris
lateralibus,
& in eis
ab essis per-
foratōe ca-
uendum.

Vulnus late-
rale per tras-
uersum, &
cum substan-
tię perditio-
ne quomodo
curandum.

Obseruatio
quo ad cu-
rationis ite-
rationem.

ad extranei aeris auersionē, & natū caloris conseruationē, atque tenuioris vi-ctus rationem adhibendam. Debet præterea vulneratus in obfcurō loco, & cum summo silentio esse; nec inter initia supra vulnus decumbere, ne cerebri membranæ, ipsumque cerebrū compriment, eademque ratione linamenta, quæ vulnere admoventur blandissima sunt, non simplici oui albumine, sed vitello commixto illita, vt dolorem mitigent, & aliquantulū puris concitent. ¶ Conueniet etiam, quō cerebri membranæ melius tueantur, neue ipsis hgamenta incumbant, cucurbitula frustum multis, crebrisque foraminibus terebratam vulnere adaptare. De cuius applicatione authoribusque, atque de huius vulneris cum substantiæ perditione, ossisque insigni abo- litione curandi methodo, postea latius, annuente Deo, differemus. Hæc de lateribus vulneratis capitis partibus dixisse sufficiat. De his autem quæ altioribus locis inferuntur, sequentibus capitibus tra- stabimus.

CAP. XI.

De Vulnere in summo capite cum periosteï incisione ab inciden- te telo, de eiusque curatione.

Capitis vul- nus omnepe- riculosū, sed magis i sum- mo capite.



I Capitis qualiacumque vul- nera, cute tantū scissa, con- temnenda non sunt ex Hip- po. sententia lib. De vulne- rib. capitis, multo magis in summo capite, cum ibi præter ossis, & carnis tenuitatem, duo maximi momen- ti versentur, quæ mortis causa sæpè sunt. Alterum, ad expellendā materiā inepta figura. Quam Gal. 6. Meth. c. 6. haud im- merito magni fecit. Retento enim inte- rius pure pericranæum et rodi, & erosio-

ne, siue aliqua resudatione, aut puris va- poratione; duræ cerebri meningi, à qua externa crani membra exoritur, no- xam communem fieri necesse est: alte- rum, detecti istius nervosi panniculi, ni- mioque sensu præditi contractus. Nam dum ferramentis à chirurgo per tracta- tur, ipsa grāua symptomata, quæ vulne- ra ipsius duræ cerebri membranæ comi- tari solent, ratione originis proritantur, vt Auenzoar lib. 1. tracta. 2. sui rheisr ad- uertit; Hippocratem prædicto libro imi- tatus. Vnde Cornelius sæpè citato lib. 8. cap. 4. & Aetius serm. 14. capit. 6. huius- modi pericranæi tacti, ne dum incisi, vul- nera metuenda, & sæpè lethalia esse re- stantur. Quos & recentiores omnes in se- cuti sunt; quod fortiori ratione in sum- mo capite, vbi longitudinalis sutura con- sistit, quæ immediatius pericranæū cum dura membra connectit, procedet. Nan- que incisione, aut retento pure laxata su- tura, & circumambientia ossa non sine magno periculo laxabūtur, auctore Hip- po. citato libro, & ibi ait: Cum autem os telo, ictūque denudatum est, vulnusque in futuris ipsis sit, perniciosum est. Ergo non est prudentis, nec sui compos est chi- rurgi sine vilo delectu, in capitis vulnere salutē statim polliceri, & de ægrotan- tis incolumitate temerè iudicare. Quod vitium, multi ex nostratibus hodie non sine honoris sui iactura committūt, quos certe mirari satis ego nequeo; qui par- uula vulnera, quorum interna noxa nos sæpius latet, magis quam magna vereor. Nam magna ipsa se nimis apud Chirur- gum commendant, & sui præsagium cau- te, vel incaute vulneratus eiusque con- sanguinei, atque amici timent, nec trans- uersum, quod aiunt, vnguem; à medici præscriptis deuiant: paruula verò, & in- tuitu leuiā, ancipitē, atq; anxium medicū tenent, præsertim cum mala vulnerum

In capitis vulnere nō temerè à chirurgo sa- lus pollicen- da.

capitis

De Vulneribus capitis.

43

capitis nō statim pateat, vt Hipp. p̄dicto libro inq̄. Sauciatuſ, & reliqui, vulnuſ & curationē negligūt, vt creberrimo quidē experimēto, nō abſq; graui, atq; miſerabili multorū vulneratorū iactura, cōpertū habeo. Quare Cornel. li. 3. c. 26. optimē medico ſuadet, ne qđ per ſe exiguum eſt malū, curātiſ negligētia maiuſ fiat. Qđ ſi capitiſ oīa vulnera parui pendenda non ſunt, multō magiſ illa q̄ vertici inferunt, vereri debes: tum ob pr̄dictaſ cāſ: tum q̄a & tenuiſſimū, & infirmiſſimū os verticis eſt, cerebriq; plurimū hoc loco ſub eſt, vt oēſ fatentur, & anatome apertē de monſtrat. ¶ Curationē ergo, quā horum vulnerū pp̄ria eſt, iam aggrediamur. Sed hęc diſtinctionē recipit. Nā alia curatio ſtriſto vulnere, alia amplo conuenit, & ſi ſtriſtū vulnuſ ſit, ſcire oportet, ſcđm reſtitudinē, an per trāſuerſum: & in lōgitudinali, ſeu ſagittali, an verō in coronali ſutura conſiſtat. Vulnuſ igit̄ ſtriſtū ampliatōe eget, hoc obſeruato, qđ ſi ſcđm reſtitudinē, & longitudinalē tetigerit ſutura, raſorio advnū, vel alterū lat̄ apertio ap̄te ad expellendā ſaniē, figurā, q̄ crucis effigie nō referat, vt multiſ chirurgiſ in vſu eſſe ſolet, ne ſutura neruiculi p̄ſcindant: ſed aduerſuſ vnū latuſ ad hūc modū. T. moliat̄: ita vt apertioſ ſupremā lineā vulnuſ ipſum conſtituat, alterā verō raſorio efficiat. Si verō per trāſuerſum, ex vtroq; latere vulnuſ dilatandū eſt: atq; coronali ſutura arctū hoc vulnuſ infederit, ſcđm reſtitudinē verſuſ os frontis decliuſ ſectio fiet. Sed q̄a ex Guid. ſn̄ia tract. 1. c. de anatome oſiū capitiſ, & aliorū lōgitudinaliſ ſutura frontiſ oſſa diuidenſ vſq; ad ſupercilia p̄ſertim in mulieribuſ interdū ptendit, & ipſe periculo vidi, quā parū at tendēteſ chirurgi, cranei fracturā eſſe arbitrant̄, ſi talis ſutura, q̄ ſpecillo facile explorat̄ (nā labiſ magiſ in ſutura q̄ in cranei rimula) appareat, tunc apertio obliqua, & decliuſ inter vtrāq; ſuturā, q̄ neu-

trā attingat, admouēda eſt. Neq; em̄ vbi maiuſ periculū fugimur cōſiderāda eſt ſi brarū muſculorū reſtitudo. In amplo verō, & qđ ſatiſ patet, vulnere, apertioe op̄ non eſt. Sed in hoc, & in eo qđ amplificauim⁹, ſi ſanguiniſ p̄fluxio vrſerit, linamēta oui cādidō illita, quo ſanguis ſi ſtat, ſtatim applicāda ſunt. Si verō nō vrſerit licebit albumine vitellū cōmiſcere. Vt em̄ albumen oui, authore Gale. 1. 1. de ſimplici medicina, triplicē ſortiſ virtutem, ſanguini. ſ. ſiſtēdi, dolorē mitigādi, atq; inflāmationē coercēdi, ſic vitelluſ, q̄a anodynus, puriſ cōcoctioni quā in hiſ vulnerib⁹ deſideram⁹, accōmodat̄. Capite vt decet, deligato, curatio put ſymptomata, vel adſuerint, vel defuerint, maturi⁹, aut ſeri⁹ iterāda eſt. Si em̄ ſymptomata non infeſtauerint, ad triduū differēda erit, tū vt humorū conquieſcat ebullitio, tum etiā, vt puſ confici valeat. Sed interim vena ſecanda eſt, & extremitatū frictioeſ, ac dolorificę deligatioeſ reuulſioſ ḡra moliēdæ. Qđ vltimū ſuadet Gal. 1. 3. Meth. c. 6. Oportet etiā ſyrupū roſaceū cum aqua intybi manē & ſerō vulnerato exhiberi quōd ſanguis, atq; bilis ad ſauciatā particulā tēperatioeſ, & craſſioeſ cōfluāt. Nāq; ſcđm Gal. 4. Meth. c. 1. ſanguis q̄ ad vulnuſ defluit, & bonuſ, & tēperatuſ, & quantitate medicriſ eſſe debet. Adhęc ſi interea tpiſ modicuſ ſanguis effluxerit cohibendū nō eſt. Qui em̄ modicuſ eſt inflāmationē arcet, vt docet Hipp. lib. de vulner. capitiſ. Cæterum ſi vel dolor, vel tumor, vel febris, aut inſigne ſanguiniſ p̄fluuiū ægrotantē diſtorſerint, triduū expectare nō licet. In. 2. verō curatioe poſtea q̄ vulnuſ optimē abſterſerit, vel goſſipio, vel linamētis, vel molliſſima ſpōgia: vt Hippo. citato lib. p̄cipit, quē ſecur⁹ eſt Pauluſ lib. 6. c. 3. o. linamentiſ vitello oui, & oleo roſaceo ſimul agitatiſ, intinctiſ implendū eſt, fouendūſque vulneriſ ambituſ roſaceo, & lumbricorū commixtiſ oleiſ im-

Vitelli, & albuminiſ oui virtus.

Curatio quādo iterāda.

Vena ſectio & extremitatū frictioeſ, & deligationeſ cōſeruant.

Modicuſ ſanguis non eſt cohibendūſ.

Vulneriſ in ſummo capite variateſe cundum vāriū vulnuſ curatio, & referatio.

Aduerſioeſ ca referatio nem.

Defensiuū
quale esse
debeat.

Oleū ex o-
uorum vitel-
lis.

Deligatura
duorum ca-
pitum.

Pileus agni
napelle.

Decubitus
qualis.

imposito desuper medicamēto, quod de
fensiuū vocāt ad fluxionē, & inflāmati-
onē impediendū, cui in siccis tēperaturis
modicū terebinthina cōmisceat, vt parti-
culæ natura adseruet opērepretiū erit, &
si dolor infliterit, oleo ex ouorū vitellis
vulnus foueri cōuenit. Qd mirē cōmen-
dat Auenzoar li. 1. tract. 2. sui thes. Sed
de his medicamētis latius in antidotario.
Deligatura aut qua vinciendū caput est,
duorū initiōrū, seu capitū esto: de q̄ me-
minit Hippo. lib. de his q̄ in medicatrina
sūt. & Gal. li. 3. Meth. c. 4. & vterq; pleris-
que i locis. Auic. etiā Fen. 4. tract. 1. c. 8.
& Guido tract. 3. c. de ligaturis capitis. de
q̄ ligatura cū alijs in libello quē de ligatu-
ris scripsi, sermo erit. Oportebit etiam, vt
vulneratus pileū ex agnina pelle p̄sertim
hyemali tpe, ad capitis tegmentū gestet.
Decubitus, principio erit supra lat⁹ vulnē
oppositū sanie verō cōfecta, supra lat⁹ vul-
neris, hoc, vt pus liberius effluat, illud, vt
dolor minimē p̄ritetur, q̄ curatiō istenor
vsq; dū sanies p̄creari incipiat, obseruari
debet: postea verō ab oī oleorū intra vul-
nus infusione, p̄sus abstīnēdū, sed emun-
dātib⁹, & siccis medicamētis vtendū. Ne
que em̄ in capitis vulnerib⁹ oleo vtimur,
vt affect⁹ remedio, sed symptomatis. Sed
quo pacto hoc intelligēdū sit, & an oleū
cōueniat in capitis vulnerib⁹ sequēti capi-
te disputabimus. Vltimō ad exsiccationē
& cicatricis inductionē p̄perandū. Medi-
camēta aut q̄b⁹ hæc cōparētur, & quæ ad
vulneris vsq; p̄fectā curationē expediāt,
in antidotario abūdē satis reperies. Devi-
ctus rōne, ac de alijs sanguinis mīsiōib⁹
q̄ p̄ter eā q̄ principiō sit, faciēda est, de q;
pharmaci exhibitione, capite de fractura
penetranti in vertice capitis, differimus.

C A P. XII.

An olei. & digestiui (quod vo-
cant) medicamenti, in capitis, aut alijs
vulneribus, securus vsus sit?



VI. A. de oleis, & digestiui, ad
capitis vuln⁹, mentio à me supe-
riori capite facta est, non malē
hic disputabitur, an in vulnerib⁹ capitis:
Imo q̄buslibet alijs, oleo, & digestiui se-
curē vti liceat. Et nō licere p̄sertim in de-
fecta cerebri mēbrana, suadere vī Gal. 3.
Meth. c. 2. q̄ hmōi oleosa, ac emollientia
medicamēta putrefactionē cauis vulnē-
bus inducāt, & malē olentia reddāt, qua-
re aduersissima omnium medicamento-
rum esse testatur. Idem probat Galen. 4.
Meth. c. 1. dū admonet, ne quid inter
vulneris glutinandas oras veluti oleum
interfit. Et. 6. Meth. ca. 6. mox inquit, &
ad finem vsque, siccis medicamētis (quæ
Græci cephalica. i. capitalia vocant) erit
vtendum. Et ad finem eiusdem capitis
asserit, tutiorē esse curatiōis viā q̄ exsiccā-
tibus, q̄ quæ leniētib⁹ adimplet. Auic. etiā
3. 4. tract. 1. c. 15. de Estiomeno, vsq; adeo
oleū vetat, vt inter cās putrefactiōis mē-
bri illius p̄fusionē in cauis vlcērib⁹, cōnu-
merauerit. Adhęc, qd ad rosaceū oleū ad
cerebri mēbranā, prinet, quis primi gra-
dus siccitatis particeps sit, respectu tñ sic-
citatē q̄ duræ cerebri mēbranæ particu-
læ. f. neruosa, & sicca debet: humens red-
di. Sicciora em̄ scdm naturā, siccioribus
indigēt medicamētis, ex Gal. 3. artis Me-
dicinalis. c. de solutiōe cōtinuitatis. Quo
etiā loco oleū noiatim vetuit. In contra-
riā tñ sniam ire, & rō, & grauissimorū au-
thoritas cogit. Et vt à rosaceo exordiar
optimē facere ad capitis vuln⁹ ex eo con-
uincit, q̄ cū cerebri inflāmatio attolli in-
cipit, optimē ei succurrit: nā eneruatas ce-
rebri virtutes reficit symmetriā seruans,
& dolorē leuat, vt voluit Auic. 2. cano. c.
533. de oleo, † Quib⁹ ductus Paul. li. 6. c. † Habet em̄
90. adeo rosaceū probauit, vt p̄forato cra-
neo, cerebri mēbranas illo crebrō foueri
p̄cipiat. Auic. etiā Fen. 5. 4. tracta. 3.
ca. 1. de fractura cranei idem docuit, duo-
bus aut tribus locis, & Guido tractatu. 3.

Oleum, & di-
gestiui an
capitis, & a-
lijs vulneri-
bus conue-
niat.

Rosaceum
cuius tempe-
raturæ.

CONTRA-
RIAM

† Habet em̄
comparatu-
ram quā ro-
saceū fuit
ex Gale. 2.
† Simplicia
medica. fa-
cult. ca. 27.

cap. de

De vulneribus Capitis.

45

cap. De vulneribus capitis, & Auenzoar suo thesaur. capi. De fractura cranei, mirū in modum rosaceum extulit: sed & Gal. 2. de cōpositiōe medicamētorum scdm locos capite de scissuris, & cōfusionib⁹ in capite factis, & capi. cui titul⁹, Ad dolorē capitis ex plaga, rosaceo vtitur. Et qđ mirādum, & durissimum vī, in illo capite, p̄cipit, vt super cerebri mēbranā medicamētum ex rosaceo, & vaccino butyro, & suillo adipe vetere insulso, imponatur: sunt enim hęc plus satis emolliētia. Sed certē hoc aut sic accipi debet, vt Archigenis sniam Galen. referat, nec suā ingerat, aut p̄dictum medicamētum nō ipsi cerebri membranę immediatē, sed parti carnosę applicari debet. Neq; em incōuenit, vt principio partis naturam adseruet, modō pri⁹ succū memitz herbę cum poline milij mēbranā inunxeris oleum rursus pbauit Gal. lib. 10. De simplici. medic. facult. c. de sanguine columbino: imō secundo ad Glauconē capi. de sinu, intra sinuosum vlcus rosaceum addita papyracea cōbusta charta, psiphonē injici imperauit. Vides lector Candide quāta sit hac in re dubitatio, quā sibi met ijdē autores cōtrarij videantur. Quare disidium hoc sic ego rectē cōponi posse cēseo, vt olei, digestiui, aliorumq; mollificantium vsu non perpetuō interdicitur, nec semper medicamenta ista probentur. Nam curationis principio vbi dolor, vel ob plagę scuitiam, vel ofsis perforationem, vel cōfusionem, vel alia ratione distorquet, aut cū inflammationem (quam potissimum post ofsis perforationem iure veremur) arcere, vel iam scuiuentem refrenare cupimus. Denique vbi non glutinare vulnus ex prima intentione, sed apertum, atque hians ex secunda, seruare, & pus ali-quod concitare intentū est, rosaceū, & digestiuū, atq; id genus emolliētia medicamēta, si parcissimē eis vtamur, cōmodissi-

ma fore cēseo: rosaceū em nōiatim, refrigerata mēbra parū calfacere, & calfacta refrigerare iuxta Gal. placita. 2. de simpliciū mendicam. facult. ca. 27. & Auicē. dīctō libro canonis, insigniter valet. Quod intra vulnus per triduū saltem securē infunditur. In ambitu verō vulneris etiam vsq; ad decimum quartū, vt Guido noster citato cap. docet. Quo quidē modo accipiendi sunt Doctores vltimo loco à me citati, qui oleū, & emolliētia cōmēdant. At cū nec dolor discruciat, neq; initiū vulneris est, etsi est, non secundarię, sed primarię intētionis viam munimus, nec inflammationē remediare, sed vulnus glutinare festinamus, oleum quidē, ceteraq; emollientia perniciosissima sunt, & tunc sine discrimine pessima, cū immodicē, atque immoderatē eis vtimur. Quo sanē sensu legendos arbitror authores, qui p̄dicta vetuere medicamēta. Nā Gal. dum 3. Meth. ca. 2. aduersissimū omniū medicamentū cauis vlcerebus oleū esse ait, de vlcere iam puro, ac prori⁹ mūdo intelligi debet, quod nimirū, oleū potissimum ex immodico vsu putrefaceret, atq; sordidū redderet, eo tpe quo carnis productio nē expositūaret, quā siccis medicamētis cōparatur. Et quod. 4. Meth. c. 1. & 3. art. 3. Medicę cap. de solutiōe continuitatis scribit, ad simplex vulnus quod prima curandi rōne glutinatur, quā oleū suo contactu impedit, non ad id quod cū cranei penetranti fractura sit, & per secundā intentionē mediāte callo, consolidatur (de quo p̄cipuus noster sermo est) referri debet. Quod verō. 6. Meth. c. vlti. ad finē, inquit, cū vehemētissimē siccātibus plures fuisse sanatos, de Eudemi senis opinione vsurpandū est, quā ipse non pbat, sed cū Romę ageret, ciuitatis morē esse secutū, vbi blādissimis medicamētis vtēbātur medici, fatetur. Et si his q blādīs curabātur plurimi non seruabantur (vt ipse ait)

Galēni loc⁹ declaratur.

Authoris opinio circa olei digestiui, & aliorū emollientiū vsu.

Nota quando sicut com-mendatur

Ad uerū quod dicitur nullo mō in Vulneris compos

Declaratur Galen.

Ad uerū quod dicitur nullo mō in Vulneris compos

Alius locus Galeni declaratur.

Declaratur idem Gal.

ait) tā immodicis emolliētib⁹ vſos fuiſſe, vt cerebri membranā putrefacerent, in-
trepidē credas, & magis, ſi commune o-
leum erat, de quo authores in dubio in-
telliguntur, nō de roſaceo, præſertim om-
phancitide, quod non putrefactiuum, ſed
quodammodo ſtipiticitatis particeps eſt,
& ad cerebri membranas corroborandas
plurimum valens: conſtat enim ex roſis,
& oliuiſ immaturis: quo ego vtendum
conſulo. Cui ſententiæ ſuffragari videtur
Dinus Florentinus in Auicēnæ interpre-
tationem dicto cap. de fractura cranei: &
quod ipſe Gal. eodem capi. vlti. ait, mox
& ad finem vſque ſiccis medicamentis
(quæ Græci cephalica, id eſt capitalia vo-
cant) erit vtendum. Rectē ſanē à Guido-
ne tract. 3. cap. de fractura cranei declara-
tur. Niſi dolor, vel aliud ſuadeat. Nanq;
eo caſu aliquantulo olei, non vt vulneris
ſed ſymptomatis remedio, vt licebit,
& qđ Guido de dolore dicit, ad alia ſym-
ptomata, quæ vulneri cōplicari poſſunt,
vt contuſionem, aeris alterationem, in-
flammationem, atque ſubſtantiæ deper-
ditionem (quibus aliquo oleo principio
opus eſt) trahi iure optimo debet. Cæte-
rum quæ de oleo dicta ſunt, de digeſti-
uo, & de alijs emollientibus, neque in ca-
pitis ſolū, ſed quibuſlibet alijs vulneri-
bus eadem ratione intelligenda cenſeo.
Ex quibus omnibus clariffimē conuin-
citur, quantum à rationis, & Medicinæ
præſcriptis abhorreat receptiſſimus ille
inter vulgares chirurgos curandi ſtylus,
quo ſine villo diſcrimine curationis prin-
cipio ad omnia vulnera relaxantibus, val-
deq; mollibus, vt roſaceo commixto oui
vitello, atque capitali emplaſtro (quod
vocant ex emollientibus, quod capitalē
hoſtem rectiūſ dixiſſent) & alijs profuſē
nimis vtuntur. Quorum exuberantia pe-
rioſtium caluariam exteriūſ veſtiens, &
ipſa cerebridura membrana perſæpe pu-

Oleum om-
phancitidē ad
vulnera ca-
pitis opti-
mum.

Galenī loc⁹
interpretat.

Reprehen-
duntur qui
immodera-
tē emollien-
tibus, & ca-
pitali empla-
ſtro vtuntur.

treſcunt, atque inde mors oboritur, cum
maxima iſtorum chirurgorum admira-
tione, quos mortis cauſa quæ interdum
ex paruo vulnere contingit later: obli-
tos illud Terentij, ſcilicet, Ne quid nimis, &
apud Hipp. 2. Aphoriſmorum ſectiōne.
Apho. 5. 1. Omne nimium naturæ inimi-
cum eſt. In hoſ iure inuehitur Vidus Vi-
dius doctiſſimus in Commentario ad li-
brum Hippocratis de vlceribus, & multi
à me & reprehendi, & huius erroris ad-
moniti ſunt. Qui tamen haud emenda-
tiores redditi in peccato ſuo cōſeneſcūt:
tantum valet malē admiſſa ſemel, atque
errans, tempore indurata, ac pertinax do-
ctrina, Heu heu reminiſci debuiffent, il-
lius in hoc ſententiæ. 4. Meth. c. 5. Quod
cunque vlcus ceſin acuto tello eſt diui-
ſum, medicamentum nenæmon, & exic-
cans, & quod ſupurare vetet admittit.

C A P. XIII.

De capitis vulnere ad Diploē
peruenienti.



VLNERA quæ ad Di-
ploen perueniunt, ob cau-
ſas quæ à me. 1. 1. cap. con-
numeratæ ſunt, periculo
non vacāt, & magis eo no-
mine, qđ humiditas quæ duplicitate hac
ſæpē detinetur vel p reſudationē, vel va-
porationē, vel vulneri proximā futurā, ip-
ſi cerebro impartitur, qđ malum tunc po-
tiſſimū vereri debet, cū anceps fractura
eſt, quā trichiſmum, id eſt, arctiſſimum
Rhogmen, ſeu capillarem ſenſumq; ple-
rūq; fallentē fiſſuram Paul. dicto c. 90. li-
bri ſexti vocauit. Eſt enim ſæpē fractura
hæc mortis cauſa, dum ita deliteſcit, vt
à Chirurgo minimē exploretur. Vnde
Hippo. lib. de vuln. cap. quædam (inquit)
oſiſ ſciſuræ, nec ſtatim poſt vulneratio-
nem

Rhogme, id
eſt, capilla-
ris fiſſura pe-
riculoſa val-
de.

De Vulneribus capitis.

47

Mors laborum
utilitas
id est finis.

Rimula quo
pacto explo
randa.

Mastichini
linimentum
melius quā
attramentū
ad rimulæ
exploratio
nem futuris
confutetur.

nem sunt conspicuæ, nec in diebus in quibus dolorum utilitas mors homini contingere potest, quinimò ad tumultum visque improvisa fractura sauciatur comitatur: vocat autem Hippocrat. mortem laborum utilitatem, id est, finem & requiem, quod seculi huius immensus labor non nisi moriendo finiatur. Ergo, ut rite fracturæ pondus experiamur, & humiditati emissarium detur ad alterum, vulneris latus resectionem intra quam triduum (æstiuo præsertim tempore) fieri necesse est. Deinde (quia oculis clarè cerni & specillo explorari rectè, non nisi ampla fractura potest (vt Hippocr. lib. De vulner. capitis testatur) accuratè quidem rimula tentanda est, infuso nimirum super ipsam scriptorio attramento, & scalpris rasione admota, vsque dum, vel attramentum aboleatur, osque lubricū, ac lenè super sit, vel interius permeet: nam attramenti vestigio non manente, non penetrationis: manere autem intrò, penetrationis evidens argumentum est. Ad explorandam tamen rimulam, quæ in sutura aliqua infederit, securius multò mastichinum linimentum, quā scriptorium attramentum, longo periculo à me censetur. Nam cum attramentum futuris, vel iuxta eas infunditur, & os, quo penetratio innoscat necessario raditur, futuræ nervusculi, & ligamēta, quibus dura pender membrana, sæpe simul obteruntur: nec sine magno periculo dilacerantur. In linimento autem mastichis periculum hoc cessat, cum sine ossis rasione admoueatur. Ex quibus autem id constat & quomodo applicandum tibi sit, ut indicium ex illo capescere valeas, iam superius capit. 4. De vulnerum capitis varijs signis tractavi. Alijs verò locis quavis fractura non penetret, non levis ex rasione utilitas comparatur: nam scalpellis, lubrico, ac leni osse reddito, hu-

miditati, quæ ibidem detineri poterat, & sæva temporis tractu ciere symptomata locus minimè relinquitur. Interdum tamen in contusio præsertim vulnere, disruptis interioribus venulis, per attramentum, vel mastichis linimentum internum malum non elucidatur: sed ad ferramenta irrueatibus postea subito symptomatis deuenitur, cui periculo scalpellis, & rasione præclare succurritur: cum os à telo ad Diploen vsque scisum conspicitur: tunc enim sine villo attramento, aut linimento os etiam radimus, ex Galeni præcepto. 6. Methodi cap. ultimo. qui loquitur non in penetranti, sed ad Diploen peruenienti fractura: cuius sententiam sequitur Guido tractatu. 3. capit. 1. de fracturis cranei, illis verbis. Non est igitur excusatio de hac collectione, & incisione, & detectione loci, & prohibitione in carnationis eius, vsque quo securus sis, & si non est timor curius virus vsque ad interiora ossis, quod incidimus. Quæ doctrina dura satis primo intuitu videtur. Cum enim huiusmodi fractura non ad cerebri membranam, sed ad diploen permeet, superuacanea, imo periculosa erit ossis rasio. Sed responsio in promptu erit, si consideres in proposita specie secus atque in penetranti fractura rasione fore moliendam. Nanque hic asperitatem duntaxat abolere, & lubricum os reddere procuramus: ut scilicet diploes spongiformis raritas humiditatem intra se continere, ob verticis ad pus expellendum, ineptitudinem paratissima iam dedolata humorem recipere non possit, sed viâ curationis securam præstet. Verum hoc Galeni præceptum non ad omnē fracturam, sed eam duntaxat, quæ summū caput occupat, accommodatur: ut Guido citato loco eruditè satis aduertit, sed illud in ossis rasione memoria dignū est, si quā inter radendum sanguis aliquis (vt asolet) profluxerit,

et si non
diploen
lo contusio
vulnere sine
attramento
aut linimen
to scalpellis
interdū uti
mur.

Capit. 1. de
fracturis
cranei.

Declaratur
Guido.

Sanguis ex
ratione pro
fluens non se
per interu
malum ari
guis.

fluxerit, non statim censei oportere ab
interna noxa promanare, & consequen-
ter ratiōe penetrare fracturam, quem
errorē incurrere video Chirugos quos-
dam parum exercitatos, qui ut malo, quo
latere credunt, succurrant, ad interiora
vsque os perforare properant, duram ce-
rebrī membranā extraneo aeri frustra
exponentes: falluntur isti planē, nam san-
guis ille non ex interno damno, sed ex
venulis in diploe contentis, ratiōe ob-
tutis, per sepe prodit. Inter eum autem,
qui à dilaceratis venulis emanat, & qui
alius corruptus delitescit hoc interest,
quod si æger nares, & os claudit, ac spiri-
tum retinet, si internus sanguis est, pulsa-
tili quodam motu, & subniger per rimu-
lam egreditur: si verò ex dilaceratis ve-
nulis, sine pulsatione atque rubicundus.
Post admotam ergo ratiōem, ex qua
non penetrare rimulam sed intra diploē
finiri constitit: linamentis & digesti-
uo quod dicunt medicamento, vulnus im-
pleri debet. Facta in vulneris ambitu ro-
facei, & lumbricorum olei irrigationē.

Leniam, ac lubrico reddito osse, reliqua
curandi methodus iuxta doctrinam cap.
11. à me traditam absoluat. Medica-
menta autem, quibus curatio peragitur
ab antidotario vberius petito. Sed illud
præ oculis semper habendum censeo, ut
si postea quam scalpri os dedolaueris,
ipsumque lene reddideris, & qua sympto-
mata (ut interdum præsertim in contu-
so vulnere ipse vidi) concitentur, quæ in-
ternam esse noxam proclamant statim
ad integrum ossis perforationem accin-
garis, ut in penetranti fractura fieri affo-
let. Nam disruptas esse interiores veinu-
las, & supra cerebri membranas diffu-
sas, quarum putrefactus sanguis sympto-
mata huiusmodi cieat, coniectari debes.
Sed iam de penetranti fractura in sum-
mo capite differamus.

C A P. XIII.

De vulnere, in summo capite
ad duram vsque cerebri
membranam, pene-
tranti.



VAND O penetrare ad in-
teriora vulnus ex præceden-
tibus indicijs, & symptoma-
tis interdumque ex ipsa fra-
ctura, aut postea ex admota ratiōe (de
quibus superius latissimus fuit sermo) co-
gnouerimus: ad vulneris amplificatio-
nem deueniendum est sectione facta in-
star. T. si in futuris vulnus contigerit, ut
capite. 11. admonui, vel si necessario ad
modum crucis, apertionem vulnus ex-
postulet, futura prorsus fugiantur. Fu-
gientur autem si eas intactas reliqueris.
Poteris etiam quò magis vulneris labia
dilatentur apertione vti, que. X. literam
similet: post apertionem periostium re-
ctè excoriabis, ne à terebellis postea ad-
mouendis lædatur: febris namque, atque
inflammationes (ut assolent) concita-
rentur. Verum huiusmodi apertio quan-
uis in omnibus capitis partibus securè
moliatur, in temporibus tamen pericu-
losa valde ab Hippocra. libr. De vulnere.
capitis. & Cornelio libr. 8. cap. 4. iure cen-
setur. Conuulsio enim in opposita parte
subsequitur: si vena magna, quæ per tem-
pora fertur secetur, ex Hippocra. senten-
tia. Sed in hoc obijciat aliquis, nihil com-
mune cum venarum incisione conuul-
sionem habere: quia conuulsio, ut eius
ostendit diffinitio, non venarum sed ner-
uorum passio est. Cui respondebis eue-
nire id, vel quia vena illa iugularis, venæ
(quam organicam vulgus vocat, quæ ad
cor recto gradu tendit) ramus est: ex cu-

Sectionis si
gurz.

Apertio in
temporibus
valde peri-
culosa, & ra-
tio.

Responsio.

ius, ut

quis ex ratiōe
dilaceratis venis
manet, & qui ar-
tus inter os & na-
res, non cogit
ut dixerit

Animadu-
er-
tio.

De Vulneribus capitis.

49

ius, ut aliarum venarum, pro fluio, conuulsio inanitionis nascitur: vel, quod fieri non possit, tam insigni venafecta, quæ altè per tempora decurrit, quin delitesceret nervi, temporalesque musculi venæ commixti pariter amputentur, temporum etiam periculum ostendit Galen. 1. de vsu partium. capit. 3. Hippocratis verba recitans, dū ait. Quare rectè dixit Hippocrates lætales plagas & sopores in

temporibus fieri: unde certè Salmantica vidi hominem subito mori ex quadam percussione, absque vulnere in tempore inflata. Hoc idè euenire pbat Cornel. citato cap. his verbis. Nec id vitium vllum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert: sed ibi quoque nihil tutius fit. Quæ verba quia obscura satis, & inter se pugnantia videntur, id volunt, siue aperias, siue apertione superfe-deas periculum imminere, quia nihil tutiù fit, quod aperiendo læthalia sympto-mata ab Hipp. commemorata conciten-tur: non aperiendo. ad interiora prola-psum pus, membranę cerebri putrefactio-nem inducat: quasi (quod est in verbo)

Auribus lupum teneamus. Aut certè verba illa secundariò in contrarium sensum capi poterunt, ut, scilicet, velintquamuis vulneris amplificatio in temporibus peri-culosa ac sæpe læthalis sit, certius tamen, ac inuitabiliùs futurum periculū, si non dato per apertionem emissario, viriosa humiditas interiùs dimittatur: quàm si temporales musculi refecentur. Cum ergo ex duobus malis minus seligi debeat, inquit Cornelius, nihil apertione tutius esse, cui interpretationi consonare videntur ipsius Cornelij verba illa lib. 2. capit. 10. melius est anceps experiri auxilium, quàm nullum: & Galen. 10. metho. cap. 1. quibus alia salutis ratio non est, & quæ vnica videtur, ex dubia est: necessum arbitror, ijs est, aduersos periculis ire ex

quibus constat ut periculis plenam fugiendam fore in temporibus sectionem: & si quando coactè ad eam deueniendum sit, tunc solum, cum iam sæua coegerint symptomata, factò priùs periculi pre-sagio fiat, quod in alijs capitis partibus secus est, non enim aduentus sympthoma-tum ad ossis perforationem expectatur. Peracta igitur sectione vbi candido oui ætate frigido, hyeme tepido, nisi sangui-nis profluuium insliterit linamentis ma-defactis, vel si oua nō sese obtulerint, sic-cis manu compressis, aut frigida infusis, qua Cornelius vtitur lib. 5. cap. 26. vuln^o impleueris: pannum oxirato madidum atque expressum desuper impones. Cu-ratio autem secunda in triduum differa-tur, tum ut humorum ebullitio conquie-scat, tum etiam ut sanies confici queat ex Galen. 5. metho. cap. 4. & Cornelio libr. 5. capitul. 26. de glutinatione vulnerum. Sed interim virtute, & ætate ferentibus, vena secanda est ex Auicennæ senten-tia. 5. 4. tractat. 3. cap. 1. & Gale. 6. metho. cap. 5. Hippocratis, de vulner. capitis, & aliorum: aut si imbecillus, vel enervatis viribus, ægrotans fuerit, non princeps ve-

na, sed venarum ramusculus aperiendus, ut ex Auicennæ sententia colligi potest 22. 3. tracta. 2. cap. 25. & clariùs. 3. 4. tract. 3. capit. 3. nec enim sic spiritus, & natius calor exhalant, præterquàm q sanguinis missio magis à corde distabit, & à mino-ri vasculo haurietur. Accedit, q cum san-guis intra calidam aquam, tunc mittendū sit, non perinde natura debilitabitur, ac si à principalibus. venis mitteretur. Sed si ob contractas aut imbecilles vires venam aut ramum tundere formidamus securè, nec cum obscura vtilitate cucurbi-tula atligitur ut Cornel. probat lib. 2. cap. 10. At si hemorrhoidarum cōsuetu efflu-xio cessasset vel si vulneratē iuueni formi-næ menses supprimerentur præstaret ex

Venarum tra-muscul^o nō vena ægro-tanti imbe-cillo, aperi-tur, & ratio.

Cucurbita-la quib^o san-guō ob fra-ctas vires nō mitti fecu-re atligitur.

D ralo

Cephalica
vena com-
modissima
secunda.

ralo venam secare. Caterum si in curationis processu ubi ex alijs communibus venis sanguinem misisses: de nouo mittere oporteret Cephalica regione vulneris commodissima vena est. Propterea autem in capitis vulnera sanguinis missione vtimur, vt scilicet, sanguis cum vaporosis exhalationibus reuulsu ad alias particulas euocatus à capite arceatur. Exhibeatur interea syrupus rosaceus mane & serò aque intubi mane commixtus, quò sanguis atque bilis temperatioris & crassiores redditus parcius ac segnius ad vulneratam particulam confluant nam sanguinem ad vulnus defluentem, & bonum & temperatum, & mediocrem Galen. desiderat. 4. metho. cap. 1.

Vitæ ratio
quomodo
instituenda.

Quod ad vitæ ratione pertinet virtute & ætate ferentibus tenuis iniungenda est secus vero non. Nec enim quidquam stultius esse potest, quam in saucia ris omnibus eundem victum æque obseruare: namque sic, suturem eadem forma omnes calciantem similem vt Galen. 9. metho. cap. 16. lepidissime contra Thesalum ait. Sunt enim & variaz temperaturæ ætates, consuetudines, naturæ vires, multaq; alia diligenter consideranda ne in vitæ ratione erretur sed vnusquisque pro sua conditione capiat: Hoc igitur ob oculos posito, illa curationis principio conueniunt, lactuca, borrago, cucurbita odorifera poma, damascena pruna, malogranata dulcia, amyllum, far, variez hæc omnia condita, lentes excorticatæ vel integræ que licet à Gale. 2. ad Glauconem cap. de canero, & alijs in locis bilis atræ procreantes censeantur, quia tamen sanguinem ad vulnus principio fluentem, crassio rem, atque frigidior em reddunt: à recentioribus iure permittuntur: noctu propinabis amigdaletum clarum, quantum uis vulgares chirurgi relutent, quod scilicet, ad caput vaporet &

Amigdale-
tum, defen-
datur.

Lentes pro-
banur.

Amigdale-
tum, defen-
datur.

in flauam bilem conuertatur falluntur enim isti planè nam etsi eis concederemur in amigdalibus integris id incommo di reperiri, at certè cessat in amigdaleto quod est amigdalorum excolatus cremor, & tanquam optimum ad cerebri membranarum inflammationem & dolorem pleuriticum ab Auēzohare suo thesir mille laudibus effertur sed si friuolam illam euaporationis suspicionem fugere velis, frigida semina illi commiscere poteris. Post prandium & cænam, coriandrum præparatum & saccaro delibutum vel cidoniorum confectio nem exhiberi conueniet vt his vaporum exhalationem ad caput tendere impediamus, ius pulli & ipsa caro etiam in esu sunt, & medici prudentiæ erit iuxta infirmi virtutis robur & symptomatum incursum, vel remissionem, vel augere vel extenuare cibum vsq; dum ad gallinaceam, arietinam, hædinam, atque etiam vitulinam carnem, eorumq; extremitates quæ maxime ad calli productionem facere perhibentur, deuentum sit: & tandem ad cõfuetos in sanitate cibos æger reducat. Porus, ex frigida recentibus plagis, magis quam antiquis vlceribus conuenit vt ex Hippocrate. lib. de vlceribus colligitur. Pluuialis verò forsan quod influentiarum celestium particeps tenuior ac depuratio est à quibusdam laudatur quam alij cum albo saccaro, aut rosaceo coctâ propinant, vinum post actum viginti- mum diem parçè & per duas horas anteporum dilutum securius datur, sexta verò à vulneratione die, vel manna, vel electuarium diacatoliconis, vel simile lenitium prout magis conuenire prudens medicus censuerit: exhibeatur modo meminerit in exhibendo pharmaco vt etiam in sanguinis missione: humorum concoctionem & criticos dies minimè esse consideranda sed prorsus negligenda,

Frigida an-
tiquis vlc-
eribus magis
quam recentibus conue-
nit.

Pluuialis a-
que laus.

Vinum qua-
liter propi-
nandum.

De Vulneribus capitis.

51

Critici dies
ad pharma-
ca & sangui-
nis misio-
nem in vul-
neribus mi-
nimè atten-
denda.
Solutium
pharmacum
capite vul-
neratis con-
uenit.

da, vbicunque enim vel necessitas impu-
lerit vel ratio suaferit vtendum illis arbi-
tror nam humoris concoctionis & criti-
corum dierum illa contemplatio: in fe-
bribus corpus citra vulnus inurentibus,
non in vulnere ritè obseruatur. Soluti-
uum verò pharmacum tanquam incen-
dium & commotionē: atque humorum
ebullitionem inducens capite sauciatis
porrigere quidam reformidant, quos &
ratione & autoritate destitui video,
nam (vt à parente Hippocrate incipiam)
ipse libro de vlceribus, corpus purgare
in vulnere capitis apertè præcipit & li-
bro de vulneribus capitis vbi medica-
mento quod bilem ducat, vires ac robur
hominis medico respiciente: vtendum
fore imperauit quem sequuti sunt Paul.
libr. 6. capit. 90. ad finem Auicenna. 1. 3.
tracta. 2. cap. 2. 6. & tracta. 3. capit. de cura
charabiti quo in loco ad inflammatio-
nem membranarum cerebri considera-
ta prius consuetudine & temperatura:
scamonia hominē purgari docuit idem-
que. 1. 2. 3. tracta. 1. cap. 9. de cura casus vir-
tutis cordis, scamonia alijs medicinis
commixtam ad materiam cordi nocen-
tem, pellendam commendat, vt inde a-
pertè colligere possis: securiorem longe
esse in capitis vulnere: idem. 5. 4. tracta.
3. cap. 1. de fractura cranei in hæc verba.
Quod si apostema calidum perseuerat
& non est aliquid quod prohibeat sume-
re medicamen solutium, soluens semel
fiat, namque Hippocrates. præcipit illud
in qua serie obiter noto, verbum semel,
nec apud Hippocratem. nec apud Paul.
extare, sed ab Auicenna additum, sed e-
ius sensus erit, vt Nicolo Florentino pla-
cet sermone. 7. capit. de fractura cranei
vt semel pharmacum sumatur nec itere-
tur. Guido etiam noster tracta. 3. capi. de
vulnere cum confusione & parua fra-
ctura exhibendam esse solutiuam medi-

Auicennade
claratur.

cinam probat, & Razes. 1. continentis v-
bi ad capitis vulnus cochias quas dicunt
pilulas commendat nec huiusmodi au-
thorum traditiones ad leniter purgantia
referendæ sunt, cum earum medicina-
rum maior pars nempe cassia, Diacatho-
licon, Rhabarbarum Hippocratem. sal-
tem latuerit & licet non latuisset non e-
ratur de lenitiuis diceret, scilicet, respi-
cere oportere vires hominis neque cur
Auicenna imperaret vt semel dumtaxat
pharmacum exhiberetur quando certis-
simum est & pueris & prægnantibus le-
nitium securè propinari. Ergo de solu-
tiuis accipiantur necesse est. Ego tamen
longa experientia edoctus, vulneratio-
nis principio lenienti medicamento v-
tor: tractu verò temporis reurgente so-
lutiuo miti, nanque hoc modo fortis me-
dicina debilis redditur vt ex sententia A-
uicennæ. 3. 4. tractatu. 2. capit. 4. 1. de cura
tertianæ non puræ. Hæc de prima vulne-
ris curatione & vniuersalibus præceptis
quæ ad victus rationem & corporis ena-
cuationem dixisse sufficiat, reliqua docti
medici peritiæ omittimus. Secunda verò
vel tertia curatione vbi iam de fracturæ
penetratione non dubitatur ad oſis per-
forationem accingendi sumus de qua se-
quētibz capitulis latissimè disseremus.
Sed ante licebit indagare. Sequenti cap.
an possit cranei fractura penetrans absq;
perforatione eius curari.

Authoritate
ca solutiuū
pharmacum
sententia.

CAP. XV.

An in vulnere capitis pene-
tranti necessario os sit
perforandum.



ON sine controuersia à
nostris authoribus tracta-
tur an videlicet, perfora-
tione, an solis medicamen-
tis curari penetrās, debeat

si fractura

D 2 & sua

Quod in pe-
netranti val-
nere non sit
os perforan-
dum, argu-
menta.

Quod per-
forandū sit
os ostendi-
tur.

Cap. 9. Ance-
lenti.

& sua vtraque pars argumenta habet. Et negatiua illa quod cum ad ferramenta & ossis terebrationem peruenitur: extra-
neo aeri cerebri membranæ exponun-
tur; commotioneq; dolor excitatur atq;
inde inflammatio confurgit, vnde conci-
liator huius sectæ potissimus propugna-
tor differentia. 181. laudabilior est (in-
quit) medicatio vnguentis & emplastris
facta quam ossis eleuatione inducta. Sed
quia in isto curationis modo omnes non
conueniunt, est: aut quia medicamen-
ignorant, aut quoniam verecundantur à
consueta secta secedere. Eiusdem etiam
sententiæ sunt Theodoricus, & Genue-
ses medici. In contrariam autem ire co-
gunt efficacissima certissimaq; argumē-
ta quod sphaericam figuram caput reti-
net nec glutinatrices deligaturæ, quibus
fracta ossa committi solent neque expul-
trices: quibus illabi materies impeditur,
aut iam illapfa expellitur adaptari com-
mode possunt. Rursus cum callus vel sar-
coides porus in sui productione. 35. dies
consumat, & tandem quam rarissimus
producatur, ob causas, quas dum de iudi-
cij ageremus tradidisse memini, veren-
dum iure est vt in tanta mora sanies, aut
quæuis humiditas per rarum porum ad
duram cerebri membranam permeaue-
rit, cui malo ossis perforatione succurri-
tur, qua si aliqua sanies intus delitescit,
proditur, extrorsum trahitur, & membra-
na purgatur, eum procul dubio concreta
sanies emissario carens si dimittatur: me-
branæ corruptionem ingerat: idque est
quod ait Galen. 6. metho. capit. vltimo.
Nam si nulla ex læsis partibus sanies in-
tro conflueret superfluum esset os excin-
dere. Adhæc si in aliorum ossium fractu-
ra quando sanies aliqua interius later de-
tergere oportet: quanto magis à cerebri
medulla cuius corruptio ipsa mors est,
malum hoc auerti debet. Præterea quam

uis solis medicaminibus penetranti pla-
gæ mederi posse aduersæ factionis autho-
ribus fateremur citra commodissimam
deligaturam, prodesse nequit, cuius re-
cta applicatio ob capitis figuræ ineptitu-
dinem (vt nuper diximus) difficilis est.
Quibus ducti clarissimi nostri authores
in hanc sententiam libenter conuenie-
runt & nominatim Hippocrates. lib. de
vulneribus capitis. Gale. 6. metho. cap. vi
timo. Auicenna. 5. 4. tracta. 3. cap. 1. de fra-
ctu, cranei & Guido tract. 3. dicto. 2. cap.
1. Cornelius etiam lib. 8. cap. 4. eleganter
hoc explicat dum inquit, os fractum nisi
succursum est, grauibz inflammationi-
bus afficit difficiliusq; postea tractatur,
in quo Cornelii ego obseruo, nisi paulo
atentius legatur, contrarium sibi videri
cum eodem capit. 4. illa addiderit verba,
in omni verò scito fractouè offe protin-
antiquiores medici ad ferramenta venie-
bant, quibus id exciderent, sed multo me-
lius est, antè emplastra experiri, quæ cal-
uariæ causa componuntur, sed nulla in
Cornelio pugna est, cum primaverba de
occulta penetranti fractura: alio loco quā
quo vulnus est facta, secunda vero de ea
quam à principio symptomatum nō pro-
dit incurfus intelligantur: nam in hac fra-
ctura prius emplastra tentanda, quā ad
ferramenta deueniatur in illa protinus te-
rebratione vtendum, cum ex symptoma-
tis, sanguinē ad interiora esse prolapsum
manifestum fiat. Idemq; in alia etiam fra-
ctura fieri oporteret, si symptomata, quæ
principio ad quintum vsq; diem non ap-
parent. deinde infestassent, abijcienda
enim tunc emplastra essent & ferrame-
ta paranda: vt idem Cornelius præcipit,
cum inquit, tunc ad manum scalprum ve-
niendum est. Sed quomodo conciliabi-
mus Pauli seriem libro. 6. cap. 90. qui in-
ter se dissonus satis videtur inquit enim,
Si Rhogme solum angusta, & pilosa sen-
sum

Declarator
Cornelius.

Paulus con-
trarius sibi
videtur.

De vulneribus Capitis.

53

Aduerte.

Defenditur
Paulus à re-
pugnantia.

sum fugiens medicamento aliquo nigro liquido vel etiam ipso atramento scripto infuso os rademus ipsa namque Rhogme nigra ostenditur, conuenitque rasurę tandiu insistere quousque signum Rhogmes aboleatur, & mox, inquit, si ad cerebri usque membranam peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabimur utrum membrana ab osse recesserit, an affixa permaneat, & paulò infra subdit, & si medicus rem negligentius tractet nec perforatione utatur, hoc grauiora oboriuntur symptomata nempe bilis, vomitus, conuulsio, mentis delirium, febris acuta: quę verba manifestè contraria videntur. Sed quidem (nescio profecto an rectè nonnulli opinantur, Pauli sensum forsan esse ut velit strictam fracturam atramento super infuso & rasione explorandam: tandiu radendam esse donec ipsius signum aboleatur. Sed si perforationem constiterit ad cerebri usque membranam penetrare: a rasionē cessare oportere, & considerare an ipsa cerebri membrana naturalem situm suum obseruet, quod ex signis ibi traditis coniectari licet. Si seruauerit, quāuis Rhogme, id est, capillaris cranei quę apparebat fractura penetret, sola rasionē curatur. Si verò nō seruauerit ob vitiosam humiditatem per rimam cranei illapsam membranam separantem (quod numerata symptomata ostendunt): tunc demissa rasionē ad ossis perforationem, scilicet, perterebellam abastam deueniemus, quam si neglexerit medicus: grauiora oboriuntur symptomata. Ergo cum Paulus primò inquit, Os rademus: rasionem intelligit quę principio cum fracturę penetratio exploratur, fit. Cum verò subdit non rademus, id est, à rasionē cessabimus tunc intelligit, cum fracturam penetrare rasionē ipsa compertum sit. Tunc enim si ex symptomatis membranę recessus colligitur, nul-

lum rasio faciesit negotium, Sed ossis ampliori perforatione succurritur quę terebellis vel modiolis molitur, quò maior locus concreto iam puri pateat, præterquam quòd velocius multò opus quàm rasionē absoluitur. Sed hæc quidem explicatio non satisfacit intellectui, recessus namque membranę ab ipso osse, quem Paulus inquit, vel eius cum craneo affixio, vel symptomatis dignoscitur vel oculis cernitur, non quidem primò, nam quantumuis fortibus symptomatis nullo modo hanc adherentiam vel separationem membranę ab ipso osse intelligere possumus, præsertim quia ipsa membrana tument, & non submissa ab osse: sepius prædicta symptomata euenire consueuere. Neque secundò si oculis enim separatio membranę, vel affixio cum ipso osse aperte cernitur, non opus est ampliori perforatione. Ergo in pposita à me quęstione quid sentiam in medium afferre non grauabor: equidem si mea sententia aliquid valeret: inter arctam & amplam fracturam discrimen aperte constituerem, ut in ampla quę eo usque patet ut naturali membranarum motu ipsoque vulnere occlusis naribus & ore sufflante, cōtenta interius humiditas expellitur, ac perinde emundantia medicamenta ad duram membranam facili penetrant: nulla opus sit ossis perforatione idque ex Hippocratis verbis facili colligi potest, dum libro de vulneribus capitis, ait, Dissectio ipsa si magna, & ampla fuerit perforatione non indiget, cui etiam sententię subscribere videntur Niculus Florentinus sermone. 7. capit. de fractura cranei & Gentilis in Auicennę commentario super. 3. tracta. 4. capit. 14. In arcta verò penetrante rima cum res multò aliter se habeat quia neque medicamenta per illam illabi, nec pus egredi potest, perforatione uti conueniet. Sed ita demum si

Authoris
sententia in
ossis perfora-
tione.

symptomata tollantur : Nam si illa cessant & medici voto omnia prosperè succedunt , per medicamenta curatio molietur , nec ad perforationem statim deuenimus donec symptomata suaferint , vt cum Cornelio nuper diximus : quando verò symptomatum incipit incurfus nemo ad terebrationem accingi dubitabit . Cum ipse Conciliator perforationis ossis contradictor illam hoc casu approbauerit . Sed nec rigoribus apparentibus ossis perforatio statim molienda , donec liquidò constet ab interno nocumento prouenire , cum soleant ex alijs etiam causis proculdubio in-

In ossis perforatione
duo committi
solent errata.

nasci , vt capitulo nono late annotauimus , namque in ossis perforatione duplici temeritate quidam vti consueuerent , altera dum statim vix villo emergente symptomate os terebrant , altera , vbi post multos dies à symptomatibus , perforationem protrahunt , vitiosa enim talia extrema sunt . alios etiam duos casus vbi ossis perforatione vtendum est tradit Lanfrancus Mediolanensis libro . 2. capitu. de curatione fracturæ cranei quæ sit in modum rimulæ , vnum quando cerebri membrana ab osse aliquo comprimitur , alterum cum ossis cuspis duram pungit membranam , laudo hominem bene doctum cuius consilium libenter sequor , à quo tamen dum præter dictos casus perforare os se non audere fatetur : planè discedo , cum certissimum sit quando symptomata sæuiunt citra vllam punctationem , vel compressionem in arcta penetranti fractura , perforatione vti oportere . Ex his quorundam curandi sty-

Lanfrancus reprehendit.

Quorundam curandi sty- lus reprehenditur.

lulum non iniuria reprehendo , qui in secunda curatione , sine vllis symptomatibus , & sine magno ægrotantis periculo , nulloque facto discrimine in penetranti fractura os terebrare pro-

perant : exponūt enim temerè extraneo aeri cerebri membranas & quam concipere salutis spem poterant , in certam sæpè desperationem conuertunt , & si forsan improuisa salus contingit id præter rationem , & (quod communi pro- uerbio dicitur) rectum ab errore est.

C A P. XVI.

De octo Guidonis documentis , ad ossis perforationem in penetranti fractura obseruandis : & eorum explicatione.



VM IAM AD MANUS , ossisque perforationem deueniendum fore constiterit : operæpretium erit , doctissimi Guidonis nostri octo præcepta , in opere moliendo præ oculis habere , quæ interpretari nunc pro virili conabor.

Octo Guidonis documenta.

Primum (inquit) in eo in quo virtus est debilis , non exerceatur operatio quia secundum Galen . 2. Aphorismorum vbi est indigentia non oportet laborare.

Primum documentum.

Locus hic Hippocratis est Aphorismorum decimosexto . qui noua translatione sic habet , vbi fames , laborandum non est , & Galenus in commentario interpretatur , idest , labor iniungendus non est , ei qui fame laborat , & famem usurpat , pro quali-

Hipp. locus declaratur.

bet

De Vulneribus capitis.

55

bet corporis imbecillitate, siue vigilia, siue alui solutione, siue ciborum inopia proueniat. Idem erit si sanguinis profluvium præcesserit, aut si ægrotans puer, vel contractis viribus senex sit, in quibus ad ferramenta deuenire non oportet quia laboriosum opus fortem virtutem expostulat, quæ cum cessat, ab opere iure optimo abstinendum est, aliter enim ægrotans facile consterneretur, ut enim fortis virtus inopinata facit, sic debilis quibuslibet contristatur. 10. methodi. capit. 10. Galeno asseuerante. Accedit etiã quod huiusmodi præsidium plurimum alijs profuturum, inde apud vulgus infame redditur: nam ut Galen. eleganter inquit. 1. 1. metho. capit. 9. in quo desperata omninò salus est imprudentis consilij fuerit, apud vulgus infamare præsidia, quæ multis fuere saluti. Cæterum ubi os aliquod membranam vel comprimit vel pungit indeque sæua ac lethalia irruunt symptomata, cogimur quidem mortis prius præfagio factò, os eleuare, aut extra here: teste enim Cornelio, lib. 2. capi. 10. melius est anceps experiri auxilium, quàm nullum. Licet idem lib. 5. cap. 22. contrarium docere videatur, dum ait. Est enim prudentis hominis, prius eum qui seruari non potest, non attingere quæ verba cum Galeno citato capit. 9. conueniunt, sed prima Cornelij series de dubia salutis spe, secunda, de prorsus desperata salute intelliguntur.

Cornelius à repugnàtia defenditur.

Secundò documentum.

Secundum præceptum est (ait Guido) ut ante omnia protestetur de periculo, ut homo euitet sermones stolidorum, in quarto canone Auicennæ.

VT author est Auicenna. 2. 4. tract. 1. cap. 3. & 4. 4. tract. 2. cap. 10. & Hip

po. prognosti. 1. cap. 7. & ibid. Gale. in cōmē. multisq; alijs in locis, in morbis, siue prosperæ siue aduersæ valetudinis sit, maxime apud homines medico cōmendāt prædictionē, quare nō absre eam curā in præfenti in ofsis perforatione medico in iūxit noster Guido, idq; fieri oportet ubi cumq; periculū imminet, ne in posterū, (ut recte aduertit Cornelius) si malo ars victa fuerit, vel fefellisse, vel ignorasse videatur, sic enim detractoribus locus non datur, suadeo tamen ne vel salutem polliceri, vel certā mortē præfagire audeat, sæpe enim (dicit Auicenna) sanantur aliqui absq; spe mirabiliter &c. Et contrariò ex paruo vulnere ægri moriunt, vñ cōceptibus quasi duplicibus, & veluti verbis conditionalibus sententiā proferat ex Gal. sententia. 3. de locis affectis & alijs in locis.

Tertium documētum in hæc verba tradit Guido, in operatione fugiat commissuras quantum poterit: timēdum enim esset de casu, & læsione duræ matris.

Tertio documentum.

CV M neruosa membrana totū cranium vestiens, ut ex anathomis administrationibus liquido constat, à dura cerebri membrana per futuras oriatur: fit, ut ex rasure, vel terebratione ibidem facta, incisis neruulis, quibus vtraq; membrana cōmittit, ipsa dura meninx ea parte rescissa super cerebrum decidat, iure ergo optimo suadet Guido, in rasure, vel terebratione molienda à futuris, quantum fieri licebit, discedere. Quod si obieceris, superesse neruulos alios quibus intactis relictis membrana colligata fulciat: respondebo, satis imminere periculi ex cuiusvis particulæ casu, tū pondere infueto, tū obëtorū neruulorum compassione, ex quibus nō leuis noxa vicinis inge-

D 4 ritur,

ritur, & vt Lanfrancus ait, loco supra cita-
to, & alij probant, periculosior est quam
ipsum vulnus, in futuris admota rasio,
vel perforatio, nam vulnus incisione tan-
tum, rasio verò & perforatio neruifculo-
rum diruptione, & magna commotio-
ne, & dolore forti inflammationem in-
ducentibus lædit. Sed dicit aliquis, non-
ne in coronali sutura, fonticulus actuali
cauterio aperitur, & interdum os radi-
tur, vt in comitiali morbo, & oculorum
antiquis fluxionibus quò perniciosus hu-
mor deriuetur & euaporet, multorum
dogma est: Cur ergo rasionem, vel perfo-

Obiectio.

Responsio.

rationem reformidas: cui ego, non al-
tam, sed superficiale[m] rasionem, qua nul-
li obierantur neruuli, in fonticulo fieri
oportere assero: verum si penetrans vul-
nus futuris, potissimum in vertice conti-
gerit: in angusto quidem spes est, si enim
illap[sa] humiditas intus contenta, relin-
quitur, certissima mors consequitur: si au-
tem rasio aut perforatio inducitur, quod
diximus malum incurrimus. Quæ igitur
seligenda via erit, vt certè hoc casu,
aut solis emplastris contenti, iuxta Con-
ciliatoris & aliorum (quos præcedèti ca-
pite citauimus) sententiam: rasionem,
vel perforationem fugiamus, aut non fu-
turis, sed prope ipsas, in sano osse quod
cum læso committitur, opus molimur
vt Hippocrates libro de vulneribus capi-

Animadu-
er-
tio ad ossis
perforatio-
nem.

tis & pleriq; alij docuere, Nec ex vtraq;
parte futuræ ipsa mediæ relicta, os perfo-
rabimus, yr quidam ex neothericis vole-
bat. Quòd scilicet si vnicum foramen fie-
ret, neruofum discrimen internam mem-
branam cum externa craneum ambien-
te, connectens: insinuatum pus ab vna
parte dumtaxat, non vtrinque expelli
permitteret: id enim in vulnere ab inci-
dente telo factò falsum est, cum si pen-
etrans vulnus est, præcisum esse discrimen
illud fatèri debeam: sed id, si qñ verè est,

in contuso vulnere ex magna percussio-
ne est: nā discriminē illud sua mollicie per-
cussioni cedere, & à diruptione liberari
nō difficile poterit quod secus inciso vul-
neri cōtingit, Cæterū vbi cōpressum fu-
turæ os est, quia periculū imminet, nec a-
liud superest remedium, licebit, imò coa-
cti ad ferramēta (cautè tñ) veniemus, nā
vt Gal. 10. meth. c. 10. vt supra adduxim⁹
quib⁹ alia salutis ratio nō est & quæ vnica
vide[re] ea dubia est: necessum, arbitror, ijs
est, aduersos periculis ire. Ego verò hoc
casu os sanū cōpresso adhærens: crebris
foraminib⁹ perforare, deinde eleuatorio
instrumēto paulatim cōpressum oseleua-
re aut vna aut pluribus curationibus so-
leo, factò in osse emissario, quò & sanies
expelli, & ingredi medicamētum ad inte-
riora posset: etiā si totū prorsus os nō ele-
uetur fat erit, præsertim si motus mēbra-
narum cerebri apertè percipiatur. Quar-
tum documentum his verbis tradit.

Caueat de plenilunio, quia in
eo cerebrum augmentatur
& ad craneum appropin-
quatur. 3. de criticis diebus.

Quartū do-
cumentum.

LVNA nouissimū sydus terris fami-
liarissimum (vt Plinianis verbis uta-
mur) quamuis suapte naturæ quia corpus
densum & opacum ex Astronomorum
sententia, nec augmentum, nec luminis
decrementum capit, quo ad nostrum hæ-
misphærium: tamen solaribus radijs qui
è directo ei correspondent, iam prorsus
illuminata, nostris oculis plena videtur:
tanta enim eius portio lucescit, quantam
sol apiscit. In hoc igitur plenilunij tem-
pore, non cerebrum solū, sed ceterorū a-
nimantiū ossiū medullas, imò plātas, flu-
mina, maria, reliquasq; humiditates au-
gescere, nemo est q nesciat. Nā quæ luna
quæ

In plenila-
nio omnis
humiditas
augetur.

De Vulneribus capitis.

57

Luna humi-
ditatum ma-
ger.

quæ humiditatum mater creditur, siue in fluxu suo, siue lumine, siue motu eas replet, & caloris à sole sibi mutuati reflectione, calfacit, rarefacit, ebullire cogit, ut sic amplificata maiorem multo locum occupent. Vnde Auicenna. 4. 1. capi. 2. 1. De ventosis. & 2. 4. tracta. 2. ca. 2. de causis dierum crisis crescete (ait) luna in suo lumine, humores mouentur, & ebulliunt, & ideo augentur, & cerebrum in craneis, & aqua in fluminibus accessiorem, & recessiorem habentibus, quod tradit etiam Galenus loco à Guidone citato, nam, ut sol annum perambulat, sic luna mensem per septenos dies peragit, ut Galenus dicto loco probat, & veluti solaribus obliquis radijs hemispherium nostrum peruadentibus, humiditates coguntur hieme, atque durefcunt, & contra, verno tempore amplificantur, & eminent, sic luna in omnes humiditates operatur, in decrectione comprimendo, in plenilunio replendo, dilatando, atque rarefaciendo. Sed pretium operæ erit ad discere qua augmenti specie cerebrum reliquæque medullæ, per plenilunium amplificentur. Nam secundum Philosophum primo de generatione & corruptione capit. quinto. triplex est augmentatio, altera cum vi magnitudinis quæ accrescit pars quælibet maior efficitur. Altera dum cuiuspiam aliquid accedit. Tertia quando pariter seruat, & manet id quod accretionem subit. Sed etiam reperitur augmentatio alia, cum quantitas extenditur per ebullitionem duntaxat, & rarefactionem nulla de nouo quantitate suffecta, sed calore concitante, ut feruescente multo in dolio, vel in testa semiplena aqua igni exposita videre est, ut colligi potest ex Auicenna dicto capitulo secundo. de causis dierum crisis. Et hoc certe modo cerebrum, cæteræque medullæ in plenilunio augefcunt. Iure

Triplex est
augmenta-
tio.

Alia augmē-
tatio.

Alia augmē-
tatio.

Suscepta

Figura omnia Summa virtute lune augefcunt,
luna namq; ea rarefaciendo augmentat.

ergo doctissimus noster Guido in ossis perforatione fugiendum fore plenilunium censet, ne adauctum eo tempore cerebrum eminens, atque craneo adhærescens, à ferramentis offendatur, sed lunæ decrementum expectari conuenit, quando cerebrum in locum suum reuertitur, per id enim tempus cunctæ humiditates decrefcere creduntur. Hinc, in proscindendis lignis, & ædificiorum trabibus inoleuit vsus, ut non plenilunio, sed dum luna decrefcit rescindatur, ne carie corrodamur, quod præter alios Vitruuius libro secundo. de materia cædenda cap. nono. docuit. Aliter atque in colligendis herbis quæ plenilunio collectæ viridiores, & cum maiori virtute, atque vi conseruantur, ut auctor est Hippocrates in quadam epistola quæ eius nomine inter opera Scribonij Largi extat, fruges etiam plena luna adauget maturatq; celerrimè ex Galeni sententia tertio. de diebus decretorijs. Cæterum aliud etiam ex plenilunio promanare commodum dicitur, quod eo tempore comitialis morbus intermittitur, vel breuioribus, atrem periodis hominem ex cruciat, ut asserit Laurentius Iouertus tractatu. de Epilepsia, cuius ratio illa reddi potest, quod dilatato per plenilunium cerebro perniciosus humor, qui antea confipatus intra cerebri ventriculos vigeat, iam euaporans, ac diffusus vigorem suum exuit, virtus enim vnificata fortior quam si dispergatur experiri solet. Sed cum plenilunij mutationes quàm breuissimæ, & celerrimæ censeantur, vsque adeo, ut mutatio ex incremento ad diminutionem exactè in puncto fiat: coniunctionales verò mutationes diuturniores, cum tunc temporis luna obscura ac luminis fere expers reddatur, ut probat Galenus dicto capit. secundo. non malè addubitabis, quod tempus post plenam lunam

Luna nō in
plenilunio,
sed in lune
decremento
rescunda.

Plenilunio
comitialis
morbus re-
mittitur.

no 253 quare in p
lunio epilepsia 2

Dubitatio.

quo tempore tra
post plenilunio
za medica ex
simus.

D 5 ad ossis

Ptolomei
sententia repre-
henditur.

ad ossis perforationem, seu quamlibet aliam manulem operationem securum arbitrabimur. Et si Ptolomæum in suo centiloquio, consulis, ex illo suboscure intelliges, vigintiquatuor horas à plenilunio spectare oportere, quæ sententia ex supradictis manifestè refelli, ubi constat lunares mutationes, quàm ocysimè dilabi, vnde consequitur parcissimi temporis moram fore contrahendam. Alij solum per duas horas post plenilunium opus demorantur, mouentur isti quod duarum horarum terminus, non motus proprii diuturnioris, sed raptus, vnius signi peragrationi statutus, atque præfixus creditur. Sed in mittendo sanguine his verbis vtitur Nicolaus Simius, neminem denique lateat Solis & Lunæ congressum, tribus diebus ante, & post suspectam reddere minutionem, de qua videndus est Chæus suæ Chronographiæ tracta. quarto. Ego autem in ea sum opinione, ut si res vrget, esse nimirum cerebri membranam comprimente, aut pungente, aut quopiam alio malo cogente per omnem lunarem mutationem ad manus peruenire conueniat, quod & in secanda vena, & in exhibendo pharmaco statuendum censeo cum de grauiori damno remediando tractetur. Quintum documentum tale est.

Sententia au-
thoris.

Quintum do-
cumentum.

Quintum, quod dilatio fiat in loco decliuiori, quia talis est aptior ad expurgandum therapeutica. 13.

Præceptum hoc in penetranti fractura non parui momenti est, & auctorem habet Galen. 13. Metho. emissarium enim decliuiori loco factum cauis vlcibus commodissimum ad expellendum pus, experimèto comprobatur, sed & si communiter hoc accadat, contrariū

tamē in capitis vulneribus interdum experimur, ut cum plaga talis est quæ versus cerebri membranam superiori parte, aut comprimitur, aut pungitur, tunc enim ad superiorem fracturæ partem, & perforandum os, & in suam sedem necessariò reducendum est.

Sextum documentum, quod in dilatando non consequatur finis fissurarum &c.

Sextum do-
cumentum.

QUIA in caluariæ penetrantibus rimis præsertim magnis, si prorsus ad finem usque rasorijs, vel quopiam alio ferramento detegatur, duplex magni momenti inde sequetur incommodum, tum natiui caloris, atque spirituum ad exteriora exhalatio, tum etiam extranei aeris ad interiora penetratio, atque offensa. Itaque haud immeritò Guido id fieri in hoc sexto documento prohibet, nempe secutus Galenum. 6. Metho. capit. 6. qui in ea tantum parte, qua fractura est grauißima, os excidi iubet. Cum enim inter craneum, & ipsam duram cerebri membranam aliquantula cauitas reperiatur, qua membranae in suo naturali motu dilatari possint, vitiosa humiditas intus contenta facto mediocri emissario foras expelletur: vnde paulò post ipse subdit, si verò fragmenta quædam longius discurrant, hæc persequi ad finem non oportet. Atque eodem etiam libro & capite. Necessarium est (inquit) aliquid fracturæ nudare. Non ergo tota fractura nudanda, vel perforanda est. Sit ergo obsecro, nec adeo magna, ut inde præfata incommoda cum vitæ discrimine subsequantur. Neque admodum exigua, ut ea ratione puris exitus impediatur, quò vitato vtriusque detectionis incommodo me-

do mediocris semper, vt fiat oportet. Sed iuxta hanc seriem ibidem aduer-
rito, hoc præceptum non vniuersim ob-
feruandum fore, Galenum posuisse: sed
in simplici duntaxat penetranti. ossis ri-
ma. In contractione enim & simul com-
pressione magna ipsius cranei, super
cerebri duram membranam, Galenus
oppositum aperte docet sic. Quod ve-
hementer est contractum id totum est
auferendum ne cerebri membrana cui
os contractumque compressum inni-
titur, violetur. Sed certè si liceat in hoc
quod longa experientia per tot anno-
rum curricula me docuit, hic exponam,
Dico ego hoc Galeni præceptum, quo
os totum contractum atque compres-
sum auferendum esse docet modifica-
tione indigere. Si enim ossis fractura, at-
que compressio exiguum partem occu-
pauerit, in hoc sicuti in omnibus alijs Ga-
leni consilium laudarem. Sed non iti-
dem si magnam, cuius ratio in prom-
ptu est. Nanque si eximia pars fracti, &
compressi ossis simul. auferantur ultra
nocumentum doloris ingentis in extrac-
tione sequuti duram cerebri membrana
in molem insignem detecta calore nati-
uo orbara obnoxioque aeri extraneo ex-
posita gangrena forsan, & conuulsione
afficeretur itaque quod sæpius, tutius, vti-
liusque esse in praxi ad inueni paucis di-
cam. Ego quidem in simili casu, os ma-
gnum contractum, atque ad interiora
compressum simul totum euellere, at-
que extrahere non audeo, ne prædicta in
commoda inde suboriantur, sed ossis spe-
ticulam super cerebri meningem ma-
gis innitentis, & comprimentis, ferra-
mentis ad id paratis aufero, quo nempe
emissario, & sufficienti puris respiracu-
lo facto, & mundificantia medicamen-
ta ad interiora labi, & pus ad exteriora
egredi, valent. Reliquum verò compres-

sum os purè iam genito: ossa laxata ido-
neis instrumentis in suam sedem sensim
aliquatenus reducere conor: A carne e-
tiam subcrescente partim expelluntur,
eo maxime, quia ossa illa cum alimen-
to iam careant postea, vel à natura ex-
pelluntur, vel à medico facile extrahun-
tur, nulla interea temporis ex tali ossis
dimissione noxa sequuta, vt experien-
tia iam pluries, atque etiam nunc nobis
condentibus hæc comperimus.

At verò, quia in perforatione pene-
trantis fracturæ cranei quidam cyclifcis,
seu rasorijs instrumentis, quidam verò
terebellis, seu trepanis vtuntur quæ à
Celso libr. octauo. capit. tertio. modiolij,
à Galeno verò loco citato, atque à Paul.
libr. sexto. capit. 90. abaptistæ, seu immer-
siles terebellæ nuncupantur. Itaque ea
quibus tutius vti liceat ferramenta, ex
Galeni sententia loco proxime citato
in medium afferam. In magnis igitur
fracturis quibus ossa valde sunt commo-
ta cyclifcis, seu scalpris rasorijs simul cū
eolophiso, vel facotu, id est, lenticulari
instrumento vti iubet. In penetranti ve-
rò fractura si ossa ipsam circumambien-
tia plurimum firma maneant: Abapti-
stæ, vel terebella, seu trepano immerfi-
li. Cuius ratio esse potest, quia trepa-
num, tum suo pondere, tum etiam ma-
nus chirurgi maiori ad interiora com-
pressu: cerebro, eiusque membranis lon-
gè magis læderet, tum etiam magis, ac
magis fracta, atque compressa & com-
mota ossa versus duram cerebri mem-
branam comprimerent. In ratione ve-
rò admota nullo mō. Cæterum in simpli-
ci penetranti cranei fractura in qua ossa
circūambientia plurimū, firma manent
ea incommoda non sequuntur, firmiora
enim ossa firmiorem vim tolerare pnt,
quàm fracta atque cōmota. Verum circa
chirurgia ferramenta quibus in penetran-
ti rima

ti rima caluariæ opus molitur certè cum adolescentulus, atque in scientia chirurgiæ perscrutanda vigilantissimus essem, asserere audeo multa me ferramenta nunquam antea à me neque à præceptoribus meis visa, nec forsàn cognita condidisse vehiculo quidem aliquo sumpto ex Galeni sententia. 6. Method. capit. 6. atque etiam à Paul. libr. sexto. capit. 90. necnon à Cornelio celso libro octauo. capit. 3. Nempe Abaptistas, seu immerfiles terebellas, siue modiolos mares, & foeminas, ita enim à Cornelio vocantur sic modiolus æqui uoce, etiam à Hippocrate libr. de fracturis ad instrumentum ex ligno fabricatum intusque cauitum ubi lignum ingreditur ad reducenda ossa cruris fracti, quorum per totam Hispaniarum Regnum ac sensim exterarum nationes deinceps creuit usus in dies, ita, ut multi ex chirurgis alieno labore in hunc usque diem potiantur. Nec cui legentium sit mirum, nec arrogantiae quod nunc narrabo tribuat. Cum Christianissimus Galliarum Rex Franciscus Primus Caroli Caesaris Quinti Imperatoris nostri potenti exercitu in Italico bello victus atque in Hispaniam vectus principem chirurgum inter reliquos secum duxit, quem in oppido Caracensi vel Guadalajara patria nostra ubi tunc degebam fortè fortuna hospitem habui, cui interea temporis veluti per otium varia mea chirurga instrumenta, & inter reliqua terebrarum varia genera quæ caluariæ fracturæ accommodantur ostendi, quæ eousq; sibi arrisere, ut pollicitus fuerit se quam primum in patriam reuersus esset eadem conditurus. Doctor præterea Ludouicus Lucena Physicus ac Medicus rarissimus conterraneus ac mihi amicissimus (qui in condendis illis ferramentis mecum semper aderat) tunc Romam profectus est, ubi diuinitam egit, indeque per

totam Galliam & Italiam plusq; viginti annis diuagauit, semper cū omnibus magni nominis Chirurgis versatus (erat enim chirurgiæ maximè deditus) quibus omnia illa instrumenta sensim diuulgauit. Tandem post multam temporis interca pedinem ecce Vidus Vidius in omnibus illis regionibus versatus, tandem Romæ librum in lucem edidit, multis certè ex meis ferramentis vafre in eo depictis, quæ triginta annis antè edideram: quibus quidem longè securius q̃ antiquorum trepanis operatio molitur. Quibus triplex paratur incommodum. Primum quidem, quia illa antiqua trepana equalia cū essent, atque circulo ad interiora penetrationē prohibente carerent, inter operandum præter medici voluntatem ad interiora penetrarent. Secundò, quia cuspidē seu clauo in medio trepani affixo, quo tunc tēporis vtraq; ossis lamina perforabatur, dura cerebri mēbrana facillè pungeretur. Tertiò, quia antiquitus vtriusq; manus compressu illo instrumento non absque magno vulnere periculo operabantur. Nra verò instrumenta, horū nocuementorū sunt expertia, dummodo quæ eis rectè vtatur, gradulus enim nri instrumenti superstitas prohibet ipsum ac simul clauum ad interiora penetrare, est namq; aliud instrumentum foemina cuspidē carens quo secunda ossis lamina debet perforari, & eo nullo modo cerebri membrana pungitur. Hoc præterea instrumentum non violenta vtriusque manus compressionē vt illud, operationem perficit, imò facillè circunducitur veluti habena, vel chordula arcus, seu mimbrequi (vulgò dicto instrumento) circunducto à fabrelignarijs instrumentis partim mihi recepto. Vtilius denique fore putauimus illa prius antiqua trepana hic depingere, ac deinde nostra, ut quantum inter illa polleant apertius pateat.


forma

de Uamabuo
Luis Debourger
Museum
aut ad d. p. p.
fol. 60. 21

De Vulneribus capitis.

60


Forma antiqui trepani, vt summa perniciies formidandi,
tam maris, quàm foeminae.



NOSTRA verò instrumenta duplicia sunt, mas videlicet trepanum, cauum, seu cannularum, inferiusque instar circularis ferrulae dentatae, in cuius cauitatis medio cuspidem aliquantulum longiorem (à qua maris denominationem accepit) affixam habet: vt primae cranei tabellae in orbem perforandae innitatur, secus enim hinc inde dilaberetur instrumentum: deinde foemina cuspidis, seu clauis expers, ne duram cerebri membranam in fine operationis violaret, in eodem circulari foramine intromittitur, vt in fine sine hac noxa opus perficiat. Potest etiam fieri haec operatio vno eodemque instrumento, quod amborum vices gerat, nempe clauum, seu cuspidem mobilem adaptando, vt facta primae tabellae perforatione possit amoueri, & secunda tabella eodem sine cuspidis instrumento tuto perforari.

Forma


Forma totius instrumenti.

Forma mei instrumenti maris
sine torculari.

Forma masculi torculati.



Forma foeminae sine torculari.



Forma foeminae cum torculari.



VERVM quia calvariae ossa perforanda, crassitie ac tenuitate valde differunt quò difficillimum ac fortè impossibile esset eodem instrumento varia calvariae ossa tuto perforari nisi plurima breviora ac longiora instrumenta pararentur, vt 6. Meth. cap. 6. Gale. innuit, Quod morosum admodum esset, itaque plures ducens noctes insomnes tandem viam adinueni vnico duntaxat instrumento tam os crassum quam tenuè perforari posse in hoc tantum à modiolò, vel à baptista. diffidente quod orbicularis ferrula qua ossis

perforatio molitur duobus contiguis calamis aequaliter torculari quodam coniunctis condatur quo quidem torculari: ferrula vel elongari vel abreviari secundum exigentiam subtiliter possit. Verum enimvero, quia connumerata instrumenta fracturis duntaxat cranei ad interiora penetrantibus à quibus ossis peti- cula integra in orbem extrahitur, accommodantur. Itaque dubijs, etiam fracturis attramento, & insuper rasio- ne explorandis: alia instrumenta ex- meo etiam (vt aiunt Marte) condi- duntur.


De Vulneribus capitis.

63

di: nempe solida, plana, ac lenia, acuta, marem videlicet, tanticula cuspide in medio supereminente ad primam cranei tabellam perforandam ne instrumen-

tum lubricet, foeminam verò sine ipsa cuspide. Circumagitur autem, ut alia nempe, aut in ipso manubriolo per torcular, vel sine ipso, ut in hac effigie.

Forma totius integri instrumenti ingredientis in mimbrui, vel manubriolo.



Forma masculi instrumenti solidi quod vel manubriolo, vel arcu circum ducitur.


Forma instrumenti foeminae ad secundam laminam cranei perforandam.



VEL potest subtilius atque breuius præfatum instrumentum circumduci nempe arcu & manubriolo ex leuiglino fabricatis, & cordula lyræ, manu videlicet sinistra medici apprehenso manubriolo, dextra verò manu arcu circumuoluto, ut inferior indicat effigies.

Septimum

Effigies totius instrumenti.



Ambo ingrediuntur in manubriolo arcus instrumenti.

Forma forminæ instrumenti.



Forma masculini instrumenti.

Septimum documentum.

SEPTIMUM DOCUMENTUM Guidonis. Quod si os debet extrahi, & repugnauerit extractioni: cum oleo rosato infundatur ad hoc, ut taliter mollificetur quod indolorosè extrahatur. Hæc Guid. Quia violentam ossis extractionem haud immodicus dolor comitari sæpè solet, & hunc praua alia symptomata consequuntur: attrahit enim cucurbitulæ instar, ut omnes asserunt authores. Vnde Auic. 4. quarti. capit. 1. ipsum dolorem, læsionem prauam rectè nuncupauit. Itaque ossa si qua sunt vel eleuanda vel extrahenda: mitius atque indolorosius quò fieri possit extrahantur, vel eleuentur, iubet authorante ossis extractionem, atque etiam post: rosatum nempe tepidum superinfundi. Vnde magnopere aduertito: nulla ossa cranei violenta manu nisi coactè euellenda esse, ut pote cum cerebri membrana ab aliquo ossium compressa, coarctata, vel puncta sit, tunc enim ne apostoma aut conuulsio nascantur statim licet vel extrahere vel aliquatenus eleuare, ut optime sanè Auic. 5. quarti. cap.

de fractura cranei, docet. Oleum igitur rosatum symmetrium cum sit infrigidata calfacit: calfactaque refrigerat ac dolorem leuat atque inflammationem membrarum cerebri cohibet, ut Galen. 3. de medica. simp. facul. cap. 27. & Auic. 2. canonis capi. de oleo atque alij authores docent: ea propter magna certè ratione Guido, in hoc septimo documento, ipso rosato vulnus infundi iubet, & non solum vbi extrahendi ossis necessitas vrget verum etiam in cranei trepanatione vel rasione quæ à principio vulneris fuit hoc intelligendum est. At verò si non principio, sed multo tempore post ossiū frustula interdū nigricantia extraneo aere ambiente atque medicamentis, ut docet Hippocr. libr. De vulner. capitis, sint alterata: tunc neque vehementi extractione nec oleo rosato est opus: nam sua sponte discedunt, ut ibidem, inquit: atque etiā ipsa experientia aperte pandit, sed de hoc alias longius Deo auspice differetur. Sed si quis in hoc Guidonis documentum, obijciat oleum rosatum frigidum, ac sicque temperaturæ in primo gradu cum sit, ut

citato

De Vulneribus capitis.

65

citato loco Gale. prodidit minimè mol-
lificare posse cum mollificatio à calido
& humido perficiatur, sed hoc dubium
facile diluitur ad aliquid enim vel res-
pectu corporis vel membri valde ficci cui
admouetur, nempe cerebri membrane
vel ossis: oleum rosatum humens reddi-
tur, simile equidem suo modo olibano
contigit. Quippe quòd ficcum primo
gradu cum sit: particulis ficcis vulneratis
pus adaugendo humectat, humidis verò
econtra Galen. 3. 4. & 5. de medendi ra-
tione asseuerante.

Octauū documētum. Quod
citius quo poteris expeditas
te de operatione maximè in
compressione & punctione
panniculorum quia ista citif-
simè consequuntur aposte-
ma & accidentia mala nec
in descensu materie de su-
perius speres in æstate diē
septimam neque hyeme de-
cimam quia post suspicatur
in panniculis esse talis im-
pressio. ^{quod} operatio non va-
leret: Hæc Guido.

ANteaquam seriem eius explicem-
us, ne quis forsā prauitate trans-
lationis Guidonis operis decipiatur sci-
re licet in omnibus eius codicibus per-
peram & absurdè satis legi ad ossis perfo-
rationem in fractura cranei penetrante
non esse sperandum in hyeme diem quar-
tam: hoc enim quantum à rationis scopo
deuiet nemo sui compos ignorabit, imo
debere legi neque in hyeme decimam.

Cum ex ipsa ratione atque antiquo Co-
dice Guidonis sequentis in hoc Auicennæ
5. 4. capitulo de fractura cranei aper-
te colligitur. Hoc igitur præmissò, octa-
uum vltimumque documentum ipsius
Guidonis bifariam diuiditur: In prima
namque eius parte author docet opor-
tere medicum in actu rationis vel tre-
panationis rimæ caluariæ penetrantis
ocissimè operari: præsertim cerebri mē-
branis punctis ab aliquo frustulo ossis vel
compressis: Morosa nanque operatio
tum dolore, tum etiam instrumētorum
rugitu atque compressu, tum etiam aeris
ambientis frigiditate vitæ discrimen eue-
niret: in quo Guido sententiam Gale. 8.
de vsu partium capitulo secundo, imita-
tur, sic scribentis. Nemo est qui igno-
ret id nos maximè agere, vt quā citif-
simè ossa capitis excidamus ne cere-
brum refrigeretur quo refrigerato ma-
lorum vltimum sit illi cui caput fractum
est. In secunda verò huius. 8. documen-
ti parte author docet tutius ac melius es-
se ante præfinitum tempus ab authori-
bus signatum, quā eo prorsus comple-
to, rimam caluariæ penetrantem per-
forare. Air enim minimè ad hanc dete-
ctionem expectandum esse in æstate
diem septimam neque hyeme decimam:
Sed cur quæso quispiam dicet Guido ab
Auicennæ sententia citato loco disces-
serit, cum inquit. Et oportet vt non tar-
detur illud in æstate vltra diem septimā
neque hyeme decimam. Verū Guido
illud tempus minis esse expectandum
docet, in quo non solum Auicennæ loco
citato, sed etiam Paulo libro sexto. capi-
tulo. 90. De fractæ caluariæ curatione,
atque Albucasi libro secundo capitu-
lo, fractura cranei aduersatur, qui lon-
gius tempus ad cranei perforationem fo-
re expectandum, constituunt: Nempe
in æstate septimam, hyeme autem deci-

E mam-

nam quartam diem. Sed primò Auicennam cum Guidone conciliabimus: secundò etiam Paulum, & Albucasim in hoc ex veteri traductione Hippocratis forsan deceptos. Pro primo igitur bifariam dicendum est. Aut Guidonis seriè fracturæ cranei pungenti vel compimenti cerebri membranas seorsum esse adscribendam: de huiusmodi enim fracturis immediate loquitur. Quibus, ut ita symptomata à Guidone in serie posita prohibeantur, ocyssima detecciónne succurrendum esse: Auicennæ verò series de vniuersali cranei fractura agit. Aut aliter dicendum, nempe ut Guido intelligat constantibus nobis aperte à principio fracturæ indicij sanguinis ad interiora prolapsi tunc non esse ætate septimam, & hyeme decimam diem expectandum, ut aliàs fieri assolet: quod videtur innuere cum dicit. Neque in descensu materiei, scilicet cum iam nobis descensus pateat. Neque huic expositioni Auicennæ sententia aduersatur, de curatione enim regulari agens, iubet ut nullo modo medicus piger procrastinator ultra illud tempus ossis perforationem differat: postea enim nil aliud esset, quàm (ut in verbo est). Operam & impensam perdere. Vnde in calce textus, Auicenna ipse tandem cum Guidone conuenit: dicit enim. Et quò citius, eo melius, & longinquius ab hoc, ut veniant nocumenta magna. Ad auctoritatem verò Pauli & Albucasis locis citatis ubi ætate ante septimum, hyeme verò ante decimum quartum, os omnino fractum perforare imperarunt, dicendum certè, eos antiqua Hippocratis traductione libro de vulneribus capitis, forsan fuisse deceptos. Hippocrates enim in eo textu nouæ traductionis, nullum quidem verbum de tempore perforandi ossis caluarie agit:

ut cuilibet rectè inspicienti patebit, sed de symptomatum prauorum inuasionè, quæ euenire solita sunt: si necessitate terebrandi supposita in illud tempus medici errore differatur terebratio. Quod eius series aperte pandit, quæ sic sonat, Cum quis os fractum aut ruptum aut contusum, aut per errorem reliquerit, nec raserit, neque perforauerit, quocunque modo fractum intelligens veluti os non opus habeat, & velut os sanum existat, ante decimum quartum diem febris corripiet, ut plurimum hyeme in ætate verò post septimum diem: quæ quidem verba non tanquam præceptum ab Hippocrat. sed tanquam præfagium adscribuntur. Idem quoque ex Hippocratis sententia eodem libro patet, cum inquit, si quidem ad perforationem tendere, ossis fauciatio videatur, perforare oportet, & citra perforationem triduum non excedere: sed in hoc perforare tum aliàs tum tempore calido si ab initio curationem susceperit: hæc Hippocrat. Ego verò (si liceat) aliàs in regione calida, aliàs in frigida: atque aliàs in iuuenibus, aliàs in senibus etiam adderem. Alia etiam eiusdem series habet, postquam tres dies transeant terebrato, præsertim si tempus æstiuum calidumue sit. Namque (ut ex Philosophi sententia habetur) Putrefactio citius vere & ætate, quàm autumno & hyeme cõflatur. Quod Hippocrates eodem libro de vulneribus capitis testatur, senibus & iuuenibus lathali vulnere capitis æqualiter vulneratis, mortem citius iuuenibus, serius verò senibus euenire: accelerata nimirum in iuuenibus putrefactione: demorata verò in senibus contraria ratione. Equiparantur namque ætate iuuenes veri, vel æstatis: senes verò autumno, atque hyemi. Quocirca non abs re Hippocrat. 3. promollicorum canone. 15. & 16. & Galen. in eius

De Vulneribus capitis.

67

in eius commentarijs, atque Auicenn. 4. de aurium affectionibus agens testatur, dolorem meatus auditorij interni iuvenes multò citius, quàm senes interficere. His igitur obiter (quanvis ad rem factis) ostensis vnde digressi sumus redeamus. De regulari igitur curatione, nullo antea urgente symptomate, post triduū rimam cranei penetrantem, vel ab aptista instrumento perforare, vel scalpris rasijs radere (vt magis expedit) solitus sum Hipp. loco citato censuram, atque etiam praxim insignium Chirurgorū, qui meo tempore in hac arte claruerant, sequutus. ¶ Sed cum nam Guido præcisum tempus ossis trepanandi tempore æstatis, atque hyemis prodiderit, non autem veris, neque autumnis, forsitan petetur. Dicendum breuiter ipsum Guidonem, sub æstate ver, sub hyeme vero autumnum, etiam vsurpasse, imitatus forsitan in hoc Hippocratem, citato sæpius libro, vbi inquit (vt iam antea diximus) alias tempore calido, aliàs tempore frigido: pro calido quidem ver, atque æstatem: pro frigido vero hyemem, atque autumnum comprehendere.

At verò de coacta (quam vocant) curatione duplex, ac varius scopus semper est inspiciendus, alter quidem, vt qui à principio os pungens, aut comprimens duram cerebri membranam (vt iam antea etiam diximus) reperiatur, tunc statim (si possibile sit) os, vel extrahendum, vel eleuandum est. Expectatio enim digestionis in vulnere (vt citato loco dicit Auicenna) non toleratur, nisi vbi non est panniculus nominatus mater coarctatus vel punctus. Alter verò scopus prædicto fati oppositus est, vt non solum principio, imò post decimum quartum, atque vigesimum, & denique omni tempore, quo errore medici cranium non detegatur, vel alijs etiam (vt dicitur) causis pra-

ua symptomata appareant: nulla mora postea contracta cranium perforare oportet factò prius mortis prælagio, sic em̃ nonnulli (licet rari) præter sp̃e ad Dei laudem euasere, non solum hyeme verum etiam vere. Hæc autem sera terebrationis necessitas multis modis solet euenire, aut videlicet artissima cranei rima (præsertim in summo capite) sensum medici plerumque fallente, quam Paul. loco citato rhogme nuncupauit, qua praua symptomata serius infestare contingit. Aut integro prorsus craneo venulis tamen cerebri, vel eius membranarum interius ex valida contusione, vel casu disruptis, sanguine inde intus cōcreto, atque corrupto lethalia inde symptomata post aliquod tempus proritante. Aut curatione à docto callosoque chirurgo serius quàm oportebat ~~_____~~ suscepta. Vel futura coronaria, vel sagittaria à contusione grauissima citra vulnus relaxata, vel forsitan craneo illæso putrefactione tamen ex immodico mollificantiū vsu per futuram à perioestio vsque ad duram cerebri membranam, à qua exoritur, impartita. In his igitur casibus integram caluariz os trepanare licebit in quibus coacta terebratio molitur: tunc enim certum terebrandi tempus nullum est sed aduertito in hac sera terebratione interdum aliquid puris ab interna parte egredi: interdum verò nil quod est deterius non quod non subsit, sed quia vt dicit Cornel. libro octauo. capitulo tertio. in ampliorem sedem vitiosa humiditas iam diffusa est, aut in rarissima cerebri substantia imbuta, aut forsitan (vt nos addimus) pure loco trepanationis non correspondenti, aut distentis conuulsisque iam cerebri membranis motus iam expertibus, Orificio trepanationis adhærentibus indeque ipsum claudentibus. Quo sit vt puris intus latentis exitus pro-

hibeatur: inde ægro moriente. Sed hæc quidem lethalia symptomata citius vel ferius vulneratum molestore consueuerunt secundum minorem, maioremue humiditatis vitiosæ intus concretæ quantitatem. Si enim eximia est, citius: si exigua verò, tardius infestant. Vnde Hippocrates. libro de vulneribus capitis: recte dixit. Mala vulnere capitis non statim patent, sed in calce huius octauæ Guidonis documentis expositionis, casum (penè miraculosum) narrare non finam: quem cum esset iuuenis, Deo fauente, curavi. Nempe octuagenarium senem post duos iam menses in osse parietali capitis atrociter vulneratum, lethaliorebus iam symptomatibus laborantem, liuescente etiam iam dura cerebri membrana, facto tamen prius mortis præfatio, in parte decliuiori fracturæ admodum amplæ, atque disgregatæ ita ut digitum manus poteram intrinsecus, meo instrumento os terebraui, atque ipsius periculâ prorsus in orbem separavi, & reliquum os magni partis superioris fregi, extraxique. Deinde vlcus satis cruentum velut recenti simile per partem superiorem futuram (quam Guido labiorum ad tempus ad seruatricem nuncupauit) consumimus: in parte verò inferiori terebrationis, linamento indito, medicamentisque solitis, ad mortem, præter omnium spem omnipotentis auxilio incolumis euasit. Sed hic dubium emergit, utrum duabus cranei penetrantibus simul fracturis inflatis utramque terebrare liceat, breuiter dicendum, aut in eodem latere capitis illa vulnera fuisse inflata: & sic sufficit illorum alteram in parte decliuiori terebrare, ut vtriusque vulneris vitiosa humiditas foras expellatur. Est namque inter duram cerebri membranam & craneum non nihil cavitatis, quæ vnius vulneris humiditas per orificium terebrationis alterius

possit communicari, atque expelli. Ceterum si penetrantia vulnera in varijs lateribus capitis sint inflata (præsertim contusa) tunc quodlibet per se vulnus terebratione indiget: quippe cum putris humiditas in parte (verbi gratia) capitis dextera existens per vulnus læuæ partis expurgari nequeat.

Verum huius octauæ documentis Guidonis explicationi finem imponentes: Dubium a quibusdam percontatum efflagitatumque diluamus. An videlicet ex fera terebratione, non nisi iam prauis symptomatis apparëtibus, facta: chirurgi merito taxari possent: in quo quid sentiam edam: Primò ergo taxandum haud immeritò mihi videtur, si à principio fracturam quantumuis tenuem & capillarem, præsertim in summo capite, attramentò superinfuso, deinde rasione non explorauerint. Solet enim per illam arctam rimulam humiditas retenta sensim ad interiora instillare, subsequitis inde prauis symptomatis, quibus postea subuenire forsitan non possemus, etiam si terebratio molietur. Secundò si arctum vulnus in vertice capitis cum cranei rimula à principio vulnerationis versus alterum latus (ut emissarium humiditati detur) non dilatauerit. Tertiò taxari (meo iudicio poterit) si diutius quàm oporteat oleo, alijsque medicamentis mollificantibus, ac pus mouentibus vtantur: præsertim in futura coronaria, vel sagittaria: putrefactio nem namque ad interiora per futuram ingerunt: putrefactis ibi ligamentulis, quibus pericostium cum dura cerebri membrana (à qua ortum habet) committitur. Quartò si à principio vulnerationis à valida cõstusione, vel ingenti casu disruptio nem internarum venularum sub craneo suspicemur, ex sanguinis exitu per os, nares, vel aures, indicio sumpto, tunc enim statim oportet uti ossis perforatione, quæ

nota capiuntur

De vulneribus Capitis.

69

quæ, si negligatur, periculum in ianuâ est.

Quinto si in principio, vel tracta temporis accidentia internum malum iudicantia appaeruerint, in crani perforatione Chirurgus pigritaverit, tunc taxandas certe magnarone est: in alijs vero indignè certè.

CAP. XVII.

De completa vulnerum capitum cum fractura cranei pernetranti curatione.



Nimaduersishactenus octo Guidonis documentis (quorū explicatio præcessit) in fractura cranei ad interiora pertingenti obseruandis superest modo Curatoriâ methodū ipsius prorsus edere. Præcedenti igitur ventresctione ut plethora minuatur (si qua est) & fluxio, quæ dolorē sequitur arceatur. Foueat igitur prius (ut iam antea dixi) totū caput oleo, & aqua mixtis, calidisq; postea pertundatur: neglecto in hoc Guillelmi atq; aliorū præcepto, nepe cauendum maxime opere esse ne aqua & oleū vulnus attingat: cōglutinationi namq; (ut dicunt) impedimento essent: quod tãquã ridiculū omitimus. Vbi enim vulnus prima, quã dicunt curandi intentione (quæ aglutinatione immediata, vel ferè immediata molitur) curari potest ea sententia vera est, atq; ex Gal. 4. meth. cap. 1. hic verò nō facessit negotium: simili namq; vulnere tantū abest immediata aglutinatio, ut carnis nō solū sectione, sed etiã ossis perforatione egeat. Perperã igit, ac turpiter Galenū intellexerunt. Vnde igit digressi sumus, nostra reuertatur oratio. Quarta igit die de cura regulari, seruata bona victus ratione, atq; euacuatione (quarū. c. 14. meminimus) vulneratus cerebrum inter duo solaria si

fieri possit curet, sin minus, in loco ab ære prorsus tuto, cauisq; fenestris nō solum hyeme, sed æstate etiã: huiusmodi enim vulnerata membra caliditate semper expositulant: ob idq; Galen. 8. de vñ part. cap. 2. cerebrum (inquit) etsi æstas fuerit facile infrigidat. Cuius etiã sententiã Auic. 5. 4. c. de fractura cranei imitat, ubi inquit: Et in huiusmodi quidē dispositione immo in omni dispositione oportet, ut vehemeter caueatur frigus, etiã in æstate, quoniam in eo est timor magnus. Quod adeo receptum in praxi apud insignes chirurgos iam est, ut hyemis tempore linamenta, ac pannos, & omnia vulneri, atq; toti capiti admouenda, & etiã manus, & denique instrumenta calfacere cōsuetū sit. Quod Nico. Flor. ferm. 7. c. 34. de fractura cranei rectè docet. Itaque si auis huiusmodi præuna in vulnerati cubiculo habeatur, & tempore vulneris curandi apud ipsum vulnus. At verò si patientes diues sit, aliter habitationis aer alteretur, & calefiat, nepe vapore calidarū herbarū earum nimirū decoctō feruenti huiusmodi semiplenis in cubuli angulis locatis. Sed aduertito isthac calfacientia, biliosis temperaturis, vel intense febricitantibus, vel tpe calido, aut prorsus omittenda, vel admodū moderata esse, ne maior calfacentiō tū etiã interspirandū incendio faciat afficiat. Soluta igitur prius alio mane, vel cristere, vel sua sponte, obstratis auribus infirmi cotone, ut Paul. & Auic. locis citatis docuere, ne instrumentorū rugitu caput obtundatur, ipsumque vtriusque ministri manibus planis comprehensum de iunctisque, inter radendum os, ipsi vulnerati extremitatibus: ut sanguinis reuulsione fluxio humorū ad vulnus phibeatur, decurrere: Capite etiã vulnerati & chirurgi, aque assistentiū linteo magno coopertis in nomine Iesu operatio sic molietur. Si magna sit fractura, & ossa fracta vehementer commota chichicis,

seu rasorijs, scalpris, vti licebit, verum si cum fractura, ossa circumambientia plurimum firma sint, foranda terebello sunt vt Galen. 6. metho. capitul. 6. docet. Cuius ratio (vt alias etiam tetigi) esse potest: nam compressa ossa terebello, ipsis finitenti, atque comprimenti magis certe ad interiora super cerebri membranam, premerentur. Quo tutius, ac securius multo erit chicleis, seu rasorijs scalpris, atque lenticulari (si opus sit operari: In eis nanque administrandis multo minor vis, nullusque compressus interuenit. Igitur vbi rasorijs opus est, atramento scriptorio superinfuso, tandiu radendum, vt Hippo. atque Paulus & Auicenna. atque alij locis citatis imperarunt, donec atramenti nigricies prorsus aboleatur: & iterum si opus sit infundatur. Sed oportet (vt loco citato Galenus docet) prius ampliori rasorio, deinde stricto, postea angustissimo vti, ne multa videlicet membranz cerebri detectio acri ambientipateat. Verum, si liceat, (quod in praxi receptum iam habeo) paucis exponam, Nequis ita exiguam cranei quantitatem detegat, vt puris expulsiōi non sufficiat, præsertim si os crassum sit: neque admodum magna ita vt aeris alteratione atque spirituum & caloris natiui exalatione corruptio ipsius duræ cerebri membranæ nascatur. Itaque mediocris detectio vtriusque extremorū expers molienda est in quo certe maximam, ad Dei laudem, vtilitatem sæpe inueni. Quando igitur iam ratione ad duram cerebri membranam peruentum sit, tunc multo, cautius est agendum: nam detecta membrana, clausis ore & naribus vulnerati, eoq; tulsiente, vt sanies (si qua intus latet) ad exteriora egredi possit, conandum est. Deinde lacte mulieris è mamma emulso filiam lactantis (quia temperatius est) membrana abluatur. Demum vel coto-

ne vel lenissima atque mollissima spongia (vt docet Hippocrates. libro de vlnibus capitis.) membrana abstergatur. At verò si ossis detectio conuenienti tempore moliatur, tunc triplo olei rosacei omphacitidis, vnaque mellis rosati colati commixtis medendum vlnus est, idemque medicamentum inter ipsam cerebri membranam, & craneum in panno serico rubro specillo argenti mittatur. Postea immèdiatè peticula mollissimæ spōgie ei adhareat: tum vt ab interna versus externam partem saniem attrahat: tum etiam vt ipsam attractam in se imbibat: tum verò deinde vlnus vsq; in triduum linamentis in medicamento digestiuo (quod vocant) illitis, non multum compressis (ne dolorem inferant) repleantur. Constat verò in humidis quidè temperaturis ex oui luteo & guttulis olei rosati omphacitidis simul agitatis: in siccis verò ex terbinthina & ipso oui luteo, vt simul cū curatione partis natura quadamtenus simul adseruetur. Sed hoc vnum magnopere aduertito, magni sanè momenti vt si forsan medici desidia, vel quauis alia causa, craneum seriùs quàm oporteat perforetur nil olei neq; medicamentum oleosum vllum super cerebri membranæ esse imponendū, ne putrefactione ipsi ingerant: sed simplex tantum mei rosatum excolatum. Apparente verò iam laudabilis sanie, ab omni medicamento pus mouenti desistendum est: imo mūdātibus & aliquatenus exsiccatibus: dein de sarcoticis vtendum. Quorum copiam secundum temperaturarum discrimen vsq; ad completam curam in antidotario impense inuenietis. Verum enim verò superest modo in alio fracturæ genere cuius antea meminimus, methodum ferreis instrumētis operandi, docere. Quæ quidem non rasorijs scalpris, sed abaptistis modiolis, seu trepanis molitur: quan-

De Vulneribus capitis.

71

do videlicet in penetranti cranei rima circūbiētia ossa plurimū firmā manēt, vt ex Gal. cēsurā iā probauimus. Func igitur eadē dicta circūspēctione, clausis etiam auri- bus vulnerati manu sinistra medici manu briolo trepani apphenso, nēpe instrumēti maris, ad primā cranei laminā pforādā, vt in 6. documēto docuim⁹: manu verò dex- tra versus partē exteriorē circūuoluat do- nec ad finē primæ ossis laminę peruētū sit postea ablato mare instrumēto, intromis- soq; sine cuspide scēmina, eadē circūuolu- tione secūda ossis tabella vsq; ad durā ce- rebri meningis detēctionē sensum pforet. Sed interea tps lac muliebre infūdito ne ingēti circūuolutiōe instrumētū calefiat, ac pariter ossa circūambiētia: licet Hipp. ad hāc phibedā calfactionē terebellā inge- lida infundi inter operādū iubeat. Prodest rursus id facere vt facilius os terebello or- biculatim secet: qđ artifices in subcauādis lapidib⁹ aqua supinfusa facere cōsueuēre. Verū cū iā penetrationi parū desit, opor- tet tūc accuratissimē, lēti⁹, ac miti⁹ ipsum instrumētū circūducere, ne cerebrimēbra na violet, ac sedulō speculari & instrumē- ti viā medicū circūspicere, an opatio iā fi- nia, aut parū perforationi desit: & tūc vul- sellis, vel eleuatorio instrumēto, vel alio, rostrū ciconię, nūcupato, ossis peticulam hinc inde sensim mouere, atq; extrahere. Indiciū verò a terebratione dēfistēdi (vt lō- ga experiētia iā nos docuit) est, qñ incircū- ductū pigrius multò instrumentū mouet. Cui⁹ cā meo imbecillo iudicio esse pōt, qā iuxta Philosophi doctrinā, Omnis motus alicui fixo innitit. Cū aut orbicularis ossis peticula iā nō fixa, sed mobilis sit tūc tps terebra cū circūagiū multò lenti⁹ ac pigri⁹ mouet: ac rursus icore ossis ramētis com- mixto, veluti cōglutinatoriū quoddam li- mū cōflat, terebrę motū pigrū reddēs: tūc tūc a terebratione statim dēfistēdū: Conā- dumq; est aliquo dictorū instrumētōrū of-

fis peticulā iā labescētē (vt diximus) prorsus separare. Verum necessitatē nō vrgēte vbi parū abest, vt os iā prorsus pforet, & hīc inde nimis moueat, vīq; in sequētē diē fi- nere Hipp. lib. de vuln. capit. docet: vt os penē sua spēte dēscēdat ac cerebri mēbra- na aliquaten⁹ ex terebratione defatigata, breuiori tpe nuda maneat: atq; etiā ne in vltimo terebrationis forā violēt, haud mediocri cura medici adhibita, vt instru- mētū ppēdiculariter directē, & equaliterq; sup rimā orbiculatim pforādā affigat. Cir- cūducaturq; sec⁹ em orbicularis ossis pars extrahēda certē in aqualis incōmodē satis extraheret. Nā mēbrana dura ipsius cere- bri partim nuda, partimq; cooperta mane- ret. Sed moneo vt hūmōi instrumentis ille chirurgus dūtaxat vtat, q lōgo tpe cū do- cto atq; exercitatisimo pceptore versat⁹ fuerit: sec⁹ em artificis & nō instrumēti cā nō rarò a suo optato fine frustraret. Vñ sa- nē recte satis Damascen⁹ suis Aphorismis inqt, operari scđm libros absq; perfectā rō- ne atq; solerti ingenio molestū est. Verū si forā sanguinis pfluuiū effatu dignum ab interna parte subsequat, tūc vulneratus ipse, si eius facultas pmiserit, gallinarū ce- rebellis nutria, & balaustiarū aqua sit po- tus: sin minus, edorū capitibus siue extre- mitatibus nō excoctis, sed depilatis fa- tisq; coctis in vulnere verò puluis sangui- nis draconis ex gutta cōmixtus humidita- ti sub telicula quadā in cortice oui cōtēta admoueat. Restrictioq; iā sanguine, sedulō inspiciēdū erit, an mēbrana cerebri situm suū naturalē, ac pariter motū adseruet, an nō: illud enim bonū, hoc verò minimē: li- cet ad Dei laudē nō nullos virz restitutos curauī (præsertim senes) qbus mēbrana ip- sę cerebri satis submissa fuerant atque na- turalis motus per quindecim diēs exper- tes, nēpe eorū substatifica humiditate di- minuta: atq; eadē rōne eorū caluariz ossi- bus tenuioribus multò quā in iuuenibus

AEtius de-
claratur.

apparentibus. Peracta igitur ofsis dete-
ctione vulnus ocissime curetur: postea pā
ni in lacte mulieris filiam lactantis infusi
(quia temperatius est) oculis vulnerati su-
perponantur neglecta in hoc AEtij alio-
qui doctissimi lib. 2. sermone 3. opinione
asseuerantis, lac muliebre oculis infusum,
quenuis dolorem, vt anodinum leuare, ca-
runculam, tamen in ipsis procreare, illud
enim de oculis ophthalmia laborantibus,
quibus lac diu infunditur intelligatur. Hic
verò paucò tempore atq; inter initia ipso
vitimur: vt oculorum dolorem, tum à vul-
nere, tum etiam à terebratiōe inductum
propter membranarum ipsorum consen-
sum & compathiam cum eisq; cerebri,
atq; cranei sunt lac leuare possit: per aures
verò iuxta Pauli & Auicennae sententiam
oleū aliquod veluti rosatum, vel amigda-
li nū infundatur: vt dolorem leuent. Ac
inflammationem arceant. Præstat etiam
vulnerum sacculum cum rosis, sanda-
lis, nenufere, atq; caphura, aqua rosea su-
perinfusa olfacere cuius iuuamentum sen-
tentia Galeni. 1. 4. metho. cap. 20. atq; Abē-
zoaris lib. sui Faifir colligi potest. Cruriū
quoque post curationem ante prandium
atq; coenam fricatio molliatur: vulneratus
à luce caueat, à locutione abstineat, &
postquam quieuerit chephalica vena ex
brachio vulneri correspondenti secetur:
vt facta reuulsione dolor, fluxio, & inflā-
matio (quæ terebrationem sæpe consequi
solent) arceantur. Rursus in collo, atq; cer-
uice, & alis, & inguinibus, vnguento con-
tra conuulsionem actu calido linitio fiat:
cuius compositionem in Antidotario in-
uenies: ventriculus etiam, qui in fractura
cranei per compathiam, & colligantiam
cum cerebro, mediante neruo quodam
magno male affici solet, vnguento ad hoc
in Antidotario ad eius cōfortationem pa-
rato vt liniatur oportet. Deinceps verò cu-
ratio medicamentis in Antidotario para-

tis vsque ad vltimā vulneris curationem
molienda est. Cæterum quia interdum du-
ra cerebri membrana dictis medicamen-
tis mundificari non potest (nigricie enim
maxima interdum afficitur) & tunc nisi
melle mundificetur lethale signum esse
Auicenna, & Guido locis citatis indicauē-
re. Quod durissimū, videtur cum ipsa cere-
bri membrana malè affecta fortiora medi-
camenta tolerare possit: Itaq; medicamē-
ta ad eius absterfionem parata, tum peri-
culo, tum etiam authorum sententiā re-
perta in præsentia afferamus: inter quæ vi-
guentum Apostolorum (quod vocant)
deinde AEgyptiacū primas tenent: quan-
uis apud vulgus Chirurgorum malè au-
diant. Sed quæ sunt obsecro fortiora sim-
plicia medicamenta in ijs ingredientia?
nonne præter mēl, flos æris, alumen & ace-
rum? Sed horum sigillatim incolumitatē
ostendemus. Et primò aceti, quod his vul-
neribus capitis dura mēbrana cerebri etiā
detecta Cornel. Cels. lib. 8. c. 4. tum etiam
Hipp. lib. de vuln. cap. eo etiā acerrimo v-
tūtur. In quibus locis statim cerebri mem-
brana mūda ofsis perforatiōe detecta ace-
rū acerrimū superinfundere iubēt. Quod
durius est, quā ipsa mēbrana cerebri iā ni-
gricie, atq; corrosione tērata. Eruginis ve-
rò siue floris æris, atq; aluminis in ipso vn-
guento ægyptiaco ingredientū securitas
in simili casu cōstat ex Galeni sentētia, tū-
4. metho. tum etiā. 5. de cōpositione medi-
camētōrū. ^{per osque} ~~locum~~ vbi agit d̄ quodā vnguē-
to Isis chephalici vel vnguento sacro ca-
pitali, ppter eius maximā efficaciam aduer-
sus ofsis caluarie præcisionē: sic enim ab
Isi AEgyptiorū dea, & chephalos græcè
qđ est caput, vñ vnguentū chephalici in
quo quidē medicamēto duræ cerebri mē-
branæ detectę superimponēdo: tū ærugo-
æris, tū etiā alumē ipm ingrediunt. Qđ e-
tiā medicamentū à Gal. in fine. 6. metho.
duræ cerebri membranæ detectę mirum

in

De vulneribus Capitis.

173

in modum laudat. Non est igitur cur miseris, imo eoque melle, & aceto, siue oximellitæ membranæ superinfusis plures fauciatis capite per manū Eudemi concius eius senis euasisse fatei. Quam alios qui, nepe lenientibus medicamentis curatos. Vnde non abare Guiliel. à Saliceto in sua chirurgia agēs de fractura cranei penetrati, Erasicius (inquit) quod eadē est portio vnguēti Apostolorū ad nigritiem, vel adauctam carunculā duræ matris mūdificandā, sicut proportio mellis rosati ad piam matrem mūdificandā. Membrana igitur iā pura ac munda, farcoticis demū tergorizantibus medicamentis in antidotario describendis curei. Sed cōmodē satis (vt opinor) hæc aduertere licebit. In vulneribus capitis penetratibus, auribus, vel naribus correspondentibus, nōnunq̃ per ea loca naturā saniem expellere, fauciato inde liberato, vt interdum periculo euenire vidi, idemq; ex Auic. snia. 3. 4. tract. 1. ca. 20. de exiuris calidis, colligitur. Quādo igitur vulnus naribus correspondeat, tunc clauacro per nares siphone subtili iniiciendū est. Si verō auribus, ampliāde speculo auris aliquatenus sunt, & siphone argenti exiguo sanies fugat, vt interdum feci. Lauacrum igitur in principio per nares immittendum cum aqua ordeī, & melle rosato, vel aqua lactis cum ipso melle, demum cum vino veteri albo decoctiōis rosarum, & granorum mirthi & baccarū lauri cum myrrha, & similibus conficiat. Sed rursus aduertito in vulneribus capitis penetratibus cū magnavtriusq; ossis tabelæ deperditione nūdā cerebri membrana, oportere frustulum cucurbitulæ siue crebris foraminibus perforatum optimēque munitum superimponi, vt Guido capit. de fractura cranei inter nouē documenta, & itidem Leonardus à Bertapalea, atq; alij docēt (haud immerito profectō) quatuor em̄ non leuis momenti iuuamenta inde

affurgunt. Primum quidē de cerebri membrana detectatū linreis, tū fasciā de higitōe cōprimatū, imo sit eis fulcimenarū quippe cum membranarū cerebri coarctatio vna atq; potissima ex causis ipsarū inflammatio nis sit. Scdm̄ vti ipsa cerebri durā meninge ab externo aere ambiēte ptegat. Tertiuū, vt membranarū ipsi cerebri in qua plerebra foramina sanies foras pellat, ob idq; tenuis simā admodūq; molli simā spōgiā immēdiatē superimponi oportet, tū vt sanies atrahat, tū in se emigret atq; retineat. Quartū verō iuuamētū (licet ridiculū) Leonard. tū à Bertapalea affert, nepe, vt solidū vulgus admiret: cū em̄ nō semper, sed semel, aut bis vulgariū aliquis curatiōr forsan ad fuerit, alijs verō sequētib⁹ minimē postea euadente vulnere, tūc vicatim ac ianuatim restantē cucurbitulæ frustū intra vulnus aglutinatū fuisse ridiculum sanē, atque cachino dignissimū. Nam si natura ipsa (vt experiētia docet) ossicula capitis sibi familiarissima cōmota, vel tū aere alterata cōglutinare nō valet, ergo multo minus cucurbitulā, rem prius sibi extraneā: & certoscias hoc ministeriū vsus cucurbitulæ in simili cranei abolitiōe siue subtilitā deperditione esse optimū, atque subtili indagatio ne inuentū. Vñ Damasc. rectē i suis aphorismis inq̃t, ingeniū naturale medicū adiuuat artē, & naturā regentē, licet sit cū paruo artis instrumēto, cōtrariū verō ē cōtrario. In quo quidē Cornel. Cels. libr. 3. c. 1. atq; Hipp. lib. de lege imitat, ubi inq̃t, Natura repugnante nil medicinē p̄ficir: quo loco nō corpis nr̄i naturā regitūā (vt qdā falso opinant) intelligit, sed naturā optimi ingenij medicī sine hac em̄ nil in tali medico sciētia medicinē p̄ficir, imō irrita & cassa oīa in ipso fiūt. Verū si in hac cranei abolitiōe, in alijs fracturis aliquot ossiū schirolæ explanādæ superfiunt, tūc facoto, vel cholophifos, i. lenticulari instrumēto id fiat: cuius vsus apud Gale. 6. metho.

solidum,

ca. 6. magni habet: qui sic inquit: Vbi latā partē lenticulæ sup. membrana statueris, feres malleolo, ac sic caluariā diuidēs. Eūe nictē in agentibus, quæ requirunt oīa: nam membrana, ne si dormitans quidem, quis agat, lata tantum lenticulæ parte occurrentis vulnerari potest: qui sicubi adhæreat calvaria; huius quodq; adhærentiam innoxie dirimit ipsa lenticulæ rotunditas. Post hæc vero, inquit, subsequitur verò penitē eā a tergo ipse scalper caluariā secans. scalpri instrumenti, q. os calvaria secat subleget atq; instrumenti, eā. lenticulā præeū tē. Ad rē igitur redeamus, pura iā, atq; prorsus munda viceris carne, atq; sarcoticis in antidotario notatim describendis iā adacta, curbitā tūc sensim minuemus donec avulnere prorsus eā abijciam. Quo tpe crassiori victurū licebit, nō solum bono, sed etiā tenaci, & q̄litate & quantitate mediocri: vt eo crassior sanguis carnis generāda materies, & callus innascant, vt 4. meth. c. 1. ac multis in locis alijs Gal. docet. Vñ i capitis percussioib; ac pariter alijs oib; cōe pceptū aduertito, nēpe nō eade vici rōne esse vitē dū: quā i alijs acutis morbis ad vnā criticā expulsiōe materiā seruātib; vitimur: i his em̄ versus statū tenuissimā inediā iniungi m̄: vt natura ipsa in cibi cōcoctiōe, tūc minus impedita i pugna futurę crisis expeditiū, ac meli; & morbū superare, & vince re valeat. E diuerso verò i vulneratis. Principio nāq; tenuē victū ppinam, vt inde sanguis ad vuln; effluēs bon; q̄litate, & quantitate reperat; euadat, Cohibito inde dolore, fluxiōe: quib; inter initia æger molestari solet: ceterū (his iam phibitis, vel prorsus discedētib;) tūc opimo cōglutinosoque, atq; tenaci alimento ad calli gñationē est opus: eo præsertim, qđ ex aialiu extrematib; cōficiū. Vñ Auic. 4. 1. c. d. solutiōe cōtinuitatis medicat equatiōe, & quiete & ligatura cōueniēti, & cibo cōglutinatio, in quo habet fiducia, quod ex eo nutrime

tū gñat cartilagosū: qđ labia fracturę claudat, & in vnū conducat: sicut cibus extremitatū aialium. Dū modo, intellige, qđ vetriculus cōcoctre ipm & cōficere queat. Sed iā demū his duob; dicēdis documētis satis inspagādo vtilib; huic cap. finē imponam. Primū sit circā tumōrē, q. oculis i capite vulneratorū euenire solet: hic em̄ aut inter initia, ac parti cū oculis directionem habēti, accidit, postea ipsi detumescētib; & hic tumor læthale signū nō est, p̄sertim ipso tumōre oculis nō redeūte: verū si post septimū diē tumor semel ablatus iterū redeat, vel denuo contingat cū alijs p̄sertim malis indicijs læthale esse signū. Sed reliquū est admonere, ne oīa vel cōmota prorsus, vel aere ambiēte, & medicamētis alterata violēter extrahātur: sed dimittēda esse donec sua spōte discedāt, vel paucio iuuamine separari possent, vt Hippo. lib. de vulnere. capitis. docet. atque itidē Cornel. Celsus ac perinde Auicē. 5. 4. c. 13. vbi inquit, & qđ est meliūs, est vt nō festinet in extractiōe eorū, imō dimittant naturā, & illud cū attractiōe pauca eorū quæ extrahunt in spatio nō festino; & nō moueant cū medicinis nec opatiōe man;: nā qđ extractū est violēter nō euacuat, quin faciat accidere vlcera fistulosa: idēq; Leonardus de Bertapalea in arte chirurga nō posthabendus cap. de fractura cranei docet. Cuius cām Petrus de Argelata tracta. 1. c. de vulnerib. coxarum. His verbis affert. Scies (inquit) quod frustra ossium quæ extrahuntur a vulneribus quantō tardius, tantō leuius extrahūtur. Vnde quātō maiorem moram in loco facient, tāto magis illa a carne separātur: quare facilius extrahūtur, & hoc (inquit) saepe sum expertus. Sed oportet futuram ossium a natura expulsiōem prædicere, ne medicus apud vulgus male audiat: cogitat nanq; vel inscitia, vel scelere chirurgi ea ossiū frustra in vulnere fuisse derelicta, vt olim mihi contigit.

De Vulneribus capitis.

175

contigit. Sed certè vidi in quodam ceconomo Marchionis à Genete post decimum tertium annum os à natura expelli à vulnere quod diu in crure receperat, de quo in dies magis miror.

CAP. XVIII.

De discrimine à vulnere inflato à telo contundenti sumendo.



QUAE in principio huius libri vulnera capitis trifaria distingui diximus, nempe, aut ratione loci, aut ratione modi, aut ratione telus. Duobus igitur prioribus iam præostensis de ultimo vulnere nuuc agendum est, quod à telo cōtusiuo discrimen accipit. Hæc igitur contusiua percussio, vel cum vulnere est, vel sine ipso, si cum vulnere, nullum in curatione contusi vulneris ab alijs est discrimen, nisi in aliquatula mollificatione vel digestionem, ut cōtusiio, quæ immediatā agglutinationem prohibet, separaretur: quod Hippocr. tum lib. de vuln. lib. capitis, tum etiam de vlceribus, & Galen. 4. Metho. cap. 5. sic docet, Necesse est carnes contusas & incisas in pus verti, idemq; Auic. 4. 4. cap. vniuersali de curatione vlcerū testatur, omnia (inquiēs) vlcera indigent exsiccatione præterfacta ex attritione lacertorū, & ipsorum contusione. Sed non intelligas, obsecro, omne quod contusum est necesse esse in pus verti, passim nanque experimento videmus, maximas fugillationes, & contusiones citra vulnus per insensilem diffilatum discuti: sed eam duntaxat contusionem quæ cū exteriori vulnere est, in qua narius calor, atque spiritus ad exteriora exhalant, atque extraneus aer ambiens ad interiora penetret. Quo fit, ut natura, vel imbecilla, vel impedita nequeat, nisi

remota prius contusione, vulnus agglutinare. In contusione vero ~~contusi~~ vulnere exteriori contraria in omnibus ratio ac sanguis intus concretus, epius à natura discuitur. Deducit aperte hoc, vltra experientiam, atque eam quam adduximus, rationem, ex ipsa Hippocratis, & Galeni serie quæ loco citato sic sonat, Necesse est carnes contusas atque incisas in pus verti. Itaque tam huiusmodi capitis vulnera, quam alibi semper composita nuncupantur ex eo quod præter solutā cōtuitatem aliud accidens, puta contusio immediatā agglutinationem per primā intentionem prohibens, associatur. Ad huiusmodi igitur vulneris curationem prius ad digerendam contusionem properandum est deinde ad mundificandum atque carnem alendam, sed in capitis vulneribus ne periosum potretur breuiori multo tempore, quam in alijs vulneribus mollificantiæ quæ contusa vulneri adaptari solent sunt admouenda.

CAP. XIX.

De magno tumore cōtusiui in capite tam absque cranei rima quam cum ipsa euenienti.



SAEPIUS à contundenti telo velut lapide, ligno, ferro, & casu, vel morfu, & similibus, ingens contusio capiti euenire solet nulla extrinsecus apparente ruptione: sed hæc interdū absque cranei fractura, interdum verò cū ipsa. Nanq; Auic. 5. 4. cap. de fractura cranei asseuerate multoties accidit ut scindat craneū, & nō cutis, idēq; experientia ipsa docet: cum enim forte agens passum debile, ppter vtriusq; disproportionē prorsus negligat, atq; in passum magis resistēs fortius agat, ut Philos. 3. Metho. satis probat. Itaque in valida capitis

percuſſione a forti, & contundenti telo caluaria os magis reſiſtens citra cutisruptione ſepe frangit. De primo igitur eueſtu nempe ingeſis cōtuſionis abſq; fractura cranei caſum penē miraculoſum narrabo. Deinde verō fracturā cranei; intus latente; quibus indiſijs diſnoſcam. Quā etiā methodo curandum ſit in hoc eodē capite docebim. Quidā igitur puer quatuordecim annorū fortē ab excelsa turri ſuper locū lapidoſum admodū cecidit. Totum millico caput oculi; ac naſus; ac vultus; ac penē omne corpus intumēre; capite nullibi exterius obrupto: & puer denique mōtus & ſenſus expers velut mortuus in humo iacebat. Quā primū igitur extracta per venę ſectiōne ſanguinis quāritate; ac riuſus cū aſtas eſſet ſindone gelida maſſa facta totū inuoluim: quod ex Hippocratis ſnīa. 5. Aphor. 2. r. colligi poteſt; vbi inquit iuuenē bene carnoſo aſta te media frigide aquę multā pſuſio calore reuocet; calor autē exoluit ſcilicet per antipapilleſim calore natiuo fortiore euadente; atque Gal. lib. 1. de medicamentis ſimplicibus cap. 4. eiſdē quoque ſnīa Algiabas reperitur; atque Guido lib. 6. c. 5. de caſu & offeſſione. Vnde ſiue hac ſiue alia rōne ſuffulti; non ſolū vulgus ſed etiā medicorū plurimi ad haultū gelidę in caſu; & offeſſione bibendū pperāt; & certē multis iuuamento fuit incrassato forſan inde ſanguine ad aſſectamq; partē fluere inepto. Virtutibus etiā naturalibus gelida confortatis; vt 2. canonis cap. de aqua Anic. innuit. Quidā verō ē diuerſo hyemali tpe ſyndone meraciſſimo vino calido inſuſa patientem inuoluunt: deinde porionem Meſues contra caſum cap. de rhabarbaro ipſum puerū deglutire fecimus. Quippe que ad interna membra roborada magnā opem aſſert: in cuius doſi non granarhabarbari; vt perperā ibi inſcribitur; ſed dragmā intelligas. De

inde pertuſo capite quorū candidū roſato oleo omphancitidis; atq; myrtino cū puluere etiā roſarū; & myrtilloſū cōmixtum; agitātūq; toti capiti ſtupis adaptāmus pannis; atque deligatū ſuper admo-
tis: quo ſingulis diebus ad quintū vſq; vſi fuimus aliquātūta aleuiatiōe puerō inde ſequuta; licet Gal. placitis. 5. de cōpoſitione medicamentorū ſcđm locos; Myrtus (ſaltim inter initia) ſugillationū; & cōtuſionū nō arrideat ppter vehementē eius (vt inquit) aſtrictionē. Sed eius iuuamentū in hoc iā ſatis experti ſumus; neq; Gal. ipſe (vt eius ſeriem rectē inſpicienti patebit) myrtum abſolute in ſugillationibus; & contuſionibus vetat; præſertim ſi color ſugillationis ſit liuidus; interimq; cucurbitulas cum ſcarificatione tibijs; natis; atq; ſcapulis admoiuimus. Poſt quintū vero diem oleo roſato myrtino & camomillino mixtis caput totū fouimus ſuperſparſo puluere roſarū myrti; atq; baccarū lauri; & floris camomelli æqſ portioib; mixtis atq; de ſuper pannū cū eiſdē oleis actu calidis maſſa factā: deinde ſtupas; pānos; atq; deligationē applicauim. Sed interea tps tenui victu; nempe iure pullorū puer nutrebat; vt natura nō impedita in cibi craſſioris coſtiōe meli⁹ cōtra morbū operaret. Sexta vero die medullę caſiæ fiſtulę; & olei amigdalarū dulciū ana vnci. j. cum iure gallinaceo in ſulſo egroto propinauimus; vt Auic. 4. 4. trac. 2. c. 5. de caſu & cōtuſione docet. Reliqua verō quę ad integrā victus rōnē; reliuſionē; & corpis euacuationē pertinet ex capitibus ſuperioribus colligatur; trāſacta verō ſeptima die diminutoq; iā aliquatenus tumore toti capiti decoctum hoc actu calidū ſtupis; atq; pannis cū ſolita deligatione admoiuimus. Quod recipit florū Camamelli & melliloti; & roſis marini; baccarū lauri; ſthecadis granorum myrti; cumini ſingulorū. P. ſemiſſe omnibus

illo in c. nempe
omph. c. 5. de rha
barbaro. non ordinari
rhabarbaro; ſed mummy; O rubes in d. 2. ſit nary
Mummy conſectus. R. Rhabar. 3. j. Mummy 3. j. ad rubes
3. j. 1. 1. 1. Quod si sit vult Doctores Mummy (Mummy) de aut
est q. quantitas rubes q. parum admodum, et hoc loco granum 1. 1.
de dramma 1. 1. f. 1. 1. in Mummy 3. j. in conſect.

De Vulneribus capitis.

77

omnibus conuassatis, & secundum artem in tribus libris vini nigri, vsq; ad medietatis consumptionem incoctis, & excolatis fiat decoctum in quo vnci. iij. mellis communis diluantur, tractu vero temporis per aliquot dies emplastro, hic describendo maximum iuuamentum fuit assequutū: cuius hæc fuit permixtio. R. vini rubri lib. ij. olei camomelli, & mastichini ana vnci. j. & dimidia, mellis communis vnci. iij. pulueris maioranæ, anisi, florum camomelli, calamenti, melliloti, farinæ fabarum, panis à quo furfur non omnino separaretur ana vnci. iij. ad modum cataplasmatismis conficito, & in separatione ab igne addatur luteorum ouorum numero. ij. croci in pollinem redacti. scrup. j. verum licet diminuto tumore adhuc tamen puer semper delirabat, atque inter curandum lucernæ flammā manibus accipere conabatur. Transactis igitur iam quindecim diebus, sequenti emplastro rotus integer tumor per insensilem diffusum exalauit: quod Recipit vini austri nigri lib. iij. citoniorū immaturorū minutissimè scisorum ~~nume. iij.~~ nume. iij. coquant optimè, deinde addatur mellis communis vnci. iij. pulueris baccarum lauri, vtriusque anisi, fursuris torrefacti, & trituri oliban mastichis singulorum vnci. iij. arte ad ignem emplastrum conficiatur, thure videlicet, & mastiche extra ignem admixtis. Fieri etiam potest sola citoniorum in vino decoctione, & expressione, alijsque simplicibus commixtis, atque incoctis: hac denique medendi ratione puer ille nutu Deipræter omnium, atque meam spem à morte euasit, nulla in capite facta apertione: mansit tamen circiter medietatē anni immemor, ac veluti mente perturbatus propter cerebri ventriculorū, atque eorum virtutum maximam cōmotionē.

Cæterum si vnq̃ contigerit huiusmodi con-

tusione non posse per halitum digeri, ea suppurata conuenienter referetur: hinc verò vlcus (vt iam supra latissimè ostendimus) curetur. ¶ Hactenus de magna capitis contusione sine cranei fractura, & pariter absque vulnere cutis latissimè disseruimus: nunc verò de ea in qua os caluariæ (vt iam antea diximus) absque villo exteriori vulnere frangitur cuius Auic. citaro iam loco meminit agendū est. Cuius fracturæ hæc sunt notæ, oculorū caligatio, vertigo, vomitio, casus, syncopis, quibus apparētibus verissimile est os esse disruptum, vt Cornel. Celsus lib. 8. cap. 4. docet sed vltra hæc prætiū operæ est atq; expertum ad hanc latentē fracturā explorandā sequens emplastrū actū calidū raso capiti superimponi, quod recipit thuris, cæræ, labdani expurgati, ana vnci. & semi. confice secundum artē emplastrū, & per diem integrā cum decenti deligatione dimittatur. Semoto verò emplastro si fractū os sit, pars ipsius emplastri, quæ fracturæ correspōdet, siccior quā in alijs apparet ac perinde pars ipsius cutis excicata, ac tenuior euadit. Tunc ergo nulla interposita mora ad apertionē & cranei detectionē properandū est, donec quicquid læsum in ipso est in conspectu pateat: deinde vt capite de penetranti cranei fractura dictum est, curetur: quæ quidem fracturæ cranei species nobis conuentibus hæc cuidam puerulo euenit, nullibi cute vulnerata, quem deliria, vomitiones, febres infestabant, eique explorandi gratia apertūculam feci, atque ex templo non solum latentem, ossis fracturam, sed etiam ipsius super cerebri membrana compressionem inueni: & tunc ampliorem faciens sectionem fracturæ sine non inuento, longius enim discurrerebat, nempe ad sagittalem vsque futuram, & propter subiecti puerilis imbecillitatem operisq; apertionis scruitiam,

non

nō ausus fui vulnus amplius dilatare: sed curatione posita capit. de fractura cranei penetranti ad Deū laudem sanitati fuit restitutus. Alios etiam casus huic similes enarrare possem; nisi proluxa oratione legentium aures offenderem.

CAP. XX.

Disruptionis venularum sub craneo à forti ictu vel casu, in qua craneo ipso integro symptomata assurgunt quę penetrantem fracturam comitari solent.

PAVCI quidam auctorum repertiūtur, qui huius ingentis mali meminerint; inter quos antiquissimum Cornelium Cellum libr. 8. cap. 4. atque ex neo-thericis Dylum Florentinum ipsum sequentem potissimū inuenio. Sed eos certe mirari satis nequeo, quippe cum atrocem hunc casum tantum cum afferat de eius remedio nullam penē verbum fecerint: Deterrimum quidem pręsagium qui citato loco sic inquit. Rarō sed aliquādo tamen inuenitur ut os totum integrū maneat: intus verō ex ictu valido aliqua vena in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat, isque ibi concretus magnos dolores moqueat, oculos quibus obcecet. Sed obcecati oculos, nō intelligas oculos inflari, nec visu priuari, ut medicus quidam assererebat, sed in mortis caligine vulneratam incurrere. Nōnulli enim ex simili percussione citra oculorum eegitatem, ut experientia vidi, mortui sunt, pręsertim oculis viliere non correspondente, in historia etiam Beatę Lucię legim⁹, erat matrem, mortem oculorum nūcu

passe: huic etiam meę apertissimę sententię antiquior alia Cornelij series subscrit, quę loco illius dictionis, Oculos quibus obcecet, habet, à quib⁹ nemo liberatur. Denique quia veluti desperata salutē nullum penē essetū dignum consiliū authores tanto malo attulerint, itaq; longa mea experientia ductus nonnulla forsā vtilia tā circa indicia, quibus hęc pessima affectio à principio dignoscat, quā circa eius curandirationem afferam. Primò igitur hęc erunt huius mali notę, nempe si vulneratus deficit, cecidit, euomit, oculi caligauerint, atque vertiginem & soporem æger patiatur, excitationisque deliret, si aliquid etiam sanguinis per aures, nares vel os emisit tunc credibile est internam aliquam cerebri membranę venulam intus esse disruptam maxime accuratissimē cranei fractura post apertionem carnis amplam perscrutata, ac nullibi inuenta, ut experimento vidi cuidam iuueni prędictis symptomatis laboranti euenire. Cum igitur hoc cōtingerit, cōsultis prius antiquis medicis (quod chirurgos facere non pudeat) facto mortis pręlagio, craneū integrum terebrādū est facta prius venę sectione, atq; cruentis grumi super durā cerebri membranā inuētis, atq; optimē absterfis prędicta curatione capite de fractura cranei penetratū curet, hoc vno addito ut siphone, vel si ringa subtili argēti sanguis à dextra sugatur, extrahaturq; atq; aliquo lauacro mūdicante & confortante eodē instrumēto iniecto locus mundificetur, & roboretur, quod in antidotario nominatim dicam. Super duram verō cerebri membranā comixtio quędam mellis rosati & aquę vitę æquali portione infundatur, atque in petiula panniferici rubri argēti specillo etiam adaptetur: desuper vero unguentum gummi henemi, vel resinę attractiuum, vel confortantia emplastra

De vulneribus Capitis.

79

plastra in antidotario describenda admo-
ueantur. Sed hoc intelligas, si propter in-
scitiā chirurgi, vel aliam causam trepana-
tio seriū quam oportuerat moliatur, fa-
cta trepanatio ne non admouendum esse
miscellam illam qua in alijs casibus vri-
mur: nempe olei rosati omphacitidis tri-
bus partibus cum vna mellis rosati, sed
admouendum esse duntaxat mel rosa-
tum simplex. Hoc vnum tandem scito,
interdum venulas tenuis meningis siue
piæ matris etiam disrumpi, quod si con-
tigerit, tunc trepanatio, siue citius, siue se-
rius fiat nullum facessit negotium, sed
cassa ac prorsus nulla esset: quoniā cruen-
ta humiditas ē vasculis suis iam egressa
intra cerebri substantiam facile illabitur,
atque eam corrumpit.

CAP. XXI.

Cuiusdā speciei fracturæ cal-
uariæ à contundenti telo eue-
nientis, in qua interdū vtrāq;
ossis tabella ad intra compri-
mitur: interdum verò inte-
rior duntaxat altera nem-
pe superiori suum lo-
cum adseruante.



Contingit interdum, vt in
vulnerum capitis diuisione,
ostensum, atque pericu-
lo à me compertum est:
ex contundenti telo, vel
ingenti casu, modo vtranque ossis lami-
nam frangi, ad interioraque comprimi:
modo verò tantum secundam internam,
priori non compressa, vt in vrbium mœ-
nibus tormentis concussis nonnūquam
euenire solet. Cuius fracturæ speciei Ga-
lenus sexto. Method. capi. sexto. & Paul.

libr. sexto. capit. 90. at Bertapalea. 6. libr.
suæ. Chirurgiæ sunt memores: quæ qui-
dem fractura ob id, quia camera modo
exaltata relinquitur, ab ipsis Camarosis,
vel Camaromata nuncupantur, in qua
internæ tabellæ, & os cerebri membra-
næ intus innititur prima non compressa:
sed huiusmodi certè fractura admodum
difficilis cognitu est. Verum præter com-
munia aliarum fracturarum indicia, hæc
adsunt nempe spiritus angustia, atque fre-
quētia, febris ac symptoma morbo com-
muni simili, propter membranarū ce-
rebri compressionem. His igitur inter-
nam noxam ominantibus ad detectio-
nem, atque internum malum præseru-
tandum prope accingendum est, tum vt
cerebri meninges ossis eleuatione de-
grauentur, tum etiam ne cruenta humi-
ditas intus concreta, ac deinde membra-
næ ipsæ putrescant: statim igitur prædi-
ctione facta, osse satis detecto emissariū
sufficiens moliatur: atque respiraculum
aptiori aliquo ex nostris, supra com-
memoratis instrumentis, deinde per cranei,
quod fecisti orificium, in prima tabella
specillo immisso, interna ossis peticula
compressa tactu solida reperietur: tunc
eleuatorio ferramēto indolerosius quò
fieri possit vel extrahatur, vel in suam se-
dem sensim reducat, cura adhibita, vt
cranei orificium vtranque ossis tabellam
comprehendat. Deinde pro huius vulne-
ris completa curatione ad capitulum de
fractura cranei penetranti, necnon ad an-
tidotarium recurrendum est. Nec sub si-
lentio prætermittā per q̄ rarissimum ca-
sum. Vidi certè puerū, quatuor suæ ætatis
annos agēte, cū maxima cranei fractura
multis in locis cōpressa lethalibus sym-
ptomatis iam laborante, cui ossa tenuissi-
ma ad intra compressa eleuatorio instru-
mēto sensim in suā sedem eleuauī, paruo
in decliuiori pte ossis relicto foramine:
reliqua

reliqua verò ossa propter pueri imbecillitatem eleuare minimè ausus fui: & ecce præter spem reliqua ossa, quæ inæqualia reliqueram ocissimè callo conglutinata inueni, puero ad Dei laudē euaso.

CAP. XXII.

Cuiusdam percussione caluarie os citra fracturam comprimētis, ut infantum, ac puerorum, ut plurimum, capitibus interdum cum vulnere interdum sine ipso euenire solet.

QUOD Iam ut experientia sæpè docet, atque Paul. libr. sexto. ca. 90. & Haliabbas 9. practicæ atque alij auctores huius speciei cranei fracturæ, vel potius flexus sunt memores. Itaque de ipsa quam nonnunquā vidi & Dei auxilio curauī caput edere decreui, quæ quidem à Paulo loco citato thlasis dicitur: Quod contusio, vel compressio ossis Græcè sonat. Hæc igitur ossis ad interiora citra fracturam impulsio à contudenti semper telo infantibus, ac pueris ut plurimum: interdum verò mulieribus ob similitudinem corporū humidam habitudinem, vel ob ossis molitiem euenire solet: quia in ipsis ossa humidiora cum sint potius flexili, quam fracta sunt apta, ut in plumbeis vasculis atque virentibus cucurbitulis lapide, seu baculo percussis contingit. Flectuntur enim & non franguntur, cuius oppositum in ossibus siccis euenit, & certe non solum capitibus ossibus, hæc flexionem citra fracturam euenire vidi, sed etiam in puerorum brachijs, inter quos vidi filium domini

mei Ducis Infantatus Inachi à Mendocæ, cui in brachio eadem ossis flexio accidit. Eademque ossis cranei flexio, & signa à Nicol. Floren. serm. 7. c. 54. de fractura cranei, in hunc modum adducunt patiens somniat hostes eum inuadere, dormiendo surgit, & fugit, vel arma, ut se defendat inuadit, quia eius imaginatio est læsa. Curationi igitur accedentibus eandem ossis compressionem distinguam. Aut enim cum vulnere, aut absque ipso, huiusmodi compressio euenire solet: quæ autem cum vulnere exterius apparente, facta ipsius sufficienti ampliacione, vulnere capitis curationem (iam commemoratam) expostulat. Cæterum depressum os sequenti methodo in suam sedem reducere conandum est, suppositis videlicet, congrua victus ratione, & aluo soluta, & vena secta (ut iam antea diximus) in teneris verò pueris, crura scarificare potius quam venam aperire commodius est, ut auctor est Gale. tum Commentario. 17. 2. libri Aphor. tum etiam libro de reuulsione cucurbitulis hirudinibus, scarificatione, intitulo.

Ossa igitur siccis linamentis optime absterse iam fluxione ad affectam partem minimè irruente, capite pertuso cucurbitula loco percussione citra scarificationem admoveatur. Sed interea temporis ne materies ad locum vitiatum cucurbitule tractu magis fluat: dolorificis extremitatum frictionibus, tum deligaturis artibus utendum est. Post aliquam verò moram cucurbitula subito violentia quadam sursum eleuetur, atque auferatur: mox medicamentum resine attractiui quod vocant vulnere immediate admoueto, vel gummi benemi, modo emplatri superponatur, cæterum super totum caput sequens medicamentum admouendum est. R. vini rubri lib. ij. olei absintij, & camomeli singulorum vnc. j. & dimidia mellis

De Vulneribus capitis.

81

communis. vncij. iij. rosarum, florum camomeli, & sthecadis, melliloti, fursuris torrefacti & trituri singulorum P. j. trituratis triturandis secundum artem emplastrum conficiatur, atq; in separatione ab igne ouorum duo lutea addenda atq; commiscenda sunt. Præfatę cucurbitulę vsum in huiusmodi ossis compressione vltra quotidianam obseruationē ex verbis etiam Guido. tracta. 7. cap. de cucurbitulis, deprehendere possumus: qui ad reductionem costarum & aliorum ossium plicatorum cucurbitulam admoueri iubet, idemq; ex sententia Auic. colligi potest. 5. 4. cap. de fractura costarum: qui ad reducendam costam fractam in suam sedem ipsa cucurbitula vtitur sed oportet (vt inquit) vt in eius retentionem nō de moremur. Ceterum si ossis depressio absque vulnere prorsus cōtingat) vt sepe vidē (tūc aut contusa caro in molē insignē attollitur, sanguine nimirum extra vasa propulso, intusq; concreto, aut non, si primum, ad digestionē per halitū tēperatis medicamentis inter initia properādum est: fortia enim discutiencia potius dolorem atq; fluxionem concitarent. Sed oportet corporis euacuationem per sanguinis missionem atq; alui solutionem saltem per clysterem præcessisse. Nam vt docet Gale. 1. 3. Metho. atque pluribus alijs in locis nullo euaporantium auxilio r̄um ante corporis euacuationem vten dū est. Tumore igitur iam cōmemoratis medicamentis prorsus discusso, tunc ad ossis depressi eleuationem cucurbitula parietate admoveatur, vt iam diximus, ita vt sensim in suum locum os depressum reducat. postea medicamentum ex fermento cum modico terbinthi nē admixtum cum paucis sulphure conficiatur. Ad idē quoq; R. mellis decocti lib. j. cui adde fursuris torrefacti, & trituri P. j. sulphuris. vncij. j. salis. vncij. 8. & dimi-

dia pu' ueris summitatum absintij. vncij. ij. fiat emplastrum vel ex solo gummi hē nemi quod manibus oleo camomillę perunctis subigatur, ad eandem quoq; curationis methodum emplastrum ceroneum, amoniaco mixtum accommodatur nec non ~~fermentū~~ ex resina, cera, liquefactis, armoniaco, ac longa aristolochia in pollinem redactis simul commixtis & vltimo oleo sisamino subigatur, sed si forsan omnis ossis depressio omnibus commemoratis auxilijs in propriam sedem non reducat: non semper cucurbitulis vtamur, ne immodica humorum attractio in partē affectam fiat: sed si exigua quantitas compressi ossis super sit prauis symptomatis deficientibus tunc intrepidē sic dimittenda est: citra vllam namque noxiam in pueris nonnullis vidi similem modicam compressionē per longam temporis intercapedinem minime nocere; imo multos post annos à virtute adolendi os ipsum in suam sedē à natura in ea penitus reduci, & quod miror, narrabo me vidisse post duos mē ses vulnus capitis cuiusdam pueri cum os se cōpresso in quātitate vni' assis, nullo in festante symptomate, & non ausus fui os eleuare, sed sic compressum dimisi & sic deo auspice puer integrē sanitati suę restitutus. Verum enimuero si huiusmodi ossis flexio vt sepe vidi citra tumorem carnis euenerit tunc præmissa venæ sectione vel crurium loco eius scarificatione, cucurbitula alijsq; præsidijs in suū locum os illicō reducere conandum est. Quidam certē Italus chirurgus haud obscuri nominis dentibus suis cuti percussę partis infixis, omni die mane ieiunus sensim puerile os extorsam traherat quod multis iuuamēto fuit. Idem etiam fieri potest longis capillis digitis reuolutis, cūte sursum fortiter eleuata. Sed si forsan ob nimiam ossis ad intra

cetorum //

F oppres-

oppressionem cerebri membranis vel ipsarum venulis noxia vel ruptura impartatur quod symptomatum indicij perito medico palam erit, tunc quidem nulla mora interposita os ipsum veluti alijs fractum & compressum terebratione & eleuatorijs instrumentis vtendum est, octo documētis iam suppositis in osium perforatione animaduēsis cura maxima adhibita vt membranarum cerebri noxiæ si qua est pro virili subueniamus & curatione iam dicta capite de fractura cranei omnino penetranti ad finem vsque procedatur.

CAP. XXIII.

De relaxatione compaginis futuræ sagitalis vel coronariæ.

ROST omnes fracturarum cranei species superest modo de laxatione alicuius capitis futurarum superiorum agere, quam interdum periculo iam euenire vidi: cuius Razes sui Cōtinentis lib. i. c. 10. atq; etiam. 15. eiusdem Continentis meminit. Vbi enarrat ex casu iumenti cuidam viro vtriusq; futuræ, nempe coronariæ, atq; sagitalis laxationem euenisse: sed hæc trifariam (vt experientia iam didici) vt plurimum puerorum capitibus ob eorum molliem euenire solet: nempe aut ex tēplo percussione accepta absque vlllo extrinseco vulnere. Secundò post aliquam tēporis intercapedinē, sanguine videlicet extra vasa effusio, ibique sensum retento, ac futuram ipsam laxante. Tertiò artissimò vulnere in summo capitis inflicto nullo facto meo humiditati expellendæ emissario: quo fit vt pus ibi retentum non solum futuram laxet, sed refirdatione, & instillatione ad interiora penetret, conficitatis inde prauis

symptomatis. Si primo igitur modo futuræ laxatio contigerit ijs, vt experientia docet, cognosces, oculi lachrimantur grauantur lumen fugiētes, quos veluti à sopore excitati, ac spergefacti aperire nequeunt: locus præterea percussione naturali futurarum sedi inest molliori solito loco redacto: in pueris præterea (præsertim infantibus) cerebri membranarū motus percipitur: quod si contingat præmissa corporis euacuatione, secta vena, vel aluo cita, confortantibus ac stipticis ac discutientibus medicamentis veluti stecadis, Rosis, absinthio, balostijs, schinanto vacis lauri camæmilla, alchermes & ei similibus vino incoctis vtendū est: addito in ligatura, inter quoquendū puluere. Thuris Mastichis gūmi iuniperi, quod vel stupis vel triangulatis pānis ad moueto constringenti deligatura duorum imitiorum super imposita. Ad idem quoque operæ precium est, totum locū futuræ ~~enim~~ laxatæ, sirupo mirthino & citoniorum simul ad punctū penè solidū incoctis linire: puluere corticum citri, coriamdri præparati, Rosarum, capulorum serici, ligni aloes, Mastichis stecadis atq; bretonicæ ana super sparso. Sed hoc medicamento non nisi principio iā trāfacto vtendū est. Verū si tēporis tractu ex sanguine citra vulnus (vt diximus) ibi retento futura laxetur: eisdē medicamentis etiā vtaris aliquantulo mellis cōmixto, & cum noua spongia, decocto calido supra cōmmemorato infusa, locus foueatur. Nec alienū erit, factis iā vniuersalibus vacationibus, siccā cucurbitulam (vt extrorsus materia trahatur) loco admo-ueri: brachijs atq; cruribus interea tēporis fusticulis constringentibus deuictis. Verū, si forsam cōtigerit, vt ego nonnunquā in hoc affectu vidi, puerorū oculos post tēpus lachrimari, ac penè caligari, sectionē retro collū cucurbitula etiā præcedenti

CAP. XXIII.

Quo indagatur, vtrum men-
struantium mulierum aspectus &
earum lintea, vel panni vul-
neratis nocumen-
to sint.



VM in vtero materno fa-
gacissima humana natura,
cuius opus intelligētiā est.
12. Meta. Phil. affeuerante
perfectius opus, nepe virū
edere nequeat: foemina nempē, veluti ex
occasione produxit. Quocirca occasio-
natus vir mulier nuncupatur. Quē quidē
tū quia, virtutis robore masculi, tū etiam
ab eius forti exercitio lōge abest: nec nō
quia calidissima mulier frigidissimo vi-
ro est frigidior, vt Philosophus tenet li-
cet. Hippo. lib. de morbis mulierū, aliter
sentiat: hoc tñ ex accidenti est intelligē-
dū. In his igitur nutrimentū non itidem
in nutritū vt in virovertere neq; cōficere
natura valet. Sanguis igit qui membrorū
nutrimēto superat, veluti prorsus extra-
neus corrūpitur atq; per mulieris vterū
quolibet mense vt plurimū extra corpus
expelli. Quocirca mēstruū à mense no-
menclaturā accepit. Vñ Gal. nōnullis in
locis mēstrua, lunares excreationes nun-
cupauit & quia spatium temporis mensurā
di motū lunæ dominātis super vnūquod
que humidū est. Cui? mēstrui assueti flu-
xus suppressione mulieres, ac potissimū
iuuenes multis ac prauis (vt notū est) affi-
ciuntur morbis. Tēpore igitur huius infe-
cti sanguinis mēstrualis expellēdi mulie-
res ac præsertim praua tēperatura ac pra-
uis moribus prēditę quadā tenas veneno
participāt, his verò oppositę nō itidē. Ille
igit tunc tēporis vsq; adeo visum, anhelū
tū, tactumq; habēt infecta, vt etiā speculū
nitidum maculent vt experientia docet,
F 2 idemq;

dent, vbi prima vertebra cum capite cō-
mittitur, eis conuenientissimum est, ad-
moueri eundemq; locum linimento sic
confecto antea liniri. R. olei vermium
terrestriū, Irini, & delateribus. ana. drag.
j. pulueris vermium terrestrium, grano-
rum paradisi, galangæ, ana. scrup. j. cum
pauca cera vnguentum conficito super
futuram verò aliquibus iam elapsis die-
bus, oleum balsami, seu delateribus, cum
aqua vitæ commixtū in pannis admoue-
to: & in fine emplastrum baccarum lauri
rectē applicatur, si autem huiusmodi fu-
turæ laxatio ex materia in vulnere arcto
retenta fiat, nempē ipsa materia ad inte-
riora sensim refudante, vel instillante: sub
sequuto postea aliquo laterali symptoma-
te, tunc periculi vulnerati, præsagio fa-
cto, vulnus ad sufficientem vsq; olis de-
tectionem versus alterum latus, vt emis-
sarium superfit, secare oportet, atq; à fu-
tura quantum remotius fieri possit, cra-
neum perforare, & curatione penetrant-
is fracturæ cranei iam tradita curari: &
licet tempus terebrationis seriū debito
videatur, vt pote post decimū quartū: tñ
contingibile & rationi nō alienū erit cō-
numeratione a die percussione facta, ef-
se decimumquartum & instillationis
humiditatis super cerebri membranam
sextum, aut septimum quod in alijs e-
tiam fracturis euenire poterit. Si verò
futuræ ampla relaxatio cum magno
vulnere in carne, & periosio conti-
gerit vt nonnunquam vidi ita vt concre-
tus intus sanguis ad exteriora ore, &
naribus clausis spirituque retento
egredi possit & medicamentum
mundificans ad interiora in-
gredi, tunc curatione fra-
cturæ caluariæ penetran-
tis cuius capitulum
iam præcessit
curetur.

idēq; 2. de fomno & vigilia Philosophus testat atq; etiā Plinius lib. 7. cap. 15. Ac perinde Conciliator differentia. 64. sanguine etiā menstruo à canibus degustato in rabiem aguntur. Mulieris rursus mēstruat peruetu atq; contactu acefcunt musta & arborū fructus marcescunt, & in alueis apes moriuntur. & alia monstrifica eueniunt quæ loco citato à Plinio & lib. 28. c. 7. cōmemorant atq; etiā vt Selinus. c. 4. asseuerauit huiusmodi etiā mēstruātes mulieres præsertim vt diximus tēperaturis atq; moribus præditæ efascinatrices publicè vocant, quia puerulos tenerrimos visu, anhelitu, & tactu inficere sæpius solent. Vulnera igitur ab ipsis inspecta longè magis inficient & certè huius rei oculatus sum testis, vidi enim vuln^o cuiusdā adolescentis hilaris atque rubentis coloris, visu mēstruatīs mulieris statim liuescere. Modus igitur inficiēdi vulneris forsā est. Si visus iuxta Platonis & Empedoclis sententiā extramittendo visorios spiritus fiat, ipso medio aeris infecto vulnus attingente ipsum inficiūt veluti speculum solidum longè minus passibile inficere solēt. Si vero intus suscipiēdo vt Aristotelicū peripateticis placuit, eodē ferè pacto aere cōtaminato medij, muliere mēstruātē vulnus inspiciente inficiūt, vapores enim putridi vt venenati, q in motu visuos spiritus ab anima immisfos ad cristalloidē vsq; insequunt ac inde exhalantes mediū inficientes vulnus inficitur cōtinuata nimirū aeris infecti successione. Cæterū si visus utroq; modo nèpe extramittēdo & intus suscipiēdo (vt nōnullis visum fuit) perficiat tūc visui spiritus infecti extramissi obiecti speciebus adiūcti per modū pyramidis pupillæ & cristalloide delatis ac reflexis densissimū speculū, vt prædictū est, intra spherā suæ actiui tatis sæpius maculātes à fortiori tenerrimū vulnus maculabunt. Quocirca reco-

ptū iā à callosis chirurgis in praxi est, mēstruātes mulieres procul à vulneratis abijcere. Ad Hæc Lanfrācus in facultate chirurgi nō postremæ notæ tract. 1. doctr. 3. c. 6. magnopere monet ne mēstruata mulier ad fauciatū accedat, neque ipsum intueat: eadem certè imo à fortiori ratione mēstruantū pāni internarū tunicarū vulneratis nocumēto erunt. Res enim cōtū realī seu physico, vel intēctionali intēsiūs multo agit. Cauēdū quoq; haud mediocri solertia est, ne linamenta, neq; pāni vulneribus admouenda ab ipsis mēstruantibus mulieribus tāgantur: ex hoc enim vt lanfrancus ibidē asserit maximū parat vulneratis nocumētū. Nonnulli, etiā callosi chirurgi cauendū esse asseuerāt, ne panni ac linamēta, quæ à vulneribus auferunt à radijs lunaribus tangerent: nocere enim hoc periculo cōpertū sibi esse dicunt. Suscepta forsā inde influentia aliqua vulneribus obnoxia.

CAP. XXV.

De Antidotis vulnerum capit
tis secundum varia vulnera & tempora
atque temperaturas variasq;
curandi intentiones.

RIMO inter initia si sanguinis profluuiū instauerit peculiari ad hoc medicamēto succurrat, nempe cādido oui addito puluere thuris, aloes, pilorum leporis minutis incisorū ana. drag. j. plurimū simul agitato, verū in humidis tēperaturis plus thuris, in siccis verò pl^o aloes cōmiscendum est: quod Gale. 5. metho. c. 4. mille effert encomijs: supraverò pannū ex posca, vel oxicato madefactū admoueto, ita vt omnes vulneris circumferētiās attingat. Verū si huiusmodi vulnera ex eis sint, quæ futurā postulēt, nèpe in partibus capitis lateralibus inflicta atque à telo

De Vulneribus capitis.

85

à telo incidenti tunc aglutinātibus medicamentis procedendum est, veluti vnguento gummi vernicis vel iuniperi super vulnus admotum: de super verò pan-
nū in austero vino siue stiptico (quod vo-
cant) imposito vel puluerem infra, de-

dicendum

bet vulnere immediate spargito, super im-
posito panno in sequēti instillatione ma-
defacto R. olei communis. lib. iij. aque vi-
tæ lib. j. & semis bistortæ vnc. viij. radices
pentaphilonis. vnc. iij. thuris, myrhæ,
aloes, ana vnc. i. puluerizatis puluerizan-
dis & optimè mixtis cum oleo & aqua
vitæ per instillatorium vitri distilletur.
Pulvis autem super spargendus sic confi-
citur R. thuris, mastice, sarcocollæ, san-
guinis draconis, tormentillæ aloes, myr-
rhæ, ana. drag. iij. fiat pulvis. Fieri etiam
potest prius linitio præfati olei: demum
prædicti pulueris sparsio. Ad idē quoque
non parum confert oleum illud instilla-
tum cuius lib. 2. de vulneribus neruorum
in antidotario meminimus, in quo po-
tissimum herba hipericonis, & valeria-
næ, & cardi benedicti ingrediuntur.

Medicamentum digestiuium
(quod vocant) quo non aliter vtendum
erit nisi quando vulnera capitis secun-
da intentione (quam vocant)
curantur.

R. Luteorum ouorū num. ij. olei rosa-
ti omphacitides guttatim mixti
simul, atq; agitati, quod sit fatis, confice
ad mellis crassiciem. Competit præfer-
tim temperaturis quidem humidis, vel
vulneribus contusis nō immediate aglu-
tinandis, in ficcis vero temperaturis dige-
stuium hoc ex ter bintina de beto vnc. j.
luteorum ouorum num. ij. sensim mix-
tis vnguentum conficito.

Medicamentum pro circum-
ambitu vulneris.

R. Albuminum ouorum num. ij. olei
rosati completi vel omphacitidis
vnc. j. & semis. plurimum agitur & in
stuppis in circumambitu vulneris super-
ponatur, facta prius oleo rosato calido fo-
mentatione.

Aliud ad idē medicamētum.

R. Olei rosati omphacitidis, vnc. iij.
cærx alba quod sufficiat ad coagu-
lationem: quibus simul ad ignem liquefa-
ctis addito boli armenici. vnc. semis. ro-
sarum rubrarū, sandalorum rubeorum
coralli rubri, granæ finissimæ, pulueriza-
torum ana. drag. j. quibus optimè agita-
tis candidum oui atq; guttæ aliquot ace-
ti rosati addantur, & plurimum sensim
agitantur. Vnumquodque enim istorum
medicamentorū fluxum cohibendi atq;
dolorem leuandi vim obtinet. Cæterum
quia in capitis percussione præsertim
cum cranei læsione ventriculus ob eius
cum cerebro continuitatem compatitur
cōcitata inde vomitione. Itaque ad ipsius
ventriculi confortationem sequenti vn-
guento illiniatur.

Ad ventriculi confortationē

ex affinitate cum capite laboran-
tis medicamentum.

R. Olei rosati omphacitidis, olei ma-
sticini, vini albi, decoctionis rosarū,
mentæ, & spicæ nardi ana. vnc. ij. coquan-
tur simul vsque ad vini consumptionem:
post addatur pulueris rosarum mentæ, &
mastice, pulueris aromatici rosati ana.
scrup. ij. cum sufficienti quantitate cærx
vnguentum conficietur.

Vnguentum ad prohiben-
dam conuulsionem, quæ vulnera capitis
comitari sæpe solet quo spinalis me-
dulla collum atque emunctoria
linienda sunt.

R. Axungie gallinæ, & anseris olei iri-
ni & camæmelli & vermium terre-
strum

strum olei vulpini ana. vnci. semis cum pauca cera vnguentum conficito: cui ad de pulueris vermium terrestrium. drag. j. yfopi humidę drag. iij. pulueris castorei scrup. j. Quo quidem medicamento transacta iam septima die potissimum erit vtendum.

Ad tensionem conuulsuam membranarum cerebri.

Verum si vnquam contigerit cerebri membranam post ousis perforationem tensione conuulsua tentari hoc medicamentum primas tenet. R. corticū radicū altheę recentis, fenu graci camę milli: maioranę thęcadis ana. P. semis fiat decoctum in aqua secundum artem postea excoletur & exprimitur & hoc decocto calido caput totum prius pertusum atque etiam partes colli, & ceruicis sordida lana in eo infusa imbibito postea pannis calidis humiditas illarum partiū exsicetur, & predicto vnguento contra cōuulsionem (cuius supra meminimus) liniantur, membranę verò tensę medicamentum ex mucillagine corticum radicū altheę modico pulueris olibani albi gummosi, nec nō pauculo croci superadditis optimum est, ea methodo eo vtentibus, quam superius recensuimus.

Ad cōfortationē durę membranę cerebri, tensione iam remota, medicamentum.

R. Pulueris granę sinisimę foliorum auri ana. drag. j. mellis centaureę vnci. semis aquę vitę, mellis rosati ana. vnci. semis misce.

Medicamentum membranę post ousis perforationem nudatę adaptandum.

R. Olei omphacitidis, ex oliuis atq; rosif vtriusq; immaturis confecti partes. iij. mellis rosati colati optimi partē. j. sed in hoc medicamento vt iam supra e-

tiam, terigimus: oleum sensim minuendum ac mel rosatū addendum est donec ad mel simplex perueniatur. In sera vero ousis perforatione nequaquā oleo vtendū in trauula erit vt iā latius supra asserauimus: sed simplici melle. Ad idē inter initia atq; etiā post quomodolibet applicet oleū Hipericonis operę pretium est.

Ad carnis productionem in membrana cerebri.

CAeterum cum iā carnis productio ne opus fuerit ipsa mēbrana iā pura in ficcis temperaturis sequens fiat commixtio R. pulueris corticis thuris qui valentius quā reliquę olibani species exsiccat Authore Gal. 3. meth. cap. 3. Aristolochię vtriusque ana. dragm. j. farinę orobi scrup. ij. misce cum mellis rosati excolati. vnci. ij. & terbintinę ex beto vnci. semis. mellis centaureę. drag. iij. misce.

Ad productionem carnis super duram cerebri membranam in temperaturis humidis.

R. Granorum myrti, thuris albi gummosi farinę ordeī ana. dragm. j. fiat puluis. Quo tam per se quā melle rosato commixto vti poteris.

Ad idem in temperaturis mediocribus ad carnem producendam.

R. Corticis radicis oppoponaci granorū mirthi, sanguinis draconis ex gutta, farinę fabarū sarcocollę, mirrhę, mumię ana. drag. semis. mellis rosati excolati, quod sit satis commisceto: & vt ere eo siue in polline cum linamentis ficcis, siue melle rosato admixto, vel cum modico melle centaureę.

Medicamenta vulneribus capitis admonēda desuper, nempe post admota linamenta inrerius.

R. Vnguenti gummi, vnguenti aurei Guidonis emplastri centaureę cuiusque

iufq; vnci. femis. omnibus liquefactis vnguentum confice. At verò si solidius, quã oporteat, fuerit, guttulæ olei maffichini, vel rofati addantur.

Ad idem, maximè temperatu
ris humidis, profuturum medicamentũ.

R. Vnguenti tetrapharmaci, seu bafiliconis partes. ij. emplaftri centaureæ partem. j. vnguentum confice.

Ad idem quoque proficuum
medicamentum.

R. Olei rofati, & maffichini ana. vnci. & femis, succi betonice vnci. ij. vini albi odoriferi ex decoctione cetaureæ rofarũ, & baccarũ lauri ana. vnci. ij. & femis ferueat fimul vſque ad vini & succi conſumptionẽ poſtea addatur refinẽ, terbentine ana. vnci. j. thuris mafficis, puluerizatorũ ana. drag. iij. cæz quod fit ſatis vnguẽtũ confice ſuper addito puluere granæ finiffimẽ drag. j. in pueris vero vnguẽtum pallidum, ſeu bafilicon præſertim aliquantulo thuris admixto ſat erit.

Vnguentum Iſis chetali ci ad cranei præciſionem vt Galenus tradidit. 4. tum. 5. de compoſitione medicamentorum per genera.

R. Cæz denarium pōdo. c. terbintinẽ denariũ pōdo. cc. ſcamnẽ gris rubri denariũ pōdo. viij. æruginis rafæ denarium pōdo. viij. Ariſtolochiæ rotundẽ denarium pōdo. viij. thuris, denariũ pōdo. viij. ſalis amoniaci denarium pōdo. viij. guttæ amoniaci denarium pōdo. viij. aluminis cõbuſti denarium pōdo. vj. æris vſti denarium pōdo. viij. mirrhæ denarium pōdo. xij. aloes denarium pōdo. xij. galbani denarium pōdo. xij. olei veteris heminam. j. acet. heminas. ij. quæ liquari poſſunt ſiccis in mortario ſuper infundantur. Hoc vnguẽtum Epigonij qdã alij verò heras appellat. Ceterũ vnus ex Galeni præceptoribus vt ipſe inq̃t dracunculi radi-

cis denariũ cõmiſcebat. Hoc nẽpe medicamẽtũ eſt qd̃ in antiqua traduccionẽ vnguẽtũ Ephifeos corrupte nũcupabatur: hoc etiã vnguẽtũ eſt quo Eudem⁹ ſenex ſtatim mēbranis ab oſſe detectis vtebat̃ & præter ip̃ẽ multis fuit auxilio vt Galen. 6. meth. c. vlt. in fin. teſtat̃ licet apud ip̃m nõ ſemper tutũ erat vt lati⁹ ibi inuenies.

Vnguẽtũ gũmi enhemi Cõ
ciliatoris dñia. 181. quo (vt aſſerit) cranei fractura ad interiora penetrãs citra oſis pforationẽ curat̃ tracta ab eo materia intus coaceruata ad exteriora.

R. Gũmi enhemi vnci. iij. refinẽ puriſſimẽ vnci. iij. cæz vnci. vj. olei roſati vnci. iij. ſemis. amoniaci. drag. ij. terbentine vnci. iij. drag. v. fiat vnguẽtũ. Vbi aduertito hoc vnguẽtũ apud barbaros corruptẽ dici gũmi elemi cũ rectius dixiſſet gũmi enhemi, quod eſt olea Aethiopica. j. gũmi oleaſtri, vt pater ex Plinij ſnia lib. 12. nat. hiſt. c. 18. Dioſc. c. 162. De olea.

Aliud ad idem nempe medi
camentum refinæ attractiuum quod vocant ad ſaniẽ & oſſicula cõmotã in fractura cranei extrorſus trahendã.

R. Refinẽ pini vnci. vj. cæz vnci. v. liqueſcant fimul & addatur pulueris propollis & radicis cannæ ana. drag. iij. & fiat emplaftrum quod manibus multũ ſubigatur.

Aliud ad idem.

R. Fermenti acris lib. ſemis piſteĩ opti mẽ, & eimifceat̃ pulueris. ppollis, & radicũ cãz acbdelij ana. drag. iij. hoc nẽpe medicamẽtũ opẽ fert ad attahendã ſaniẽ per rimulã caluarię ad exteriora, ad eleuãdũ os flexum citra fracturã in capitibus puerorum, atq; ad extrahendũ in fixa omnia atq; puſa cavitare thoracis.

Vinum auſterũ & confor tati
uũ quo tẽpore carnis producẽdẽ cõperto vulnere in pannis adaptamus.

F 4 R. nucum

lib. 1. c. 116. ex
Andree lacune
translatũ ex Vi-
gilio. v. Marcellis
lib. 6. c. 125.

273

R Nucū cupressi, foliorū lauri, & mir-
ti foliorū oliuæ, balauftiorū centau-
rea, rosarū, florū roris ~~maximi~~ maioran-
sthecadis cuiusq; .P. j. oibus cōquassatis
bulliāt in quatuor libris vini albi veteris,
vel rubri, scdm artē ad medietatis vsq; cō-
sumptionē, & vtēre in pānis in eo made-
factis & expsis, modo iā dicto, habita a-
nimaduersione iuxta doctrinā Gal. mul-
tis in locis methodi circa temperaturam
ac tempus & particularum diuersitatem.
In ficcis nanq; tēperaturis ficciora cōmi-
scēda sunt simplicia medicamēta, i humi-
dis vero parū sicca, veluti in primo gradu.
¶ **Medicamētum** ad discoscendum in magna
contusione capitis absque vulnere extērio-
ri, An caluarie os sit fractum vel non.

R Ceræ vnc. vj. Labdani vnc. j. & se-
mis. thuris puluerisati vnc. semis &
cū labdano & cæraliquefactis fiat mistiō
manibus subigando & capite prius abra-
so parti læsæ superimponito & sequenti
die ~~remittet~~ ref. Et experimēto cognitū est,
quod si fractura subest, pars cutis sibi cor-
respondētis, exsiccata euadit si autē fra-
ctura non sit, nullibi cutis exsiccabitur.

¶ **Decōtusiōe** cap. absq; vulnere cutis cū sāgui-
ne cōcreto ex traua aliaq; fractura cranei.

Inter initia sumito ouorum albumi-
na nu. iij, pulueris rosarū & gran. Myr-
ti. ana. drag. iij. olei ros. vnci. & semis agi-
tentur. Simul, & in stupis parti læsæ su-
perimponito.

¶ **Ad idem** procedente tempore.

R Vini rubri lib. ij. rosarū, camæmelli,
anisi, granorū myrti, & baccarū lau-
ri ana. P. semis: bulliāt scdm artē ad medie-
tatis vsq; cōsūptū, & collent: post addant
mellis cois vnci. iij. olei camæmelli & ro-
sarū ana vnci. & semis: panis furfuracei, fa-
rinæ fauorū, pulueris meliloti, camæmel-
li, & baccarū lauri, floris rosæ marini ana
P. semis arte & igne fiat emplastrū. Et in
separatione ab eo addant ouorū num. ij.
croci. scrup. semis salis modicū misce &
fiat emplastrū qd̄ tumorē cōtusionis per-

halitum digerit, vt sum expertus.

¶ **Aliud ad idem.**

R Coroneorū nu. iij. coquant in vino
rubro pri^o minutē cisis: & post inte-
grā decoct. pistent & addat vini p̄dictæ
decoctionis vnci. viij. mellis vnci. iij. thu-
ris masthiciis granorum myrti, maiora-
næ, sthecadis anisi puluerizatorū cuiusq;
P. semis. fiat emplastrū scdm artē. Fieri
etiā pōt ex ipso decocto. cithoneorū ex
collato, additis puluerib^o p̄dictis, atq;
melle. Oportet tñ prius torū caput foue-
ri molli spongia madesacta in dicto de-
cocto tepidq; atq; modico salis immixto.

¶ **Ad vñlura** lateralia capitis à telo incisuo
glutinanda: nec non ad omnia alia in qui-
bus aglutinatio potissimum expectatur.

R Aquę vitę lib. j. olei peryconis lib. ij.
bistortæ, radicū pēthaphilonis virē-
tiū ana. vnc. vj. thuris, mirrhę, aloes singu-
lorū vnc. j. & semis, in pollinē, quę redigē-
da sunt, redigant radicib^o nimium cōtulis,
& oleo, atq; aquę vitę rectē oib^o cōmi-
stis p vitreū sublimatoriū instillent. Qua
instillatiōe & seq. puluere innumeripenē
sunt curati. Method^o aut̄ curatoria est, vt
futura vulnere recēti, atq; inciso admota
(si ea op^o sit) vel ossiculis (si q̄ pri^o cōmo-
ta sunt) extractis, vuln^o liniēdū est, penna
i p̄dicta distillatiōe madesacta: deinde se-
quēti puluere sup̄ sparso: cuius hæc est cō-
positio. R. thuris masthiciis farchocole fan-
guinis draconis ex gutta tormētillę aloes
mirrhę singulorū vnci. j. ex oib^o puluerē
cōficito, postq̄ vuln^o p̄dicta instillatione
illitum sit, & desuper puluere admoto,
sicca linamenta admoveantur.

¶ **Emplastrum** in fine curationis vulnerum ca-
pitis, ad confortationem.

R Emplastri exicrocij & cetauræ aut
brithonicæ, quod sit satis. Quibus,
vel perse, vel mixtis vtendum est, addito
puluere granæ finissimæ & corali rubri
momēto. In magnis etenim fracturis of-
fium cap. tres quatuorve panes auri addā-
tur, & musci ambræ ana. g. iij.

Finit liber primus de vulneribus capitis.

ANDREAE ALCAZAR

ris Medici, ac Chirurgi.

Liber Secundus, De vulneribus nervorum, alijsque
ipforum affectibus.

CAPVT PRIMVM.

De nervorum definitione, seu descriptione.



VM CAPITIS. VVL nera omni ex parte haec-
nus tractauerim^o, insequi
accōmodē, nervorū vulne-
ra, & affectus pertractare,
cū ab ipso capite, nepe à cerebro, oēs sen-
sorij atque motiui nervi, mediātē vel im-
mediātē, originē suā trahāt: & prius q̃ vul-
nerum nervorum documenta aggredia-
mur, definitionē, seu descriptionē nervi,
deinde eius anatomē prāmittere, oportet.
Est igitur nervus, iuxta Guidonis tra-
ditionem, tract. i. cap. De nervorum ana-
tome, membrum homogeneous, ad tri-
buendum sensum, & motū musculis, ac
cāteris particulis sensitiuis, creatū. Quā
quidem definitio, aut descriptio, exacta
vī, constat em̃ genere, & dīa: Nā illud
homogeneū membrū, in definitione po-
situm, loco generis est, dicitur em̃ de om-
nibus alijs mēbris simplicib^o, quā specie
differūt, nepe, osse, cute, carne, pinguedi-
ne, & alijs: dīa loco, stant verba illa, ad
tribuendū sensum, & motum, nāque, alia
mēbra simplicia, nec movēt, nec sensum
prāstāt, verbū illud (sensitiuis) ossa, & car-
tilagines, quē sensu carēt, excludit, & quā
uis nervi quidē, à posteriori cerebri parte
propagati, motiui nuncupent^r: & alij q̃ ab
anteriori parte exoriunt^r, sensitiui, non tñ
intelligas, motiuos sensu, nec sensitiuos
motu carere, sed analogicē, ex prācipua
vnicuique vī indita, nūcupari, qd potissi-
mū, nimirū isti, sensum, illi vero, motum
p̃ferant, exēplo sunt, brachiorū motiui

vulnerati nervi, q̃ sēpē intensum dolorē,
& sēpē etiā cōuulsionē, prā nimio sensu,
afferunt, & sic ē contrario, oculorum, pal-
pebrarum, & linguā sensitiui nervi, mo-
tū etiā inferunt, vt docuit Auicē. Fen. i.
1. doct. 2. quo fit, vt eisdē nervis, sensus &
mot^o actū, vel aptitudine, inferat. Nec de
finitioni obstat, q̃ videat^r, dentibus inesse
sensum, cū doleant, dolorque euulso den-
te aliquo, sedetur, nam, non dens, sed ner-
uusculi quidā dētiū radicibus impacti
in causa sunt, qd si dolor mitescit, aut tol-
litur, puenit ex eo, q̃ humor, q̃ prius den-
te operiebatur, illo euulso, semoto impe-
dimēto exhalat. Suadet hoc, alia rōne,
qd si dentē aliquē raseris, nisi gingivas te-
tigeris, dolor non insurgit. Sed definitio
nē impugnare vī, quod nō soli nervo, sed
etiā musculo, ipsa cōueniat: nā musculus
(vt Gal. lib. de morib^o liquidis placet) est
electiui, aut volūtarij motus organū. Cui
difficultati, bisariā rñdeo. 1. definitionē,
nervi non diuisim, sed copulatiū prādi-
cari de suo definito, quasi nervus sit, non
sensus solius, sed motus simul organū: at
musculus, licet aliquantuli, voluntarij or-
ganum sit, non tñ simul sensus. Scdō, vt
quis muscul^o electiui, seu volūtarij mot^o
organū sit, hoc tñ nō ex se efficere, sed p̃
ipsum nervū, q̃ ipsius principiū est, quia
aialis motiua virtus, primū immediatū
quē nervis ipsis influit, & secūdariō mu-
sculis, qppe cū nervi copulatiores cum
sint, vt ipsis adiuti, motū perficiūt: sic mu-
sculi motus, earatione, nervorum virtū-

Obiectio.

Responsio.

Alia obie-
ctio.

Responsio.

Nervorum
definitio, aut
descriptio.

ti potissimum tribuendus est, siquidem, prædicta animalis virtus, propriè à cerebro (vt dictum est) influit, iuxta medicorum placita, atque Cauliaci tract. primo, capit. primo. vniuersali de Anatome, vbi ait, quod & si ethereogenea membra ex pluribus constent particulis, gratia nempe commodioris actionis, & passionis, solus tamè neruus totius actus principium est, hoc placuit Gale. primo & secundo. de vsu par. quod, ratione etiam conuincitur, nam etsi ad motum, præter neruum, quibusdā alijs opus sit, vt musculis, chordis, & alijs, ipse tamen neruus, animalem virtutem à cerebro manantem, primitus emittit, cæteræ partes, tanquam medium quoddam censendæ sunt.

CAP. II.

De neruorum origine an ex corde, an verò ex cerebro orientur.

Nerui secundam philosophos ex corde oriuntur & opinionis huius argumenta.



Quod neruorum ortum, dissi-
diū per maximum inter
Philosophos, ac medicos,
legimus, nanque Aristor.
animalium libris, & A-
uerro, colligit. 2. multique alij ex Philo-
sophis, ex corde neruos oriri, scriptum re-
liquere, fundamenta istorum illa sunt,
cor corporis totius motus & sensus prin-
cipium est, nō cerebrum, quod ex se, nec
sentit, nec verè mouetur, vt docet Philo-
sophus de partibus animalium scđo. est
enim velut coagulata pituita, ergo cor
neruorum erit origo, quod corporis instru-
menta omnia gubernat, ad hæc, quod
in humano corpore prius mouetur, & vl-
timo motum prorsus amittit, ipsum cor
est, tanquam corporeæ virtutis, & actio-
num omnium radix, iuxta philosophū

animal. 9. & Auic. 5. vnde consequens est,
vt à corde, non à cerebro orientur nerui,

quibus tantæ corporis partes mouent. Ve-
rum contrariā sententiā, apertè tenet Gal. 6.
& 7. de Hippocratis placitis, ac de vsu
par. 8. vbi in Aristot. vehemèter inuehit,
tum etiam de neruorum dissectione, quem
medici pene vniuersi sequuntur, qui ex ip-
sa anatome, demonstratione clarissima fa-
cta, docet, neruorum principium, & origi-
nem cerebrū esse, idq; certè in anatomi-
cis administrationibus mediocriter exer-
citatis incōperto est. Et experimēto per
sæpe videmus, cum vulnus aut percussio,
cerebro, vel eius membranis, vel spinali
medullæ infligit, neruos ipsos contrahi
versus eorum principium, nēpe cerebrum,
insigniterque lēdi, imò conuulsione inse-
qui vnde Gal. de loc. affect. 1. & 4. cap. 5.
affirmat, quendā ex dorso ictu, alium ve-
rò ex madefactæ vestis humore, circa cer-
uicem, sensificā digitorū facultatē amif-
fisse, applicatoq; duntaxat medicamine
ceruici, sanatos esse, Quod nos etiam ex
perientia docuit, & infestari neruos, alias
que partes, quibus nerui inseruiunt, ob ce-
rebri affectus, & è contrario, ex neruorum
vulnerib⁹, cerebrū lædi, quasi per quandā
cōpersionē, Hippocrates ipse de vulneri-
bus capitis, & Auic. 1. 3. tract. 3. c. de pla-
ga, & incisione capitis. & 4. 4. cap. vulne-
neruorum apertè docuerunt: & nos, latius
multo, supra libr. 1. disseruimus, vbi cum
Hippoc. supra citato loco & Auic. 4. 4. di-
cto capit. vulner. neruor. diximus, velu-
ti ex ramis, ad arboris radicē, ex affectis
neruis ad cerebrum nocumētū ascende-
re, quo fit, vt vigiliæ, delirium, sæpeq; in-
fania, atque conuulsio, ex neruorum per-
cussione, consequantur. Huius ratio ab
Auic. citato cap. vulner. neruo. redditur,
vbi inquit, neruis ppter vehementiā sen-
sus eorū, & continuitatē suā cū cerebro,
accidit ex vulneribus, dolores vehemen-
tes, &

Secunda me-
dicorum o-
pinio affir-
mantū ner-
uos non à
corde sed à
cerebro or-
tum habere
& eorū fun-
damenta.

Percussio
cerebro, aut
eius membra-
nis vel spina-
li medul-
la nerui ver-
sus cerebrū
contrahuntur
ac insi-
gniter læ-
duntur.

Ex neruorum
vulnerib⁹ ce-
rebri offen-
ditur.

Ex neruorum
percussione
delirium, in-
fania atque
conuulsio ob-
oriuntur.

De Vulneribus neruorū.

91

Casus no-
randi.

res, & laciones valde magnæ, sicut spasmus, & permissio rationis. Quod & ipse periculo sapè intellexi, quia in ciuitate Abulensi ex paruo vulnere in supercilio, Iuuenem quàm ocysimè caligine obductum, laterisque vulnere oppositi paralyti, aut resolutione affectum, Segobiaz quoq; (vbi tunc degebam) vidi punctura in pedis neruo facta vulnuscūq; quod vix cerni poterat, puerum conuulsione correptum, perijisse, hisce oculis conspexi noxa nimirum ex neruosis ramis; ad cerebrum eorum radicem tracta. Ego vero in hoc opinionum consili-

Antoris opi-
nio quod ad
neruorū ori-
ginem.

Alia est ner-
uorum ori-
go occulta,
ac in percep-
tibilis ex
corde, alia
manifesta
ex cerebro.

ctu, quid sentiam, hic scribere destinaui, & arbitror quidem, rem attentius considerans, tam varias sententias posse conciliari, vt & Philosophorum & medicorum placita, in idem, varia tamen ratione recidant. Nam philosophica propositio ex corde neruos suboriri contendens, de latenti, ac pene inperceptibili origine intelligenda est, nanque neruusculus quidam tenerrimus, tenuissimus, occultè immediatè, ex corde ad cerebrum vsque conscendit, quo duce, tum sensoria, tum motiua virtus ab ipso corde ad cerebrum defertur, à quo nimirum neruulo, ipsi cerebri substantiæ colligato, nerui omnes vigorem contrahentes, potentia adauctum penes sensoriam, ac motiuam functionem, redacta, in humanum corpus propagantur; quod ex ipso Galeno de vsu partium. 12. capite vnde- cimo. colligi potest, vbi cerebrum veluti fontem esse, & spinalem medullam fluitum, ex illo tanquam fonte manantem, atque inde neruos, veluti riuulos, deriuari, ac deduci, probat, nec hoc sine magno consilio, à natura parente, factum censendum est, ne enim tanta neruorum compaginis mole, tantoque artificio, cor grauaretur, eam curam cerebro iniunxit, iuxta Auicennæ placita. s. de ani-

Cerebrum
fons spina-
lis medulla
fluitus ex il-
lo manans,
nerui riuuli
inde deriuati
Gal. di-
cuntur.

Cere tota ner-
uorū compa-
go in media
re à corde
nō pcedat.

malibus, quia contra philosophicas traditiones esset, in membro quod virtutis alicuius principium est, ipsius functiones, vehemētius operari, cum oporteat, suis instrumentis exerceari. At medicorū sententia, quæ neruorum ortum cerebro tribuit, de origine manifesta, atque conspicua, vsurpari debet, constat enim ex anatomicis administrationibus manifestè, neruos omnes ex cerebro deriuari, quod etiam ipsa experientia (vt exemplis pluribus supra ostensum est, luce clari- us demonstrat. Igitur vt summam dicam, nerui immediatè subtili illa, ac inperceptibili propagatione à corde, medi- atè verò, manifesto, ac sensibili ortu, à cerebro proficiunt, & sic nerui eandem cum cerebro habere substantiam constat sed compactiorem, ne à quolibet pateretur, vt Galenus de Hippoc. & Platonis decretis innuit.

C A P. III.

Vtrum sensus & motus per
vnum neruum, an per di-
uersos ferantur.



PERANTVR. Circa sensus, & motus delationem, non vulgaris dubitatio sese offert, per vnum ne, an per plures neruos fiat, quàm Guido noster, in capite de neruorum anatome. tractatu primo. obiter duntaxat, perstrinxit, & quod per plures, sunt argumenta. Primum, quod sensoria virtus, ex passionis genere censetur, motiua vero actionis, nanque sentire quoddam pati, mouere quoddam agere est, de lo. aff. primo. Galeno asseuerante, cum igitur, tam late huiusmodi virtutes

Quod p v-
num neruū
sensus, & mo-
tus non de-
ferantur ar-
gumenta.

virtutes dissideant, non vno, sed varijs instrumentis regi, necesse est, consequenterque, non per vnum sed per plures nervos deduci. Ad hæc Galenus de morbo, & Symptomate. 4. affeuerat, interdum per vnum, interdum per varios, sensum, & motum deferri nervos, igitur non semper per vnum.

Per vnum nervum sensus & motus deferantur, & tandem cetera.

In contrariam tamen sententiam medici penè vniuersi erunt, cum Galeno libr. 1. de symptomatum causis, quæ vel ipsa definitione nervi convinci videtur, dum inquit, nervum, membrum homogeneum esse, adtribuendum musculis, & reliquis sensitiuis partibus, sensum & motum esse, vbi simul ac copulatum, nervus sensui & motui deferendo instrumentum aptum dicitur. Ergo pluribus nervis ad hoc opus non est. Insuper vitalis spiritus à vitali sanguine, substantia longè dissidet, ac perinde naturalis spiritus, à sanguine nutritivo, & tamen per eandem arteriam, vitalis spiritus, cum ipso sanguine, perque eandem venam, spiritus naturalis, ac nutritivus sanguis simul deferuntur, ergo per eundem nervum, motiva & sensitiva virtus, rursus vnum & idem numero, circa duo etiam diuersa, vim habet: veluti lingua, circa gustum atque sermonem, ergo sic nervus circa sensum, & motum, & ad contra-

Responsum ad argumenta.

ria argumenta. Respondeo, ad primum, ut quavis sensus & motus dissimiles sint, specialiter, conveniunt tamen in communi, ita ut anima, cum nativo calore de lato: in eorum organum possit diuersum effectum imprimere. Ad Galeni verò auctoritatem, motum, & sensum interdum per vnum, interdum per diuersos nervos humano corpori deferri affeuerantis, dicendum, velle Galenū, ut nervus qui in prima origine vnus erat, sensum & motum simul deferens, postea in diuersos ramos, eundem sensum, & motum simul deferentes, dispergatur, non ut intentum

Galenī sit, affirmare, per vnum nervum sensum, per alium vero separatim motum importari, nam vnum nervum in plures diuidi, sicut vnā venā in diuersas, docet Galenus. 1. de lo. aff. l. 2. respōdeo, ex mente Galeni esse discrimen constitutere, inter corporis humani membra, sic, ut quibusdam, nempe his, quæ actu, & potentia sensu, & motu indigent, per vnum nervum, sensus, & motus deferantur, alijs verò, nempe motiuis, quibus nervi adeo profundè delitescunt, ut sensibile obiectum, ad ea deferri, aut penetrare nequeat duntaxat motus per vnum nervum importetur, sensus verò tantum in potentia maneat, sic locū obtinet, quod inquit, interdum per vnum, interdum per diuersos, nam si separatim, per diuersos nervos, sensum, & motum, deduci vellet Galenus, sibi quidem esset contrarius libr. 1. de symptom. cau. ca. 5. dum inquit, quod si spinalis medulla (à qua nervi motui propagantur) fuerit læsa, si læsio magna est, insensibiles, immobilesque, quæ infra sunt partes, statim fiunt, si parua verò, torpent, rursus eodem libr. & capite paulo antè, ait, quando autem partes per nervum voluntariè mouentur, eadem protinus sensum quoque per eundem possident.

C A P. II II.

An sensus & motus substantialiter, an verò radicaliter deferantur.



Difficilis est proposita questio, & quæ Guidonem nostrum, vique adeo accipitem reddiderit, ut in fine sui textus, citra ullam aliam resolutionem, in hæc verba eruperit, me-

Galenī locū bisariam interpretatus.

De Vulneribus neruorū.

93

rit, melius est obdormire, id est, huius
Guidonis se-
ries bifaria
explicatur. quæstionis diuisionem silentio præter-
mittere, in cuius interpretatione, ipsius
Cauliaci series, ipsaque addubitatio, bi-
fariam intelligi potest. Primò, vt sit du-
bium, vtrum nerui, ex cerebro, aut cor-
de (modo de quo superius) substantialiter,
id est, iuxta substantialem formam,
qua motum & sensum inferunt, deriuen-
tur: an vero radicaliter, hoc est secun-
dum radicalem corpoream materiam.
Secundò, vt aduerbium substantialiter,
Guidonis se-
ries restitui-
tur. Guidonis serie, stet pro corporea mate-
ria, aut substantia largius sumpta, & ad-
uerbium illud radicaliter, pro radiali-
ter, hoc est radianter, typographi virio
legatur, quasi addubiter Guido, an per
neruos, ex cerebro, aut corde, ad vniuer-
sas corporis partes, sensus, & motus, sub-
stantialiter, vel corporaliter deducan-
tur, an radialiter, seu irradianter: ita, vt
quemadmodum, à solaribus radijs vitro
perculso, illico splendor transmittitur,
ita sensoria & motiua virtus, per neruos,
radialiter quasi illuminando, ad reliqua
corporis membra, influant, atque irra-
dient, qua vltima interpretatione ad-
missa, vtraque quidem assertio probabi-
lis videtur, nam ex neothericis non de-
sunt, qui contendant, animales spiritus, ir-
radianter, non vero substantialiter, hoc
est secundum corpoream materiam, per
neruos, tanquam instrumenta, ad mem-
bra permeare, argumento sumpto ex
Galeno de neruorum dissectione asse-
uerante, præter opticos oculorum ner-
uos, nullum alium conspicuas habere ca-
uitates, inferentes inde, supradictos spi-
ritus non substantialiter, sed irradianter,
per neruos deduciposse, vt per vitrum,
aerem, vel aquam, solis radij transmittun-
tur, iuxta Galenum primo. de sympto-
matum causis capit. quinto. sed contra-
rium, nempe animales spiritus, substan-

tialiter (vt cum Guidone loquar) vel ma-
terialiter largius materia sumpta, per ner-
uos deferri, vel illud argumentum con-
uincit, quod si intentis viribus membrū
aliquod fune constrinxeris, sensui, & mo-
tui occludes viam, nō alia ratione, quā
quod ipsi spiritus omnes vitales natura-
les, atque animales transmitti ad mem-
bra nequeunt, nam si irradiare spiritus
possent, compressio impedimento mi-
nimè esset, & ad Galeni textum respon-
detur, de insigni atque clara cauitate in-
tellexisse, quæ exceptis opticis, alijs in
neruis non conspicitur, sed imperceptibile
cauitatem reliquis esse non negat Gale.

CAP. V.

De Neruorum breui anatome, vbi Guidonis subofcu-
rus textus interpre-
tatur.



N VNC de neruorum ana-
tome paucis agamus, &
præmitto, terminum ner-
uus, quo microcosmi mē-
bra omnia motiuas, ac sen-
forias functiones recipiunt, iuxta autho-
rum traditiones, trifariam usurpari, pri-
mò, atque proprius, pro substantia subal-
bida flexibili, sed dura, & separatu diffi-
cili, quadamque tenuis rotunda, quæ se-
cundum medicos, sensus & motus pro-
priè organum siue instrumentum est, cu-
ius origo, immediatè cerebrum, media-
tè verò spinalis est medulla. Secūdo pro
duriori substantia, subalbida, quæ ex of-
sibus nascitur, ea inter se se connectens.
Vnde syndesmus, hoc est ligamentum,
dicta est, hæc duplex existit, altera inte-
rius ossa copulans, sensus expers, eaque
ratione, valentissima tolerans præsidia,
vt docet

Terminus
neruus tri-
fariam usa-
tur.

Syndesmus
qui interius
ossa conne-
dit sensus ex-
pers est, ob
idq; valen-
tissima tole-
rat præsidia,
vt docet

Aliud est ligamentū ex terius cū osse musculū colligās sensu predictum cuius fibræ vix percipiuntur.

Ligamentū quod exterius musculū, cū osse connecit transuersim incisum, tutū cōsui, sed si vuln articulo proximū sit latius est incisū relinque, & ratio.

Nervi proprii accepti sensorios & motuos diuiduntur quimmediatē ex cerebro, mediatē ex spinali medulla medullæ præcedunt.

Prima sensiuorum coniugatio.

vt docet Galenus sexto. Method. capite quarto. & de lo. aff. primo. in hæc verba, cor non sustinet abscissum, quemadmodum neque pulmo, neque sindefmi do-
lorem, altera musculum exterius cū osse colligans, ea videlicet parte, qua musculus ossi mediatē inherescit. Atque huiusmodi quidem ligamento sensus inest, latius ac planius nervo est, eiusque fibræ tã connexæ, vt non percipiuntur, iuxta Aui-
cennam. Fen. 4. 4. tract. 4. ca. 1. vbi etiam tradit, ligamentum hoc, transuersim incisum, tutū à chirurgo consui, quãuis interdum, quando nimirum vulnus articulo valde proximum est, insutum relinquere (meo iudicio) conueniat, cum sindefmus ille prope articulū oriatur, nec à cerebro procedat, quo fit, vt nec versus cerebrum contrahatur, nec perinde, in mēbro sensus, & motus tãta fiat iactura non tanto poro, seu callo, futura inter sindefmi incisæ partes omissa, procreato, quod in nervo inciso, nec consuto, longē aliter contraria ratione, cōtingeret. Tertiò largius pro chorda, seu tendone, à musculo orto ex nervo, atque ligamento composito, cui solidior, duriorque ipso nervo, substantia est, vsurpatur, quo præmissio, nervos omnes priore modo acceptos, in sensorios, atque motiuos diuido, ex cerebro inquam immediatē, ex ipsius spinali medulla mediatē ortos, illincque in vniuersum corpus propagatos, ex parte ergo cerebri anteriori, ac molliori, Primò, septem sensiuorum nervorū paria, immediatē ex cerebro, iuxta mammillares (quas vocant) carunculas, olfactoriæ virtutis sedem, exorta, interdum in ramos sparsa, membra præsertim sensoria ingrediuntur, ex his, duo primi nervi optici inscribuntur, visui inferuientes, quibus opti-
corum nomen quod visoriam functionē obeant inditum est: ij crassitudine, molli-
summa substantia, atque cavitare, reli-

quos sensorios nervos antecellunt, eorumque radicibus oculi hærent, nec illis, vt alijs, in ramos dispergi contingit, & hæc est sensiuorum prima coniugatio.

Secunda vero, durior ac multo tenuior in musculos, qui oculos mouent, distribuitur hæc ex calua foras exit, dumque per illam procedit, consociā reperit. Tertiam nervorum coniugationem, qui quidem ortus initio multi sunt, sed vsque adeo omnibus molliores, vt nisi attētius intuearis, vnum iudices: capillorum enim formam referunt: horum, quidam temporales musculos frontem, supercilia, atque labra intrant, quidam, inferioris mandibulæ articulationi, atque epulis tum gustandis, tum mandendis inferuiunt, quidam vero in gingiuas, & dentes porriguntur. Quarta verò nervorum

Secunda sensiuorum coniugatio.

Tertia coniugatio.

Quarta coniugatio.

Quinta coniugatio.

Sexta coniugatio.

coniuugatio, paulò durior, cum tertia quā primū nascitur, commixta, durio rem membranā, atque caluariæ os percurrens ad palatū defertur, per eamque sensoria, atque partim gustatoria functiones, importantur. Ex quinta, duo auditorij nerui à cerebri lateribus nascuntur, quorum alter, ad auditorium meatum, cerebri membrana interius dilatata fertur, alter, in alterum foramen ossis petrosi procedit, ab insigni eius duricie, lithoides, id est petrosū, vel anfractuosum, à græcis dictum. Sexta, ab extremitate futuræ. λ. Græcè literæ, formam referentis, atque posteriori cerebri parte oboritur, quæ in nervos quosdam diuiditur, ex quibus alij, gulæ, musculis, ac linguæ radices: alij scapularum musculis, atque illis subditis membris, inferuntur: alij, carotidibus arterijs connectuntur: quibus læsis, aut laqueo interceptis, mutum animal redditur, ob idque reuerſui, seu vocis nervi nuncupati sunt: alij denique, ad pulmonem, & cor decurrunt. Septima, atque

Septima coniugatio.

ultima sensiuorum nervorū coniugatio, in-

Nervi q̄ ad
capitis infe-
riora ferunt
cū neruis q̄
a. 3. 5. & 6.
coniung. pro-
ficiunt com-
mifcent.

Supradictæ
oēs neruorū
coniugatiōes
in corpis dif-
fectiōe con-
fpecti nō p̄t
nifi forſā in
cadauereſſu
minis curſu
diſſoluti vel
ad ſolem a-
reſacti.

Motiuorum
neruorū or-
tus.
Ex authoris
ſententia ſpinalis
medulla a
medio cere-
bri ventricu-
lo originem
trahit, quōis
multi ex me-
dicis a po-
ſteriori cere-
bri pte exo-
riri exiſti-
ment.

Spinalis me-
dulla ipſi ce-
rebro ſubſi-
ſtitia & colore
adſimilis eſt
q̄ p̄ tenui fi-
bra diuidit,
& membrana
neruea, ob-
voluitur,
quas ob cau-
ſas.

Spinalis me-
dulla pro-
ceſſus.

Cur dorſi
tot ſint ſpon-
dili, nec vni-
cum os.

tio, inter cerebrum, & nucham exoritur, partimque in linguæ musculos, partim in communes laryngum cartilagineſ, atque inferiorum laterū oſis. A. ſpeciem præferentis, musculos protenditur, illud tamen animaduerti à te volo, commiſce-ri quidem neruos, qui ad inferiora capi- tis feruntur, cum ijs qui à tertia, quinta, atque ſexta coniugatione proficiſcuntur, quæ omnia petita ſunt à Galeno de ner- uorum diſſectione, ac de anatomicis ad- ministrationibus, libris, eas tamen om- nes neruorū propagines, in humani cor- poris diſſectione prorsus videri, niſi forſan (vt Mundinus rectè aduertit) à rapidi ſuiui aſſiduo curſu, diſſoluti, vel ad ſolis ardorem temporis tractu, arefacti, eſt im- poſſibile. Poſt ſenſitiuos neruos, reſtat motiuorum anatomes. Oriuntur ergo motui nerui mediatè, ex ſpinali medul- la, quæ à poſteriori cerebri parte imme- diate (iuxta medicorum multorum placi- ta) originem ſuam ducit. Ego tamen ab ipſa anatome doctus, non à poſteriori, ſed à medio cerebri ventriculo, exori- ri, affirmare intrepidè auſim. Et errare medicos fortaiſſe fecit, quòd ſpinalē me- dullam poſtერიorem cerebri partē am- bire vident, quæ ratio, friuola eſt, vt cla- riùs, quàm alia probatione egeat, appa- ret, eſt hæc, ſubſtantia, atque colore ipſi cerebro ad ſimilis, pertenui fibra, ſecun- dum longitudinem diuiſa. Quo fit, vt al- tera eius parte reſolutione affecta, altera illæſa maneat. Inuoluit eam, membrana quadam neruea; ipſa natura, tum vt mo- tiua, atque ſenſoria virtus, toto humano corpori mediantibus ab ea, ppagatis ner- uis, importarentur, tum etiam, ne verte- brarum duricie offendi poſſet. Ducitur hæc, per triginta veros dorſi ſpōdilos, ad latera perforatos, fortibus ad ligatos liga- mentis, decurritque in eam vſque par- tem, quo ſacrum os terminatur. Que tan-

torum oſſium compago, non ſine ma- gno conſilio, à natura comparata fuit, nam ſi vnicum totius ſpinalis medullæ, oſ fuiſſet, velut veru quodam confixus, immobilisq; ijs partibus homo ſtaret, aliaq; naſcerentur incommoda, quæ Ga- lenus de vſu part. libr. 12. capite. 11. ele- ganter enarrat. Ex huius igitur ſpinalis medullæ perforatis ad latera, vertebraſ, triginta neruorum paria, aliſq; ſine co- mite neruus, ex oſſis ſacris anteriori par- te, cui vnicum tantum eſt foramen, or- tus, per vtrunque partem, nempe dex- tram, & ſiniſtram, in ceruicis ſcapulas, brachia, crura, ac denique reliquas huma- ni corporis partes, deriuantur, motum poſſiſſimum deferentes, ſed ſenſitiuis ner- uis commiſcentur, ſenſum etiam impor- tantes, nanque ſunt ipſi nerui velut riui ex ſpinali medulla. velut flumine, ipſa ve- rò, ex cerebro tanquam ex fonte manan- tes, vt Galenus rectè de vſu partiū. 12. ca- pite. 11. optimè imaginatur, ſed omiſſa in alias partes neruorum delatione, de il- la ſolum quæ ad chirurgum pertinet, aga- mus, quia neruorum anatomē, exactius, ac diſſuſius multò, Galen. Auicenna, Gui- do, Zerbus, Mundinus, Carpus. atque no- uiſſimè Vveſalius, pertractauerunt, ergo percolliſpondilorum lateralia foramina ad ſingula brachia, quatuor inſignes mit- tuntur nerui, Sylueſtri, domeſtica. Supe- riori atque inferiori brachiorum parti- bus inferri quò ſecūdam variam motus, exigentiam in omnes partes inſlectan- tur; quale, indigitis, apertius videre eſt, iuxta Galeni ſententiam, libr. primo. de vſu parti. capi. 18. ij. nerui, vel ſoli, vel mu- ſculis, chordis ac tendonibus, ſeu ligamē- tis commiſti, atque in musculos transfor- mari, pectori collo, atque ſcapularum ar- ticulo inferuntur, cum inſtar dilatati ten- donis, circuentes, inde adiutorij oſſi im- plantati; ipſum mouent; & poſtquam

Nerui velut
riui ex flu-
mine ex ſpi-
nalli medul-
la procedūt
ipſa vero ex
cerebro ve-
luti ex ſore.

Authores, q
neruorum a-
natomē ſcri-
pſerunt.

Motiuorum
neruorū pro-
ceſſus.

ab hu-

ab humeri articulatione secesserunt, ad digitorum trium spatium, inferius, quasi rotunda chorda sunt, vbi carni, atque ligamento, quod à scapulæ ossis capite procedit, commiscuntur, ac supra adiutorij os, musculi redduntur, ex quibus iterum chorda procedit, quæ ad tres digitos, prope articulum, amplificata, illum circumdat, brachiumque paruum (quod vocant) mouet, hac etiam ratione, manus digiti, ac aliorum membrorum articulis connectuntur, atque mouentur, tam interius, ut flectantur, quam ut extendantur exterius: idemque accidit neruorum propagatio- ni, quibus per lateralia spondilorum foramina, crura mouentur, nisi quod isti nerui, per varias semitas tendunt, alij enim sub carne delitescunt, alij apparent, alij musculis operiti submerguntur, cuius tam varij incesus rationem docet Auicenna. Fen. 1. 1. dict. 5. capite de Anatome neruorum nuchæ, alchatin, ex quo illud etiam colligo, sensoria motiua atque me-

Sensoria at-
que motiua
membranæ
uosas chor-
das velut
marsupium
quoddam co-
tinens.

Addubita-
tio ex Gui-
donis textu.

tractatu

bra, quæ flexionis, atque extensionis mu-
nus obeunt (prout supradictum est) ner-
uosas chordas, quibus vicissim ipsa mem-
bra introrsum, atque extrorsum flectun-
tur, atque extenduntur, velut marsupium
quoddam continere, his tamen, illa ad
dubitatio recte connectitur, quæ ex Gui-
donis serie. ~~textu~~ 1. capite de neruorum A-
natome, colligitur, dum inquit. Situatur
ergo, nerui in circuitu membri, ita ut in-
trinfeci membrum trahant, extrinfeci ve-
rò ipsum extendunt, est tamen, quod quã-
do vnus trahitur, alter relaxatur, itaque per
incisionem extrinfeci, perditur flexio;
per intrinfecam extensionem, quod ex men-
te Galeni de vlt. part. lib. primo. capi. 17.
excerptum videtur, in hæc verba, flecti-
tur quidem vnusquisque ipsorum articu-
lus, à suis tendonum implantationibus, ex-
tenditur ab externis capitendo quibus,
nã videtur, non vt Guido ceter, ex extrinse-

ca neruorum incisione flexionem, & ex
intrinseca extensionem amitti, sed potius
è contrario, extrinsecam in causa esse, vt
extensione membrum careat, intrinsecam
verò, flexione. Sed pro responsione præ-
mitto, neruos quidem, seu tendones, iuxta
Galenî doctrinam vbi supra, vt motum
exerceant mutuo se se iuuare, dum enim
intrinfeci flectuntur, extrinfeci eis cedunt
& ex diametro, nam si simul ad se vtrique
traherent, frustra eam pugnam iniri, si-
neque victoria incomperto est, cum man-
us tunc nullibi infixæ recta staret. Ad
obiectionem ergo respondeo, quod cum
incisis neruis, sarcoides porus, seu callus,
inter medius necessario procreetur, quo
mediante, huiusmodi vulnera consolidan-
tur, cessat mutua illa neruorum coadiu-
uatio, nec sibi opitulari possunt, quo fit,
vt incisis externis neruis, flexionis iactu-
ra fiat, callo illo sua duricie impediante,
incisis verò internis, extensionis.

Nerui intrin-
feci, atque ex-
trinfeci, vt
motum ex-
erceant, ma-
tuo se iuuat
& quarone.

Responso ad
dubium Gui-
donis.

CAP. VI.

De neruorum, Chordarum,
& tendonum tempe-
ratura.



Neruorum, & Chordarum,
atque tendonum, tempe-
raturam pericrurari, non
inutile videtur: est ergo fri-
gida, ac sicca, vt Galen. de-
cimo. De tempera. atque Auicennæ pri-
ma primi capite. de complexionemem-
brorum placuit, namque ex elementorum
commistione, ac generationis primor-
dio, huiusmodi qualitas magis quam a-
lia comparata illis est, idque Auerroes
colligit secundo. capi. 2. non ineleganti
ratione probat: quod nimirum huiusmo-
di neruosa membra calor coxerit, ac fri-

Temperatu-
ra neruorum,
chordarum,
atque tendo-
num frigida
& sicca est,
abidque calo-
re & humi-
ditate nimia
offenduntur
quare. pal-
tea & id ge-
nus medica-
mina vehem-
enter no-
cent.

gus

De Vulneribus neruorum.

97

gus congelauerit, ob idq; calore & humiditate nimia offenduntur; quare, pultes, & id genus medicamina, longe nocentia ab auctoribus iudicantur: unt tamen, qui à posteriori cerebri parte, & spinali medulla propagatur, sicciiores ijs, qui ab anteriori nascuntur, vt docet Auic. Fen.

1. 1. doctri. 3. ca. 1. de complexione membrorum, & ratione fulcitur, cum illi, per spinalem medullam, perq; fortissima atque sicciissima vertebrarum ossa percurrant, ex quibus siccitatem illam contrahunt. Adde, assiduo etiam motu sicciore nancisci temperaturam. Sed offerunt se hic dubitationes quædam, quæ prædictis aduersari videntur. anxiosq; chirurgos reddere solent. Prima quod Auic. 4.

Dubitatio.

4. tract. 4. capite. 3. de cura vulnerum neruorum, ex quadam humida à frigore concreta materia, constare neruos dixit, ex eoq; mollificantia medicamenta, eis nocumento esse, pro vt Galenus etiam. 6. method. capi. 2. & 3. de comp. med. per genera affirmat, si humidę temperaturæ nerui sunt, non igitur sicca. 2. quod frigidum, nullo pacto naturæ opus, & informatiue virtutis, subintrat, iuxta Galeni sententiam. 6. de symptom. causis. capite finali, ergo nerui frigidi esse non videntur, falsoq; Auicenn. prædicto loco à frigido conflari docet. 3. si frigidi nerui sunt, quorsum philosophus. 2. de generatione animalium cap. 4. ab intenso calore, neruos fieri tradidit. Sed ad huiusmodi dubitationē rñdeo, ad primū, non intellexisse

Secunda dubitatio.

Auicennam in connumeratione membrorum neruos, natura esse humidos, cū carnis respectu, sicci ab auctoribus omnibus censeantur, quin potius, materialē ipsam causam, ex qua nerui procreantur, attendit, quæ in generationis primordio, humida recta ratione dici potest, cum omnia feminalia membra ad sui generationem humidam quandam necessario sup

Tertia dubitatio.

Responsum ad primum argumentum.

ponant materiā, quale est semen, aut mēstruus purus sanguis, qui secundum humani corporis particularum exigentiam à nativo calore, & informatiue virtutis functione densatur, deindeque prædicta membrorum materies indurat, reddunturq; membra ipsa, alia sicca vt nerui, alia sicciore, vt ossa, quanuis (vt diximus) à fluida, atque humida materia progenita sint, sicq; non obstat. 1. Auicenn. obiectio. ad. 2. respondebis, intense quidem frigidum non ingredi naturæ opus, remissius tamen ingredi posse, vnde de remissione frigido, quod largius quodammodo, calidum dici potest, intelligendus Auicenna est. Ad. 3. obiectionem respondere poteris, vt quanuis à calore interiore conficiantur nerui, siccescente tamen humore, exhalatoq; calore, vt in testa, in fornace videre est, frigidi ac sicci supersunt.

ponant materiā, quale est semen, aut mēstruus purus sanguis, qui secundum humani corporis particularum exigentiam à nativo calore, & informatiue virtutis functione densatur, deindeque prædicta membrorum materies indurat, reddunturq; membra ipsa, alia sicca vt nerui, alia sicciore, vt ossa, quanuis (vt diximus) à fluida, atque humida materia progenita sint, sicq; non obstat. 1. Auicenn. obiectio. ad. 2. respondebis, intense quidem frigidum non ingredi naturæ opus, remissius tamen ingredi posse, vnde de remissione frigido, quod largius quodammodo, calidum dici potest, intelligendus Auicenna est. Ad. 3. obiectionem respondere poteris, vt quanuis à calore interiore conficiantur nerui, siccescente tamen humore, exhalatoq; calore, vt in testa, in fornace videre est, frigidi ac sicci supersunt.

Responsum ad Secundam dubitationem.

Ad tertiam obiectionem responsum.

CAP. VII.

De causis vulnerum neruorum.



N vulnerum neruorum causis immorandum non est, sunt, quæ aliorum vulnerum, nepe omnia, quæ

scindere, perforare, rumpe re contundere, quocunquevè modo continuum soluere apta sunt.

CAP. VIII.

De vulnerum neruorum signis.



Vulneratos esse neruos, oculis aliquando conspici solet, sin minus, dolor ingens locus neruosus, vulnerati membri motus, & sensus amissio, vel hebetatio indicant.

G CAP.

CAP. IX.

De iudicijs, aut præfagijs neruorum, chordarum, ac tendinum vulnere, siue punctum, siue cæsim contingant.



VL. NERA quidem neruorum, chordarum, ac tendinum, maxime punctum illata, periculosa valde, ac æpius (potissimū ad tres digitos, prope iuncturam) lethalia sunt, ob neruosas chordas quæ ibi carnis expertes sunt, nullo impediēte, & quòdquam primum vulnerantur externo aeri expōnuntur, nam frigus quidem neruis inimi cum est, iuxta Hippocratem Aphorism. 5. aph. 28. qui in hunc seribit modum frigidum inimicum ossibus dētibz, neruis, & deinde frigidum autem conuulsiones, distentiones, &c. Vnde nerui præcipue ex ratione, insignis sensus, continuationisq; cum cerebro, dolore, fluxione, inflammatione, delirio, syncopa, vigilijs, conuulsione, atq; interdum resolutione infestari solent: vt Galenus. 3. artis medicæ & 6. meth. cap. 3. Paul. lib. 4. cap. 54. & Razes. 2. continen. cap. 13. nos docuerūt, atq; ipsa experientia. Sæpe enim ex paruo neruorum punctum illato vulnere, prædictis symptomatis obortis, & pure retento, plurimos è vita quàm ocyssimè discessisse vidimus. Cōtra alios, quos humi modi symptomata non inuaserunt, sanie intravulnus minimè latente, sanatos: alia multa sunt vel salutis vel mortis causa, aut occasio, nempe ægrotantis temperatura, varius humor, ætas, ars, tēpus, cœlestis influxus, atque etiam regio, vnde Auerrois collig. 1. inquit, ægritudines quæ in terris Hipp. simpliciter acutæ exi-

stunt, in nostris peracutæ sunt, nec minus operatur, sex rerum non naturalium, vel usus, vel abusus, his concinit Auenzoar. tract. 2. lib. primi thesiri, dū ait, & custos curæ (id est medicus) considerare debet, dispositionem infirmi, tempus, & habitum dinem ipsius, & eius naturam, temperaturamq; in quo sequutus est Hippocratem aphor. 2. aph. 34. quæ vt varia, ita variam medendi methodū exposcunt, ad hæc, illud scire oportet, si bilis flaua vel sanguis exuberauerit, fauiores ægrotantem cōcitare symptomata, si pituita, si bilis atra nō adusta, remissiora, insuper, pus album, lenē, æquale, non graue olens, non immo-dicum, optimum præfagium est, namq; dolorem, tetanos, atq; rigores sedare solet, vt Hippocrates in prognosticis. cap. 46. & ibi Galenus in commentario docuerunt, & idem Galenus in commentario aphor. 22. contra, vbi vlcus recrudescit, vulnusq; tumor occupat, maxime doloribus, & alijs symptomatis, ægrum infestantibus, quare Hipp. aphor. 5. 67. molles tumores inquit boni, crudi vero mali, nam vt Galenus in commentario probat, fieri nequit, vt tumor sit renitens, si natura humores ad membrum confluentes bene concoquat, pus tamen in vulnere nō semper approbandū est, sed ita demū si symptomata ægrotantem torserint, quæ puris fluxu mitescunt, cum tūc temporis ad hæc temperada, totam curandirationem cōuertamus, si vero illa ab fuerint, quia tunc de vulneris agglutinatione (vt vulnus est) duntaxat agendum est, profluens sanies incommoda erit, quippe cum agglutinationem quæ vnione, atq; exsiccatione comparatur, impediatur. Sed inter neruorum symptomata, nullū quidem perniciosius conuulsione, quæ nerui sæpe corripiunt, vnde Hippocrates apho. 5. apho. 2. conuulsio, inquit, ex vulnere lethalis, & Galenus in cōmentario

Vbi bilis flaua exuberat fauiores sub oritur symptomata, vbi pituita vel bilis atra nō adusta remissiora.

Pus album, lenē æquale non graue olens nō immodicum optimum præfagium, nā symptomata sedare solet.

Vbi vlcus recrudescit, & vulnus tumor occupat præcipue cum alijs symptomatibus malum.

Vbi natura humores ad membrum confluentes, bene concoquitur impossibile est vt tumor sit renitens.

Pus in neruorum vulneribus non semper probandum, sed ita demū si infestet symptomata, nā absunt, agglutinatione, quæ tūc procuranda est impedit.

Inter neruorum symptomata nullū perniciosius conuulsione.

Conuulsio ex vulnere quo pacto intelligatur

Vulnera neruorum, chordarum, ac tendinum, punctum illata, & ad tres digitos, prope iuncturam, lethalia sunt, ob neruosas chordas quæ ibi carnis expertes sunt, nullo impediēte, & quòdquam primum vulnerantur externo aeri expōnuntur, nam frigus quidem neruis inimi cum est, iuxta Hippocratem Aphorism. 5. aph. 28. qui in hunc seribit modum frigidum inimicum ossibus dētibz, neruis, & deinde frigidum autem conuulsiones, distentiones, &c. Vnde nerui præcipue ex ratione, insignis sensus, continuationisq; cum cerebro, dolore, fluxione, inflammatione, delirio, syncopa, vigilijs, conuulsione, atq; interdum resolutione infestari solent: vt Galenus. 3. artis medicæ & 6. meth. cap. 3. Paul. lib. 4. cap. 54. & Razes. 2. continen. cap. 13. nos docuerūt, atq; ipsa experientia. Sæpe enim ex paruo neruorum punctum illato vulnere, prædictis symptomatis obortis, & pure retento, plurimos è vita quàm ocyssimè discessisse vidimus. Cōtra alios, quos humi modi symptomata non inuaserunt, sanie intravulnus minimè latente, sanatos: alia multa sunt vel salutis vel mortis causa, aut occasio, nempe ægrotantis temperatura, varius humor, ætas, ars, tēpus, cœlestis influxus, atque etiam regio, vnde Auerrois collig. 1. inquit, ægritudines quæ in terris Hipp. simpliciter acutæ exi-

Nerui quibus symptomata infestari solent.

Multæ paruo neruorum punctum illato vulnere discedunt, symptomata, sicut obortis, sanieret, alij quos nec non inuadit, sanantur.

Quæ sint in neruorum vulneribus salutis, vel mortis causa aut occasio.

Multum valet sex rerum non naturalium usus vel abusus.

Quid considerare debeat medicus in ægrotante, quo ad curanda neruorum vulnera.

ligēda sēle
thalis, &
Hipp. aph.
declaratur.

Confirmata
ficcitas infa
nabilis.

Febrē cō
uulsiōni su
peruenire
melius est q̃
febrē cōuul
siōne, & de
clarat Hipp.
po. aphor.

Quorūdam
falsa opinio
reprehendit
cuius funda
mētorepō
det.

Hēctici con
sumpti nō
conuallunt.

Prorsus fic
cum contra
hi non pōt.

Multū intum
escere vul
nus, malum,
nihil pessi
mum.

Quod dicitur
de vulneribus
neruorum.

mentario intelligit Hippocratis verba, ubi in nervosis particulis vulnus contigit, sed non perpetuò lethalis conuulsio est, ut ibidem docet Galenus, sed frequēter, vel quādo ex cōsummata inanitiōe, & ficcitate, insurgit, nāq; cōfirmata ficcitas, auctore Gal. 7. meth. insanabilis est, sed ex repletionē orta cōuulsio, nō adeo periculosa, & interdū sanabilis, potissimum cui febris superuenit, cum febris calore, humiditates consumantur, a quibus conuulsionem fieri, certū est: quare Hippo. apho. 4. aph. 57. qui a cōuulsione, inquit, aut distentione neruorum tenetur, febre superueniente, liberatur, idem voluit Hipp. apho. 2. aph. 26. dū inquit febrē conuulsioni superuenire, melius est, quā febrē conuulsioni, cuius ratio est, quia ubi febrē cōuulsio superuenit, indicium est, ex ficcitate conuulsionē suboriri, sed febrē intelligas vel diariam, vel aliunde, quam a conuellente materia natam, meliorem esse, nam si a conuellente materia, duo iā essent infestissimi affectus, nec supra dictis obesse debet, quorundā sententia, falso arbitrantium, a ficcitate, conuulsionē non contingere, ex eo scilicet, quod in tertiā speciei consumptis hēcticis, illa nō reperitur, in quibus summa viget ficcitas, nā ob hoc hēctici conuulsione non afficiuntur, q̃ omnis corporis humiditas, exsiccata prorsus, & consumpta est, vnde nerui non contrahuntur, quia prorsus sic cum, contrahi amplius nō potest, & aliā sunt respōsiones, quas breuitati consulēs prætereo. Circa verò tumorū præfagia, quā his neruorum vulneribus superueniunt, Cornelius de notis vulnerum lib. 5. multū, inquit, intumescere vulnus periculofum, nihil vero, periculofissimum, illud enim, indicium magā inflammationis est, hoc verò, emorui corporis, in quo Hipp. 5. apho. apho. 65. visus est, imitari, dum ait, quibus tumores in vlcēribus

apparent, non cōuelluntur maxime. &c. & apho. 66. inquit, Si in vulneribus fortibus, & prauis, tumor non appareat, ingēs malum, & quāuis hoc, aduersari videatur Gal. in cōm. illius aph. 66. in secūda illius verbi (ingēs) interpretatiōis, conformē tñ est primæ, quā probat ipse, ut verbum (ingēs) verbo (appareat) nō cohæreat, sed verbo (malū) ut sensus sit, vulneribus prauis existētib; si tumor nō appareat, ingens est malum. Cæterum de tremore, siue totius corporis, siue affectu tā tū particulæ ac crebris rigoribus, neruosa vulnera comitari solius de inuasiōis modo, deq; causis eorū, iam libro primo copiose disertum est, insuper, illud ex Guid. tract. 1. cap. de anatomia neruorū, & ex Gal. mente de vsu partiū lib. 1. cap. 17. animaduertere oportet, ex neruorū incisione ad membri extrinsecam partē, flexionem amitti, & ad intrinsecam extēsiōnē cuius causam superius, cap. de neruorū anatome, latē scripsimus, quā ideo hic repetenda nō est, ad hæc, symptoma in neruorum vulneribus, suarum materierum naturā referunt, atq; insequunt. Si enim homo sanguinea temperatura sit, creberrima suboriuntur, si biliosa, tertio quoque die, & sic de alijs: sed illud memorizæ perpetuò tradendum est, si in neruorū vulneribus copiosus, ac penē assiduus sudor, vulneratū occupauerit, futuræ cōuulsionis sæpe esse præfagiū, vnde Auic. Fen. 2. 3. cap. 6. inter ipsāmi præfagia, sudorē connumerauit, & Gal. lib. 2. Hipp. de morbis vulgaribus, in commētario illius canonis, scilicet, sudores multi, ubi rationē reddit, q̃ nimirū, corporis humiditates, veluti in torculari quodā, cōuulsionis vi, exprimunt, varij tñ sunt neruorū vulnerū, & prosperi, & aduersi successus & ego nō nullos nairabiles cōspexi, e quibus in mediū quosdā afferā. Primū, nobilis quidā vir & magnis, atq; fixis neruo-

Interpreta
tio aph. Hip
po. quæ pro
bati debet.

Ex extrinse
ca neruorū
incisione, sic
ex in
trinseca ex
tēsiō amitti
tur.

Symptoma
ta in neruo
rum vulneri
bus suarum
materierum
naturam re
ferunt & in
sequuntur.

In neruorū
vulneribus,
sador copio
sus, & assi
duus futuræ
cōuulsionis
præfagium.

Casus in ner
uorum vul
nerib; satis
admirandi.

CAP. X.

De causa acerrimi doloris qui
vulneratos nervos infe-
stare soleat.



ON extra rem, dubitari
hic poterit, cur nervi tam
sæuis crucientur dolori-
bus, nam primo intuitu, do-
loris expertes fore nervos,

videbatur, cum secundum medicorū pla-
cita, primum tactus sensus instrumētum
sint, si sunt, cum tanguntur, dolore care-
re debuissent, quia iuxta philosophum. 2.
de anima, capit. 11. sensibile si supra sen-
sum ponatur, sensus non sit perceptio,
quemadmodum color, oculis nimis ad-
motus, non percipitur, sed responsio in-
promptu est, nam tunc Aristotelis tradi-
tio procedit, quando sensibile sensui im-
mediate adhærescit, at in nervis, cute, car-
ne, & tenuissima nervorum pellicula me-
diantibus, vel. 2. de objecto visus, non ta-
ctus, aut aliorum, intelligendus est philo-
sophus, quod si quis objiciat, nervos à car-
ne nudatos, nondū putrefactos, tactos tñ,
sentire, respondebis, de naturali & perfe-
cto sensu, non de corrupto præter natu-
ram, de quo impræsentiarum sermone,
propositionem philosophi intelligendā
esse, & erit tertia, & accommoda ipsius in-
telligentia, causa igitur tam acerrimi do-
loris, qui nervorum vulnera consequi so-
let, duplex est, & sensus vehementia qua
nervi præditi sunt, & cum cerebro princi-
pi membro, continuatio, vt docet Gal. 6.
method. cap. 3. & Auic. 4. 4. dict. cap. vul-
nerum nervorum, & Trusianus supra. 3.
artis medicæ, sed an sensus acumē, an ve-
ro cum cerebro continuatio potior cau-
sa doloris sit, non immerito addubatur,
& certe (meo iudicio) sensus acrimonia
potissima doloris causa est, nam si quod
nerui

Sensibile si
supra sensu
paratur, sen-
sus nō sit per-
ceptio, &
quo pacto
id intelliga-
tur.

In vulnera-
tis nervis do-
loris duplex
causa, altera
sensus acumē,
altera
cum cerebro
continuatio.

Sensus acri-
monia po-
tior causa

rum vulneribus, quem omnia ferè nouē
symptomata huiusmodi vulnera comita-
ri solita, inuaserant, nostra curatione (fa-
uente Deo cui gloria sit) sanitati fuit re-
stitutus, Contra puer, sola acus in ner-
uo pedis punctura, cōuulsis pedibus dun-
taxat, & genis rigidis, inter medijs parti-
culis illæsis, è vita discessit, adolescens a-
lius, conto hasta pede transfixo, cum chi-
rurgus, per vulnus lemniscum siue fascio-
lam transmitteret, brachia, & genæ extē-
plo quasi cōuulsa riguere, sed fasciola ex-
tracta, statim symptomata sedata sunt, &
ille breui sanatus alium non citra admira-
tionem conspexi, genu sæuissime faucia-
tum, ingenti, assiduo, acerrimoq; dolore
affectum, cui omnia ad temperādum do-
lorem præsidia, nullum asserre potuerūt
leuamen, solus tamen assumptus cibus at-
tulit, nam dum vescabatur, dolore care-
bat, cum aut à prandio cessabat, dolor sta-
tim reuertebatur, alios in articulis, præfer-
tim in genu, vel apud ipsum, quam leuif-
simis vulneribus percussos, victus ratio-
ne, medendique methodo, exacte obser-
uatis, naturæ concessisse, memini, ynde
Lanfrancus sua chirurgia, cap. de vulnere
in genu, huiusmodi vulnera quauis leuif-
sima, recta, & à perito medico adhibita cu-
ratione, lethalia creberrime fore, existi-
mauit, prudenter me hercle, cū in his vul-
neribus, vulneratū q̄si agmine facto, tāta
symptomata adorianur, hinc Auic. 4. 4.
tract. 1. c. 3. vulnera inquit, quæ cadunt in
genu, apud rotulā, sunt periculosa, & ad
ea quandoque, sequuntur accidentia ma-
la, à quibus pauci liberantur: & Razes
2. continentis cap. 6. & 13. autoritate du-
ctus Galeni, quibuscunq; accidit vulnus
super articulum genu in parte moriūtur,
& in parte cum labore saluantur, quoniā
genua patiuntur laborem ex motu, di-
spositione sana, quanto magis ex morbo,
quod & Paulus lib. 4. cap. 54. docuit.

etiam per
quodam
modum
vulnere

etiam per
quodam
modum
vulnere

etiam per
quodam
modum
vulnere

Vulnera pe-
riculosa in
genu vel pro-
pe.

doloris est in uulnera-
tis neruis
cū cerebro
cōtinuatio.

Arteriz a
corde oriū-
tur.

Arteriz in
sanguinis mis-
sione secure
punguntur.

Puncto ner-
uo in sangui-
nis missione
conuulsio se-
quitur.

Nerui quo-
fugiant do-
lore n con-
trahant ver-
sus cerebrū
suum princi-
piū, vade-
fit conuul-
sio, & deli-
rium.
Dolor an le-
dat neruos,
ablatē an di-
minutē an
vero corru-
ptē.

Obiectio.
Sensus tactus
in doloris
impresio-
ne, id quod
est, iudicat.

Potentia per
fectio in hoc

iudicet sed contrarium, imo corruptē læ-
dere, probandū est. Ad argumentum
respondeo, non ex eo quod dolor calidi,
frigidi, vel similis obiectus sensum discer-
nat, corruptē lædere dici, namq; tactui, tā
propriū est, excellens, quam commen-
suratum percipere, sed ob id quod huma-
næ naturæ proportionem, atque necessa-
riam conuenientiam excedat, eaque ra-
tione sēuius reliquis, a nostratibus sym-
ptoma iure optimo dolor censetur vel se-
cūdo dicendum quod imaginari quādo-
que falso aut corruptē cogat, quod non
est, vt puncturam acus, terebelli, vel his
simile, de quibus Auicē. 2. primi doct.
2. capit. 20. de varijs dolorum generibus
agens meminit, sicq; in dolore, sensus ta-
ctus corrumpitur, vt non rectus, sed ini-
quus iudex censendus sit vel tertiuū dicen-
dum q̄ temperaturæ, vel vnitatis, vel v-
triusq; corruptelam ostendat vel deniq;
corrupta operatio in vniuersum dicitur,
quando effectus naturali contrarius pro-
ducitur.

cōstitit vt re-
ste de obie-
cto iudicet.

Responsio.

Tactui tam
propriū est,
excellēs per-
cipere quā
commensu-
ratum.

Cur dolor
corrupte læ-
dere dicat.
Dolor sēui-
omnī sym-
ptoma dicitur.

Dolor quan-
doq; imagi-
nari cogit,
quod nō est.

C A P. II.

De differentijs vulnerum,
neruorum, chordarum at-
que tendonum.



Neruorum, chordarum, atq;
tendonum vulnera, quæ-
dam punctim, quædam cē-
sim cōtingunt, quæ cæsim,
alia secundum nerui recti-
tudinē, alia pertransuersum, & tunc,
aut abscisso prorsus neruo, aut partim, alia
cum substantiæ partium, quæ neruū coo-
periunt, abolitione, sic vt nerui nudi su-
persint, alia sine abolitione, & istorum
quædam à telo incidente, quædam à con-
tundente, & dilacerante illata, quæ vt va-
ria, ita variam medendi rationem ex-
postulant.

CAP. XII.

Vniuersale, de curatione vul-
nerum, neruorum.Decem vni-
uersalia do-
cumenta.

Ntequam particulare ner-
uorum vuluerum curatio
nem aggrediar, ere esse ar-
bitror, quasdam generales
traditiones, vniuersaliaq;
documenta præmittere, quæ chirurgos
præ oculis habere oportet, hæc decem
numero sunt.

Primum documentum.

Primum do-
cumentum.
Frigidum in
neruorum vul-
neribus ma-
xime fugien-
du, & ratio.

Primum igitur, vt summopere vulne-
ratus frigus fugiat, est enim his vulne-
ribus aduersissimum, quod neruos con-
denset, atq; infartæ illis materiæ exhalationem impediatur, quod Galenus animad-
uertens. 6. methodi capite tertio. in pri-
mis inquit, habendum curæ est, ne quid
ex his quæ vulnus contingunt frigidum
sit, quandoquidem ipsa laborans pars, &
sensilis maxime est, & principum partiū
primati continua, & temperamento suo
frigida, quorum omnium occasione, &
ex facili à frigido offenditur, & suam of-
fensam impertit cerebro, cuius sententiæ
authôr est Hippoc. 5. aphor. aphor. 18. dū
inquit, frigidum inimicum ossibus, den-
tibus, neruis, cerebro, spinali medullæ, ob-
quam rem, & medicamenta, & panni, at-
que deligatur, & deniq; omnia vulneri
adaptanda præsertim hyeme, calfacta ef-
se conuenit, vt docuere Auerroes. 7. col-
liget tract. de cura solutionis continuitatis
neruorum, & Razes. 7. continentis ca-
pite. 6. & 13. in quo, reliqui conueniunt,
sed hoc non perpetuò in omnibus faucia-
tis obseruandum est, nam si iuuenis æta-
te florens biliosa temperatura sit, pene
frigida, æstiuo potissimum tempore me-
dicamenta applicanda illi esse innuit Ga-
lenus. 3. meth. cap. 8.

Frigidū ini-
micum ossi-
bus, denti-
bus, neruis,
cerebro spi-
nali medul-
læ.
In neruo. ū
vulneribus,
& medica-
menta, & pā-
ni, & deliga-
tura calfac-
ti debent: ni-
si æger ioue-
nis & bilio-
sa tempera-
tura sit.

Secundum documentum.

Secundū do-
cumentum.

Secundum documentum esto, vt vi-
ctus ratio, tenuis, ad septimum vsque
diem, quo tempore dolor humorum flu-
xio, atq; inflammatio insurgere solēt, ex-
hibeatur, quod ex Hipp. 1. aphor. aphor.
7. & ibidem Galen. in commentario, at-
que etiam Auic. 4. 4. dict. cap. vulnerum
neruorum satis colligitur, nec solum in-
tra septimum tenuis victus exhibendus,
sed vbicunq; symptomata inuaserint, tū
vt sanguine quantitate, & qualitate tem-
perato, inflammatio minimè oboriatur,
tum etiam vt natura ipsa concoctione ci-
bi non occupata, morbū oppugnare ve-
hementius possit, nec non quia ipsa
causa vulneris imbecilla plurimum ali-
mentum conficere nequit, quod ita de-
mum procedit, si ægrotantis virtus, aut vi-
res tulerint, nam si imbecillis virtus, aut
vires contractæ sint, non adeo tenuis ine-
dia iniungenda, sed hæc victus ratio, quæ
fauciatis paratur aliter dispensanda est,
atq; illa, quæ citra vulnus febricitantibus
exhibetur, istos enim ab ipso ægritudinis
exordio, crassiori cibo vti necesse est,
quod natura in morbi statu, ad Crisim, &
complendam & iuvandam robustior &
agilior sit, sed postquam, ægritudo ad sta-
tum suum peruenerit, tenuis cibus ne na-
tura impediatur exhiberi debet Auic. 1.
4. tract. 2. cap. 8. afferente. At vulneratis,
cum symptomata principio seuiora sint,
neque naturæ opus quo ad Crisim tunc
spectemus, gracilem victum damus, dein
de solidiorem, quod sanguis producendæ
carnis materies conglutinosior redda-
tur, iuxta Auic. sententiā. 4. 1. c. 28. de me-
dicatione solutionis continuitatis, vsque
adeo, vt ipse Fen. 5. 4. tract. 2. c. 18. de ci-
batione restaurati, hedînâ pellē decoctā,
ad fauciatorū cibū, cōmendet, Ego vero
ipsum hædū calida expilatū, & incoctū,

Vulneratis
vsque ad se-
ptimum diē
& vbicūque
symptoma-
ta torserint
tenuis ine-
dia iniūgen-
da, & ratio,
nisi virtus im-
becillis sit.Differtacu-
talis mor-
bus à neruo
rum vulne-
re, quo ad vi-
ctus ratio-
nem, quia in
illo principi-
pio crassior
cibus exhibe-
tur, postea
tenuis, cōtra in vul-
nere & ra-
tio.Quibus edu-
libus & quo
vel

De Vulneribus neruorū.

103

vel pedes, & capita arietina decocta similia edulia exhibere soleo, virtute nimis rō cōcoctrice fauciati tolerante, secus vero ab eis abstinendum, Vnde Gal. 7. metho. medēdi. c. 6. si enim, inquit nutritum ipsum seipsum cōcoqueret, ac in partes digereret, præterea alendis partibus assimilaret, & quibus alimento plurimo est opus, adhæresceret, proculdubio maxime nutritē cibo esset opus. Verū quoniam nō aliud est, quod nutritū desideret, aliud quod ipsum conficit, sed quod nutritū est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & cōcoquit, & adiungit, & adsimilat, ad duo nimirū nobis in opportuno cibo eligēdo, spectādū esse dicat, vnū ipsius cibi naturā, alterum, vires suas proprias, insitāq; Vulneratisigitur, principio lētū iusculū, vbi prius lētes ex alia aqua incoctæ fuerint, exhibeatur, incocta ibi acresta, aut dabis panem albi mellis gelida lotā, saccaro suprasparso, & acresta etiam infusa, abluī panis ille gelida, ne calor nimis a furno cōtractus, & fermēti putredo, nocumēto sint, cibus etiā erit ex cucurbita, & lactucis, vel iare pulli, vel amigdalato, vel amylo, saccaro condito, sensimq; solidior cibus instituedus est, sic vt pullis, gallinis, & altilibus, vitulina, arietinaq; carne vescatur, & tan dē pedibus, capitibusq; hædinis, & arietinis, & vitulinis, vt sanguis cōglutinofior fiat, vt superius dictū est, potus esto, principio ex aqua, saccaro albisimo incocta,

Vinū in neruorum vulneribus, quoniam & quibus scruatis propinandum.

Sauciat' paulatim ad cō-

vel ordeo excorticato, maxime æstiuo tpe, deinceps, vinū satis tēperatū propinabis, si mō symptomatū iā oīs suspicio cesset, & præsertim si pituitosa, vel atrabiliosa tēperatura eger pditus sit, vel mōta na loca seu frigida inhabitet, aut affuetus vino, vel vbi immodicus sanguis ē vulnere pfluxit, cui sōia cōcinit Cornel. lib. 5. cap. de victus rōne & notis vulnerū, sicq; recte nec aliter intelligēda est Theodori

ci, Henrici, atq; anglorū vinosa (q̄ vocāt) victus ratio, deniq; paulatim ad cōsuetudinē qua sanus vtebat, æger reducendus est, ad hæc, sex reb' nō naturalibus ea tenus vtatur, quatenus in naturales res, que prosperā valetudinē, & faciunt, & tuent, conuertantur, & à venere summo opere caueat, cuius ratio iā lib. 1. à me scripta est.

Tertium documentum.

Tertium documentum, circa sanguinis misionē & alui solutionē versatur, est enim principio mittēdus, vt dolor neruorū vulnera comitari solitus, humorūq; fluxio, atq; inde inflāmatio, facta reuulsione, præcaueantur, snia est Hippo. lib. 3. vlceribus, Gal. 6. meth. c. 2. Paul. lib. 4. c. 54. de neruis cōuulseratis Auic. 4. 4. dict. cap. neruorū vulnerum, propterandūq; esse ad sanguinis misionē, neglecta syncopē suspiciōne, cōsultit, Auerrois, colliget. 7. tract. De cūa solutionis cōtinuitatis neruorū, & deniq; vene sectio, ad sedationē doloris eo vsq; competit, vt Gal. 13. meth. c. 5. etiam si corpus ab excrementis purū sit, tundere venam iusserit, cum dolor fluxionis causa fiat, non enim (vt ipse Galen inquit lib. de curandi ratione per sanguinis misionem capite. 8.) quando magna fuerit ægritudo, sed cum suspicabitur vehemens, mittendi sanguinis est tempus, sed hoc ita demum, obseruandum est, si ægrotantis virtus, & vires tulerint, sin minus, vel parcius mittēdus sanguis, vel cucurbitulæ cum scarificatione, vel citra eam, secundum ægri tolerantiam, affigendæ, tutō enim affiguntur, vt eleganter probat Cornelius, libro. 2. capite. 11. dum inquit, vbi sanguinem mitti vires non patiuntur, id auxilium, vt minus vehemens, ita & magis tutum, nec vnquam periculosum, & Gale. lib. de sanguinis emisione, & de reuulsione, cucurbitulæ

suetudinem qua san' vtebatur reducendus. Sex reb' nō naturalibus quo pacto vtendum, Venas fugiēda summo opere in vulneratis neruis. Tertium documentum.

In neruorum vulneribus principio mittendus sanguis & ratio. Quamuis ab excrementis corpus purum sit mittendus sanguis est in neruorum vulneribus.

Nō cum ægritudo magna est, sed cum suspicatur vehemens mittendi sanguinis est tēpus.

Si ægri virtus sanguinis misionē non toleret vel parcius mitti vel cucurbitulæ affigi debent tuto enim af-

figuntur vel
constrictio-
nibus & de-
ligaturis ut
dam.

Clyster san-
guinis mis-
sionem præ-
cedere de-
bet in cura-
tione regula-
ri, licet in
coacta hoc
peruertatur
& sic Hipp.
accipiendus
est.
In neruorū
vulneribus
vbi cūque
symptoma-
ta videntur
mittendū san-
guis est vir-
tute & æta-
te ferentibus.
Si in bra-
chio vulnus
constat ve-
na saphena
ex talo cor-
respondenti
secanda, si
in crure aut
pede basilica
ex brachio
eiusdē
partis recti-
tudine serua-
ta.

Quartū do-
cumentum.

Aluius cie-
nda in vulne-
ratis neruis.
Pharmacū
& nocetem
humorē re-
spicere nec
effrene ni-
mis esse de-
bet quia ner-
uorum affe-
ctus sub no-
tis conuulsi-
onibus
runtur.
Si neruorū
vulneris in-
ferioribus par-

curbitulis, & scarificatione, & in commē-
tario. 2. aphor. aphor. 17. vel constrictio-
nibus, & deligatiōibus crurium, si in bra-
chij vulnus consistat, brachiorum, si in
cruribus, atq; etiam lauacris vtēdum est,
autore Gale. 13. meth. cap. 6. & cap. 21.

sed curæ tibi sit, vt clyster sanguinis mis-
sionem præcedat, iuxta Auic. præceptū
4. 1. cap. 20. & Pauli lib. 6. cap. 40. qui qui-
dem in regulari (quam vocant) curatio-
ne, intelligendi sunt, ne cōtrarius sit Hip-
po. lib. 4. de victus ratione in morbis acu-
tis canone. 18. dum ait, nam præcipuum
in his propositum est, in primis sangui-
nem detrahare, deinde clysterem exhibe-
re, accipiendus enim est, incoacta cura-
tione, vbi à sanguinis missione incipe-
re cogimur, sed illud maxime te animad-
uertere volo, non solum principio, sed
quocūq; tempore quo symptomata vr-
ferint, mittendum esse sanguinem, virtu-
te, & ætate (vt sæpe dictum est) ferentibus.
Galen. docente. 9. meth. cap. 5. & lib. de
curandi ratione per sanguinis missione,
prope finem, vena autē si in brachio vul-
nus sit, saphena ex talo eiusdē partis, si in
crure aut pede, basilica ex brachio corre-
spondenti secanda est, seruata carexi, id est, re-
ctitudine, vt tradit Gal. lib. de reuulsione.

Quartum documentum.

Quartum ad alui solutionem per-
tinet, est enim in comperto, vt si
vulneratus vitiosis succis re-
dundet, nisi exacte purgat' sit, recte cura
ri nequeat, ergo cienda ei albus est, vt præ-
cipit Gal. 6. meth. c. 2. Pauli, lib. 4. c. 54. A-
uic. 4. 4. c. 1. vulnerū neruorū, Auerr. loco
superius citato, & penē omnes, verū sol-
uens pharmacum, nocentem humorē re-
spicere, nec nimis effrene esse, opus est,
quando neruorū affectus, sub acutis qui-
bus forte pharmacum noxium est, cōnu-

meratur à Gal. de victus ratione in mor-
bis acutis, sed illud non leuis momenti,
memoria nunquam excidat, quod si ner-
uorū vulnera inferioribus partibus sint,
non solutiūo pharmaco, sed vomitu vtē-
dum est, contra in superioribus, quod ele-
ganter tradit Galen. 4. meth. cap. 6. & 13.
meth. cap. 6. Auic. 4. 1. cap. 4. Auerr. colli-
get. 6. cap. pharmaciaz, Razes. 11, continē-
tis cap. 1. ex quo mire Hipp. lib. de insom-
nijs euomere illis præcipit, qui vlceribus
vel crurium læsionibus se affectos som-
niarunt quod mirum est, aurire etiā aqua
putei sepius in die vlceribus crurium ma-
xime prodesse experientia compertum
est, quo autem pharmaco aluius ciēda sit,
certa lege perscribi non potest, sed medi-
ci peritiæ relinquendum, nec scdm Gal.
de curandi ratione per sanguinis missio-
nem cap. 12. in principio, certa exhiben-
dorum quantitas assignari potest.

Quintum documentum.

Quintum documentū est, vt prin-
cipio linamenta, aut turundam in
neruorum vulneribus, inde-
re minimē ausus sis, quin prius naturæ
opus experiaris, quæ sæpe agglutinationem
astringit, cuius artificium, linamentis
destruitur, & si primis curationibus pro-
speris successus spes fouerit, reliquis idem
intentum obseruabis, coalescentia dun-
taxat ad mouendo præsidia, quod si for-
san symptomatum in cursu natura impe-
dita, ab instituto cesset, vanaque prima
auxilia fuerint, tumente vulnere, laten-
teque interius pure, quod respirare ne-
queat, tunc ad breuia linamenta, ne tan-
gantur nervi, atque dolorem inferant,
coacte sane deueniēdū est, & facile erit,
vulneris oras, vel digitis, vel specillo ape-
rire, equidē mea hæc est sententia, totius
vitæ periculo probata, quam cum seque-

tibus sint,
nō solutiūo
pharmaco
sed vomitu
vtēdū, con-
tra in supe-
rioribus.

Qui somnia
uerū se cru-
rium læsio-
nibus affe-
ctos, euome-
re debent ex
sententia Hip-
pocratis.
Quo phar-
maco aluius
cienda &
pharmacū q̄
titas certa le-
ge præscri-
bi non pōt.

Quintū do-
cumentum.

Linamenta
in neruorū
vulneribus
quibus pun-
ctura nō est
principio im-
mittendā
sunt, quia
poti' agglu-
tinatio ren-
tenda, quæ
si non respo-
deat hęc vi-
tæ turunda vtē-
dum.

remur

De Vulneribus neruorū.

105

Multi linamenta immissis mortui multi citra ipsa sanati sunt.

Casus notandi.

Rationes quae conuincunt fugienda esse linamenta.

Prima ratio.

Medicis scopus incurandis vulneribus agglutinatione vulnere est.

Secundaria ratio.

Medicus naturae adiutor dicitur, & esse debet. Natura vulnus agglutinare contendit.

Tertia ratio.

A linamentis dolor accerimus inflammatio & interdum conuulsio insurgunt.

Linamenta solum vbi pus expelli oportet, imminuuntur.

Quarta ratio sumpta ab argumēto à fortiori.

Linamenta in thoracis penetranti vulnere prohibita sunt ne agglutinatione (naturae opus) impediant.

remur magna certè neruorum vulnera quam ocysime perfectā agglutinationē ad Dei gloriā consequunt, cōtra, hac nō obseruata methodo multi è vita discesserunt, & vidi duos eiusdē ætatis, ac ferè tēperaturæ, eodē tpe, atq; eadē corpis parte fauciatis, quorum alter, linamētis inditis, dolore, symptomatis, cōuulsione correptus, intra .14. diem mortuus, alter, citra tarundā curatus, in pristinā sanitatem diuino numine, redactus est, & hæc doctrina rōnibus certè vrgētissimis communitur. Primum, illa, medici in curandis vulneribus, scopus est ipsa agglutinatione, sed eā linamēta impedire incōperto est, ergo ab illis abstinendū. Consequentia patet nā si qđ minus vī inesse inest, ergo & id qđ magis. Sed oleū & aqua vel pill^o siue puluis: vulneris agglutinationē prohibent, ex Gale. 4. meth. ca. 4. ergo à fortiori linamenta. Ad hæc, medicus naturę adiutor esse debet, & ab vniuersis doctoribus sic vocatur, sed natura pro virili vulnus agglutinare contendit, ergo iuuare, eius intentū debet, & non impedire: iuuabit autem, si linamēta fugiat, impedimēto erit, intra vulnus ea immittendo, accedit, vt linamenta tangendo neruos, prænimio sensus acumine, & dolorem accerrimū, & inflammationē, & interdū cōuulsionē accerseat, cui etiam sniæ Corne. lib. 5. c. 26. de agglutinatione vulnerū subscribit, quæ post habita turēda, cessant, rursus, linamēta hæc vbi pus expelli oportet, duntaxat imittunt, at principio, de quo nobis sermo, nulla sanies incruēta plaga est, ne cessaria ergo nō sunt. Præterea, argumēto, qđ à fortiori dī, cōprobat, nā si in thoracis penetrantibus vulneribus, linamēta (ne scilicet naturæ opus impediat) multis prohibent, fortius ergo in neruorū exterioriore vulnere, principio, vbi agglutinatix deligatura rectè adaptari, dānanda est, insup illorū opinio iuxta Gale. sniam

tertio artis medicæ, & 3. meth. cap. 4. vbi vulneris oræ vt iungendæ, coniunctæq; manere debent asserit, quē Guido noster sequit tract. 3. capi. vniuersali de curatiōe vulnerum, intentū hoc inter reliqua summe cōmendat, cui linamētis vtentes, aduersi manifestē iremus, nec huic nræ traditioni defuerunt authores, si quidē Guilielm. de Saliceto chirurgiæ facultatis, & peritia, & experiētia vir nō contēendus libr. 20. cap. 18. & Petrus Argelata libr. 3. tract. 1. cap. 19. linamenta quæ neruū tangant, fugienda esse docuerūt, affirmātes si linamentis nerui tangerent, dolorem, fluxionē, inflammationē, conuulsionē, & denique sæpe mortē euocari, quæ mala multis sæpissimè euenisse, experimēto & ipse vidi, quibus authoribus ego, addo, nullo modo principio, etsi neruum non tangant, linamētis vtendum, si modo alia agglutinationi minimè aduersent, sed fortassis, me falsæ scitæ inuentorem, vanilo cumque triuiales & cute tenus chirurgi, arbitrabuntur, retorquentes in me Galē authoritatē. 6. meth. cap. 2. & 3. artis medicæ cap. 6. vbi maximè admonet, nō agglutinatoria præsidia in puncto neruo, sed quæ dolorē mitigent, & saniei exitū patefaciant, esse admoenda, & Auic. Fen. 4. dicto cap. vulnere neruorū, iubentis ne ad consolidationē pperemus, sed incipiendū à doloris sedatione. Sed ego quidem, iuuenes veritatis studiosos, quā doctrinā, & rōne verā, & longa experientia probatā scio, nec à doctis aspernandā fore, spero, docere cupio, nam imperitos alios multos, ab inueteratis erroribus reuocare, & à praua consuetudine auertere, per quā durū esset, quibus minimè fauet Gale. qui in nerui punctura cæca, ex qua dolor ingens distorquet, apertè loquitur, nec Auicēna, qui quando principio symptomata insurgunt, intelligēdus est, sed nos non de punctura nerui, sed de

Generale est vt vulnere oræ iungantur.

Guilielm. Saliceti laus: cuius & Petri Argelate auctoritatem sententiam suā probat.

Obiectio ex Galeni auctoritate. In punctura nerui nō agglutinatione, sed quæ dolorē mitigent, & saniei exitū patefaciant, esse admoenda sunt præsidia. Alia obiectio ex Auicēna. A doloris sedatione incipiendum, non ad consolidationē properandū. Ab inueteratis erroribus & à praua consuetudine auertere per quā durum. Quid incōmodi habet authoris sententia, & ceteri radii methodus.

inciso neruo, vbi non infestant sympto-
mata tractamus, in quo principio (vt su-
perius admonui) consolidatio procuran-
da est, id tamē incommodi habet nostra
hæc curandi methodus, quod dum egro-
tantes tam breui se sanatos conspiciunt
curationē negligentes, debita nos merce
de defraudāt, vt mihi non semel cōtigit.

Sextum documentum.

Sextum, ante oculos habere debes,
vt communem multorum errorem
fugas, existimantium, tanquam inuola-
tum legis esse præceptum, secundam vul-
neris curationem tertio die moliendam,
qui citra dicrimen vllum, supersticiosē
semper id obseruant, capta (vt suspicor)
occasione, à Gale. 4. 5. & 6. meth. & alijs
in locis, & Cornelio, libr. 5. cap. de ratio-
ne victus, & notis vulnerū, qui tertio die,
vulnus soluere, & illi mederi aliquando
iubent, inferunt ergo isti, semper triduo,
ab illato vulnere curandum, imo (quod
fatis mirari nequeo) ætate, bishyeme se-
mel curari vulnera oportere, quæquidē
à ratione alienissima sunt, nam (vt cum
istis loqui liceat, qui legē hanc tam scrup-
ulosam sanxerunt) scire opto, sympto-
matis quæ vulnus glutinari habent, non
infestantibus, quando iam immediatē co-
alescit, quorsum tu chirurgæ tertio die,
vulnus soluere, & curare properas, quem
cōsultius multo esset naturæ voto in glu-
tinando vulnere non resistere, sed in sex-
tum, & longius curationem protrahere,
est enim hoc Galeni menti consentaneū
in commentario supra lib. Hipp. de fract.
in illo. §. incipienti. Postquā verò ad ter-
tiū diem, dum inquit, quod em in lignis
quæ semel coniunguntur est gluten, id
cōfractis ossibus callus est, vt merito quæ
callo conglutinandæ sunt fracturæ, quæ
te summa indigeant, quippe cum si cal-
lus concreescens agitur, & moueatur,

diffolui nō secus ac gluten quo ligna cō-
mittuntur, aut lac, qđ coagulatur, solet.
Adhæc, cur cedo contrario, vbi sympto-
mata sequunt, triduū, imo horam spectas,
an vt interea dolore, atque ingenti inflā-
matione affecta particula, stituo potissi-
mū tempore, corrūpatur, Et cur queso,
vulneri puris experti, quod non sympto-
mata distorquent, ætate bis, sanioso ve-
ro cū symptomatis, hyeme, semel vno-
quoq; die mederis, cum illud, rarius, hoc
pluries curandum esset, ergo lex illa stul-
tissima prorsus & sine rōne (si sine disci-
mine ea vtamur) cōfenda est, Quare ani-
maduertere debes, bifariam vulnus gluti-
nari contingere, aut primaria (quam vo-
cant) intentione, vbi cum symptomatis
nulla, aut levis colluctatio est, nec prauis
succis corpus redundat, sed bona tempe-
ratura præditum, bonaque victus ratio
vtitur, tunc quidem rore duntaxat nutri-
mentali (præsertim iuuenili corpore) con-
solidatio sæpissimē perficitur, aut secun-
da intentione, vbi nimirum hæc omnia
cessant, quin potius symptomata distor-
quent, dolor, inflammatio, vitiosq; succi
ad vulnus percurrant, quo casu non faci-
lè vulnus coalescit, imo ipsius oræ dissi-
dēt, cum ex vulnere, in vlcus conuertat,
vt iam nō primis, sed reliquis præfidijs cu-
randū sit, si igitur agglutinatio principio
rñdeat, prosperaq; omnia, inculpataque
sint, nec triduo, nec etiā sexto vulnus at-
tingendū est, qđ in oibus corporis vulne-
ribus, quæ glutinari volumus, regulare
esse debet. Si verò hæc absint, aduersa que
sint, non in triduū differenda curatio, sed
eodē die, & bis, totiesque noctu, qñ que
curabis, potissimū, vbi dolor neruorū vul-
neribus peculiaris, defauit, cui nřæ sniæ
astipulantur Auic. doctri. 4. 4. dicto capi-
te vulnere neruorum, Aetij sermone
14. Trusiani supra. 3. artis medicæ, Cau-
liaci tract. 3. capit. de incisione & vulne-

re ma-

Quid inco-
modi habet
authoris sen-
tentia, & cu-
rati metho-
dus.

Sextum do-
cumentum.

Vulnus nō
necessario
tertio die, &
in ætate bis
in hyeme se-
mel curan-
da.
Obiectio ex
Gal. & Cor-
nel. autori-
tate.

Reprehensio
ex ratione,
prohibent

Obiurgatio
ex ratione.

Reprehensio
ex ratione.

Vulnus bifa-
riam gluti-
nari contin-
git.

Vbi vulne-
ris glutina-
tio prospere
succedit, nō
triduo, nec
etiā sexto
sed cū opus
fuerit curan-
dum est, si
aduersè suc-
cedat, & vr-
get sympto-
mata eodem
die, & cre-
bro.

De Vulneribus neruorum.

107

re magno, & Nicolai florentini sermo-
ne. 7. capite fracturæ cranei, qui fortiori
casu, nepe in cranei fractura, vulnus quo
ad perfectè cōglutinet, soluendū nō esse
præcipit, nec obstat Gal. & Cornel. supra
citati, intelligendi em manifestè sunt. Se-
cū dū nrām distinctionē, qñ scilicet prin-
cipio, symptomata, & alia, primariæ intē-
tioni impedimēto sunt, & ob id tridui po-
tissimū meminere, non q terminus ne-
cessarius sit, q præponi, nec postponi po-
sit, sed qd tertio, vel quarto die, recrudē-
scere, & scuire interdū vulnera magis so-
leant, vt Hippo. libr. de fracturis docet &
colligit ex Genes. 34. c. his verbis, acēsiq;
sunt oēs, circūcisis cunctis maribus, & ec-
ce die tertio, qñ grauisimus vulnerū est
dolor &c. Vnde si tertio die, dolor hic tā
acerrimus torqueat, tertio, si primo, pri-
mo, si sexto, sexto, vuln' curabis, nec per-
petua tridui lex statuenda est.

Vulnus etiā
cū cranei fra-
ctura quoad
perfecte glu-
tinetur sol-
uendum nō
est.

Gale. & Cor-
nel. declarā-
tur.

Tertio die
recrudescere
& scuire
vulnera so-
lent.

Quo tempo-
re curandū
vulnus, iūdo
leat.

Septimum documētum.

Septimū do-
cumentum.
Septimū erit, vt si in manu vulnus
constitit, ex leuissima tabella, seu sic
ca cucurbita, fabrefacta, pannis inuoluta
gospio que farcta, vulneratē manui aptē
applicet, quæ & neruis, & vulneratis ofsi-
bus maximè conducit, tum vt nerui, atq;
ossa quiescant, nec huc atque illuc diua-
gentur, nam sine quiete vulnerū aggluti-
natio non rectè contingit, auctore Gal.
5. meth. ca. 8. tum etiā, vt incisi nerui me-
lius atq; directius coalescant, tabellæ aut
huius author est Guido tract. 3. capi. vlti.
de vulnere cum incisione ossis, qui et si
de ossibus loquatur, ex eadem ratioe ad
neruos trahendus est, si verò in brachio
vulnus sit, tabella longior qua nō manus
solum, sed totum brachium cōtineatur,
applicari debet, si in crure, capsulā, quam
Gale. 6. meth. cap. 5. glosiocomon vocat
(vt ibidem præcipit) artificiose moliaris,
quæ præterquam, quod vulnere aggluti-

Manus exta-
bella leuissi-
ma vel ex cu-
cubita fa-
brefacta pā-
nis inuoluta
& cotone
facta, vulne-
ratis manui
applicanda
& ratio.

Vulnerato
brachio ta-
bellæ appli-
candæ.

Cruri vulne-
rato capsu-
la quæ glosi-
ocomon di-
citur molie-
da & ci' vti-
litas.

nando prodest, iuuat insigniter, cū æger
cubile mutat, aut etiam è ventre aliquid
excernit, & ne comprehendendum ma-
nibus, aut lecti stragulis offendatur, qua-
ratione etiam arculum supra capsulam,
aut tabellas machinari soleo. Ceterum si
nerui duntaxat citra ossium incisionem
vulnerati sint, tabellæ, vel capsula cito a-
moueantur, quò callus, ad extensionem
flexionemq; exercendam, ductilis fiat,
& hoc si in manu vulnus sit, si verò & os
incisum, multo serius, quod ad congluti-
nationem maiori multo mora ei, quam
neruis opus sit, vulnerati autem membri
accommodā repositionem Gal. authori-
tate Hippocr. 6. metho. capi. 5. eleganter
docet, vt nimirum, eam figuram quæ ma-
ximè à dolore absit, & qua æger persiste-
re diutius immorus possit, eligamus, bra-
chio quidem angulosam, cruri verò quæ
paulò minus porrecta sit.

Arculus su-
pra capsulā
adaptandus
& ratio.

Tabellæ &
capsula ab
incisa ner-
uis cito a-
moueantur,
sed à celsis
ossibus serius
& ratio.

Qualis esse
debeat vul-
nerati mem-
bri repositio.

Octauum documentum.

Octauum documētum nunquam
memoria excidat, vt nimirū vbi
inflammatio, aut symptoma aliquod vul-
nus adoritur, calidis, nimisque humidis,
emollientibus, putrefacientibusque præ-
sidijs, qualia sunt, calens aqua, pulres ex
hydroleo, id est aqua, & oleo, & triticea
farina confectæ, malux, altheæ radix, a-
uium adeps, commune oleum, & his si-
milis, quæ emolliendi putrefaciendique
vim retinent, minimè vtaris, nanque vul-
neratis neruis aduersissimas sunt, q corru-
ptionem inducant, accedit vt cum ex hu-
mida fluidave substantia progeniti ner-
ui sint (vt superius admonuimus) à cali-
do & humido faciliè dissoluantur, vt Gale.
6. methodi capi. 2. & 3. de compositione
medicamentorum per genera capit. de
vulneribus neruorum, Auicenna. 4. quarti.
cap. sæpius citato Anetr. colliget, 2. ca. de
cōplexione mēbrorū confimiliū, atque

Ossis do-
cumentum.

Emollientia
putrefacien-
tiaq; pūdria
in neruorū
vulneribus
futura
hæc sunt.

Raza

Razes lib. 4. continētis capi. de punctura nerui, quos reliqui oēs sequuti sunt, pcla mātēs hmōi prāsīdia, vt lethalia, & calamitatis plena fugiēda esse recentētiq̃ue innumeros tristissimos successus ex emollientiū ac putrefacientiū vſu, vel potius abusu obortos, & mea tēpestare, multos satis deplorādos conspexi. Adde dam nandā etiā esse frigidā aquā quod insigni ter neruos condenset, vnde Hipp. 5. aph. apho. 18. frigidū inquit, inimicū ofisibus, dentibus, neruis &c. de quo supra iam latius primo documēto scripsimus, sed quā uis hoc in neruorū vulneribus regulare sit, in nerui tñ punctura principio qñ ob vulneris angustum osculum, sub carne, vel cute pus delitescit, emollientibus leuiusculis vti tuto decet, quo dolor, miteſcat, & pori ad saniei fluxionem dilaten tur, emollientia autem sunt cōe antiquū oleum solum vel cui sulphur, cōmixtum sit, lumbricorū, sabinum oleum, & ex o uorum vitellis, & alia quæ potius dolorē sedandi, ac leuiter leniendī, quā putrefaciendī vim sortiuntur.

Nonum documentum.

Nonum vniuersale præceptum nō leuioris est momenti, quod conuulsionem quævbi immediatā à cerebro originem, atque sensus acumen, vulnera tis neruis perſæpe insultare solet à corpo re arceat, ergo si vulnus in superioribus membris, vt manibus, & brachijs confiſtat, axillæ, collum, ac ſpinalis medulla, vſque ad ceruices, ſi cruribus inguina calenti oleo ſecundum Galenum. 6. Methodi capite. 3. illinienda ſunt, cui ſenten tiæ ſubſcribere etiam Paul. lib. 4. cap. 5. 1. Auic. 4. 4. cap. vulnerum neruorum, Razes lib. 13. continētis. capit. 6. & lib. 14. capit. 4. Sed oleum accommodatius erit, camæ mellinum, irinum, & lumbrico rum, sed poteris ex hmōi oleis, addita hi-

fopo humida, adipe auium, æqua portio ne mxtis & tantillo lumbricorum, ac cro cei pulueris, cum cæra quæ ad coagulandum ſufficiat, vnguētum conficere, quo prædicta membra illinies, sed ſi iam hominem conuulſio corripuit efficaciora alia inſtituenda remedia, & vt non idem sed triplex conuelendi modus eſt, nempe ex inanitione, plenitudine neruorūq; & cerebri compaſſione, ſic non eadem præſidia in vſu ſemper eſſe debent, sed alius, alia expoſtulat, igitur ſi ex inanitione & ſiccitate, quæ paulatim poſt ſanguinis immodicam profuſione, vel eximiū puris effluxum, vel diutinum alui proſtium, ardētiffimæque febres innāſcitur, ſupra dicta membra humectantibus medicamentis, vt violaceo amigdalino lumbricorum, atque lini ſeminis oleo ſolo, vel vaccino butyro cum cæra alba coagulato, vbertim perungenda ſunt, & quantis huiusmodi exinanitione cōuulſio lethalis Hippocrati ſit (vt ſuperius etiam admonui) aliquando tamen ſed raro, maxime prodeſt, vulneratum intra ahenum vel tinam humectantium herbarū decocto plenum immitti, deinde prædictis illiniri, nec minus conſert vtre, quo oleū diu contineretur, obuoluiſſet ſi ex plenitudine, humores à quibus plenitudo excitatur, prius fortibus medicamentis purgabis, & ſanguinē (ſi & ipſe peccauerit) mites, poſtea calidis & ſiccis temperate medicamētis, eaſdem partes fouebis: ea ſunto, nardinum, laurinum, caſtoreū, euphorbij, atque lumbricorum oleum, ex quibus etiam vnguētum compones addendo caſtorei, ſabinæ, & pulegij pollinē cum cæra quæ ſatis ſit, vtatur etiam æger caput purgijs & ſternutatorijs, adde huic malo inſigniter ſuccurrere cauterium in colli vertebris auctor eſt Nicol. Floren. ſermo. 7. tract. 4. ſumma prima capite de cura vulnerum neruorum per chirurgiā.

Sivēro

Molti miſere. periere hmōi emollientibus ac putrefacientibus.

Aqua frigida neruis aduerſa.

Frigidū inimicum neruis.

In nerui punctura leuia emollientia conueniunt & quæ ſunt.

Nonum documentum.

Quibus præſidia cōuulſio arcenda ſit.

Triplex cōuulſio ex inanitione plenitudine, & cerebri compaſſione.

Quæ adhibenda remedia ſunt vtriusque conuulſio hominē corripuit.

Inanitione ex ſanguinis, aut puris vel alui immodico proſtium innāſcitur.

Conuulſio ex inanitione remedia.

Cōuulſio ex plenitudine lethalis Hippocrati eſt.

Conuulſio ex plenitudine præſidia.

Cauterium in colli vertebris inſigniter conuulſioni ex plenitudine conſert.

De Vulneribus neruorū.

109

C A P. XIII.

De nerui punctura.



N VNC ad particularē neruorū vulnerū curationē descendam^o in q^b ea solū quæ in vniuersali scripta non sunt pertractabim^o, & primū nerui puncturā, vt periculosiorē curādā ppono, quæ nimirū ex neruoso loco vulnere arcto, doloreq; acerrimo palā erit, ergo vbi corpus gⁿalib^o remedijs iā superiore capite traditis pparaueris, ad tria potissimū intēta omnem curationē rediges nēpe vt affixū telū (si qd est) refigam^o, dolorq; & inflāmatōne, & sepe cōuulsione excitat, arceat, etsi iā inuaserit, mitescat, virus, prauūmve vulneris ichorē extrahamus, vuln^o emūdem^o, exsiccem^o. Primū efficies vulfellis, aut alio subtili instrumēto vel etiā p^oidijis quæ sanie foras pellere apta sunt, q^lia erunt arūdinis radix cōminuta, pistata satis ac melle mixta, ppolis, amoniacū, quercinūviscus oleū antiquū, aut sabinū, vel sambucinū p se, aut cū cæra cōpactis, interiusq; (si vulnus pateat) cū specillo immisisis, sin minus exterius lintheo admotis cōferre etiā solet incisā rana pūcturæ illico applicata, ad scdm iuuabit insigniter sabinū antiquū oleū, vel sambucinū aut lumbricorū, non super rofaceo, vt alias solet confectum cuius lumbrici nō aceto, sed vino suffocati fuerint, vel cōmune vetus oleum separatim, aut optima terebinthina mixtum, tepidum intra puncturā instillatum, verum a consolidatibus p^oidijis cauendum tibi sum mopere erit: sed his duntaxat quæ dolorem leniunt, ac poros aperiūt vtendum, vt Calenus. 6. methodi capite. 2. Razes libr. 13. continentis capite secundo. AEtius libro quarto. capite. 54. & latius superius dictum est, quo fit, vt rofaceum, & myrtinum oleum in nerui punctura, tanq^l stiprica, & obstruētia vulnus, neq; va-

Nerui punctura ex neruoso loco vulnere arcto & dolore acerrimo agnoscitur.

In nerui punctura i tres scopos tenenda curatio, in refigendo telo, sed dando dolore & inflāmatōne, vulneris emendatione & exsiccatione.

Talem quibus refigatur.

Dolor quib^o p^oidijis mitescat.

Consolidantia p^oidia in nerui punctura fugienda.

Rosaceum & myrtinum oleū in punctura nerui aspernanda & quare.

Conuulsio-
ni ex neruo
rum & cere-
bri cōpassio
neremediā.

Si vero ex neruorū, & cerebri cōpassiōe, neruis ob acerrimū dolorem lædentem rem fugiētib^o versus suum principium cerebrum cōtractis, conuulsio excitetur, medicamentū de quo in huius documenti principio, eadē partes in primis perungendæ. Ceterū si punctura cæca, vel neruus per trāuersum partim non totus incisus in causā cōuulsiois sit, ad propria (de quib^o inferius) capita decurrēdū est. Vbi nota immeritō Argenterii Gale. taxasse: negat em̄ spasmū ex siccitate fieri ex eo qd ethici cū summa iā siccitate nō conuellunt, sed valeat in ethicis enim humiditates toti^o corporis. f. ros cambiū & glutē iam sunt cōsumptæ & caro ipsa & interdū ossa siccitate constricta: igit^r qd siccū admodū est, cōtrahi non valet: in conuulsione vero iicetas non itidem.

Decimum documētum.

Decimū do-
cumentum.

D Ecimum & vltimum documētū, nec obliuio dignū, nec minus necessariū, admonet, vt semper in neruorū curatiōis pgressu, laborātis atq; vulneris dispositionē, & naturā attētē cōsiderem^o sic vt scdm vulneris mutationes sympto-
matū varios incurfus, ægrotātis vicissitudines, p^oidia ipsa permutemus, remedia inuertam^o, exēpli grā, si calidis vsus medicamētis, a calore offensum, fauciatū conspicias, neglectis illis, cōtrario frigidis vtresis a frigidis noxa innasciūt, cōtemnes frigida, ex teploque, ad calida decurres, qd optimē docet Auic. 4. 4. tract. 1. cap. de regimine habitiū apostema, & dolorē. Habenda etiā rō est medicaminū qualitatis, & grad^o, vt mēbri tēperaturā rñdeāt, nec excedant, hæc sunt, quæ in huius capituli principio polliciti sumus documenta, quæ in vniuersum neruorū vulnera omnia, & affectus respiciūt, & licet priora illis sint, reliquis etiam corporis vulneribus multum conueniunt.

Remedia se-
cundum vul-
neris muta-
tiones, va-
rianda.

Habenda ra-
tio est medi-
caminū qua-
litatis & gra-
dus vt vul-
nerata par-
ticulæ re-
spondeant.

porantia

Medicami-
na tenui sub
stantia ad ner-
ui puncturā
à Gal. com-
mendatur.

Oleo in ner-
ui punctura
vltimur vbi
nerui nō pa-
tent, non in
alio neruo-
rum vulne-
re & ratio.

Immodicas
fabini olei,
& lenientis
vltis perni-
ciosus potis-
simus in ner-
uo punctore
recto & rō.

porantia aspernari debeāt, ex mēte Gal.
loco citato, atq; Guid. sēpē allegato cap.
laudatur etiam à Gal. 3. artis medicæ me-
dicamenta tenui substantia prædita, quæ
visque ad offensi nerui ima penetrare pos-
sint, nec mirari debes, quod in neruorum
vulneribus oleo vtamur, nā id duntaxat
in nerui punctura, & vbi nerui nō patēt,
in vsu esse debet, neq; em̄ (vt Gale. inquit
6. metho. cap. 2.) parum interest nudōne
neruo oleum, an per interpositam cutē
admoueas, confert similiter commixtio
illa Auenzoharis. 2. sui theisir excerpta
ex Gale. dicto capi. ad doloris leuamen à
Doctōribus commendata, & à me non
principio, sed curationis progressu, perse-
pe experta constat ex sulphure ignis ex-
perte, non lapidofo, sed omnino tenuiū
partium in pollinem redactō, & oleo cō-
muni antiquo, laudat etiam Doctōr ille
eodem theisir tract. 5. cap. 2. oleum ex o-
uorum vitellis, quod perutile interdum
vsu inueni, prædictum etiam sulphur cū
euphorbio, aut euphorbiū cum antiquo
oleo miscere solitus sum, quo, post ali-
quā inter capedinē tēpis (præsertim in du-
ris corporibus) vtor, iuxta Gal. dicto cap.
sed quis huius cōmune fabinū, & sambu-
cinum oleum, aliaque lenientia, inter ini-
tia vtilissima sint, immodic⁹ tñ & creber-
rimus curvūsus neruo potissimū puncto
detecto, q̄ neruos, nimis emolliant, pari-
terq; putrefaciant, deterrimus reddi, par-
cē ergo hisce oleis vtendum, & vbi pun-
cturam eis illinieris succidam lanā calfa-
ctam superimpones, quā non solū ad pū-
cturam, sed quæcunque neruorū vulnera
cōmendat Gal. dicto cap. 2. & Auic. 4. 4.
tract. 4. cap. de cur. vulnerū neruorū, vte-
re similiter ad dolorem, inflāmationē ac
vaporationes quæ à sanie ad cerebrū con-
scendunt, arcendas, linimēto ex rosaceo
lumbricorū bolo armeno atque aceto, in
quo, lumbrici prædicti olei ferbuissent,

confecto, superiori membri parti longē
à vulnere adaptato, forā prius lumbrico-
rū calenti oleo tota particula. Tertiū in-
tentum multifariā comparat, nam post
venam sectā, aliaque vniuersalia, postq;
foram prædictis totam puncturā, atque il-
litam superiorē membri partem, si vulne-
ri adhuc virus inhæreat, qđ respirare ad
exteriora nequeat, tūc extractioni illius,
deinde vulneris emūdationi, & denique
exsiccationi, totis viribus incumbēdum,
extrahe ichorem accōmodē si angustū
osculi cucurbitulā puncturæ affixeris, si
affixio nimirū apta figura locufve sit, cō-
strictis interea fortiter funibus membris
que directim vulnere correspondeāt, cu-
curbitula affixa prodesse solet vel hirudo
fricta pri⁹ salsa aquā, aut sanguine aliquo
vulnerata particula illita quo magis ad su-
gendum hirudo alliciat, vt innuit Auic.
4. 1. ca. 2. 1. Demum fermentū euphorbij
pulvere mixtū terebinthinæque oleo sub
actum applicandū erit, sed & ipsum solū
terebinthinæ feruens oleum pūcturæ in-
stillatum, sēpē maximam vtilitatem attu-
lit, cuius meminit Nicol. Floren. ferm. 7.
cap. de pūctura nerui, vbi etiā feruefactū
cōde oleum intra puncturā infundere præ-
cipit, peculiare scilicet apud vulgus præ-
sidium, nec mirum cum ad ichoris noxā
abolendā, humiditates quascūque infitas
exsiccādas, conuulsionēque arcendā, me-
dicamina hæc vim nō vulgarē fortiatur,
nec interea cessare debet linimētū illud
(quod defensionū vocant) boli Armenici
de quo nuper dixim⁹, quo in mēbri supe-
riore parte semp vtaris. Cæterū vt virus,
humiditatefve exsiccent non parui emo-
lumentū esse solet iuniperi oleū calens, in
nerui puncturā aspersum, valet etiā pluri-
mum guttula fortis aquæ alchimistarū,
intra vulnus infusa, vsque adeo, vt etiam
principio instillata, non alijs indigere
præsidijs, mihi interdum contigerit, ve-
rum si

Ichoris ex-
tractio qui-
bus compa-
retur.

Cucurbitu-
la affixa vi-
ras & vulne-
ris ichorem
extrahit.

Pūcturæ af-
figenda est
hirudo, vt
vulneris vi-
rus extraha-
tur.

Cōmunefer-
uens oleum
vulgare, sed
bonum præ-
sidium ad ner-
ui pūcturā.

De Vulneribus neruorū.

III

Ferreo, aut
aureo caute
riocutis di-
latata si vol-
nus contu-
max fuerit.

Vulnus qui-
bus digeren-
dum, eman-
dandum, &
excicandū.

Extremis
morbis ex-
trema reme-
dia optima
sunt.

Si sympto-
mata distor-
queant, nec-
alijs mite-
scent, totos
neruos raso-
rio vel cau-
terio abscin-
dendus.

rum si supradictis contumax vulnus sit, aut rasio vel rectius aureo, aut ferreo cauterio, cutis dilatari debet, ea tenus quatenus nerui punctura liberius curari valeat, de quo cauterio Niculus & Guido dictis locis scripsere. Demum excisus vel vltus locus vnguento ex optima terebinthina beti, vitello oui momentoq; croci, simul agitaris, ac lumbricorū olei guttulis aspersis, locus digerendus, postea rosaceo melle, fabarum, vel orobi farina, tātilloq; terebinthina, emundatus, ex siccatib; vtero, carato ex propoli, terebinthina, resina euphorbio, atque aristolochia, scicioribus mēbris, & corporibus, in humido ribus, thure mafculo, modico serapini, opoponacis, atq; olei euphorbij, cum cera cōpactis quæ deinde manibus subigito: ad idē præstat medicamentū ex pice, cera, resina, terebinthina, oleo veteri, atque lumbricorū equē mistis: sed si (quia varia est hoīm natura bonis sæpē auxilijs renitens) vana tanta præsidia fuerint, sympto matumq; magis ac magis furiat incurfus, tunc, qñ auctore Hipp. apho. 1. apho. 16. extremis morbis, extrema atque exq̃sita remedia optima sunt, vt conuulsioni, mēbriq; corruptioni imo hoīs vite, succurramus, rasio vel acuto cauterio totus neruus abscindendus est, iuxta Auicē. si iam sæpē citato loco in hæc verba, & multo- ties est necessariū abscindere totum neruum vulneratum, ac punctum, cum tota litate, & prouenit ex eo quies, & separan- tur accidetia mala, idemq; docuit Gal. 3. meth. cap. 9. & alijs in locis, post incisionem neruum, vulnus & digeratur, & ex sicce- tur, quæ admodū iam dictum est. Eadem quoque totalis incisio molienda est mu- sculo non completē per transuerfum in- ciso. Sed ne post incisionem nerui puncti vel per trāsuerfum semi incisi eius vtrius- que partibus retractis accideret mem- brum manū manere, consueui ex meo

(vraiunt) matre acu vtranque nerui par- te secandā transigere, & super aquam ner- uum truncare demū acum filo extrahe- re: hoc additū, vti insignior corruptio vulnus occupet ægyptiaco inscripto vn- guento emunderet; vltimo medicamen- tum ex terebinthina paululo cere, & pro- poli, in lintheo vulnere applicato, nec fa- stidias tantam auxiliorū molem; est em̃. periculosissima sapissimēq; lethalis ner- ui punctura, quæ bona curatione, experi- mentisq; multis de facili expugnatur, ex qua calamitosos casus quotidie eueni- re scio, vnde Plin. natur. hist. lib. 26. c. 1. se- cundum Lecanium Bassum police leuā manus acu euulsa & semetipso, tam par- uo vulnere, vt vix cerni possit obijisse, re- censet. Cæterū si inflammatio vulneratæ particulæ inuaserit ad caput de neruorū apostematibus, si conuulsio, ad depræca- uenda conuulsione capit. decurrendum est, sed non male connectetur hic addu- bitatio illa, si nerui punctura & hæmorrha- gia (idest sanguinis profluuium) concur- rat, quo pacto vtrunq; malum curabit, in angusto em̃ res posita vñ, qñ puncturam vulneris dilatatione hæmorrhagiæ cōtra- rio consolidatiōe egere compertum ha- bemus, sed trifariā tanto periculo succur- sum est, aut venę seu arteriæ vnde proflu- uium nascitur laqueali futura, punctum versus radicē venę sanguis fluxu admouen- do (vt latius cū de sanguinis fluxu agamus differemus) puncturam vero proprijs auxilijs curado, aut ignito cauterio pun- cturæ admoto, sic em̃ sanguinē compe- sces, vulneris osculum amplius, nec no- virus igne consumes, aut cum Gal. 3. me- tho. c. 9. & lib. 7. consulo vbi in curatione complicantur affectus, vt ab vrgentiore citra cuius remedium alijs succurri non potest, incipias, est autem vrgentiore hæ- morrhagia, ergo imprimis quam oculi- me sistenda, deinde illico nerui punctu- ra.

Periculis-
sima & sæpē
lethalis ner-
ui punctura
ex qua qua-
rē de accide-
ntissimas casus
eueniunt.

Quicquid Le-
canius ex ac-
ciderit mori
necesse est
seleque ma-
nus acu in-
cisa obijisse.

Si & nerui
punctura &
sanguinis p-
fluuium co-
currant tri-
bus præsi-
dijs vtrique
male succur-
ritur.

re (si inducias præbeat) subueniendum cui curandi methodo alludit etiam Auicenna. 4. primi. capite ultimo.

C A P. XIII.

De neruis & tendonibus cæsim prorsus per transfuersum incisus & primum an consuendi sint.

Nerui & tendones autem cæsi sunt cõtrouersitur.

Negatiue partis argumenta.

Primum argumentum.

Nerui & tendones sub femoralibus partibus cæsi sunt.

Secundum argumentum.

Nerui punctura quæ symptomata excitat.

Tertium argumentum.

Galenus omni genere doctri-
næ auctor & cultor optimus.

Quartum argumentum.

Nerui punctura cõuulsionem euocat.



AN vulnerati cæsim per transfuersum nerui, ac tendones confui debeant satis controuertitur inter Chirurgos, nec utraque quidem opinio argumentis defuit, quem articulum, ut perutilem impræsentiarum qua possum diligentia pertractabo, & non consuendos esse neruos, & tendones illa sua dent. Primum quod futura, tunc molienda est cum sanguine & carne: particula, quæ primaria duntaxat intentione glutinantur: disident, at nerui & tendones, qui sub femoralibus partibus cæsi sunt, secundaria (callo nimirum medio) consolidantur, non ergo consuendi. Præterea, in curandis hisce vulneribus, id potissimum, quod dolorem inflammationem, atque conuulsionem accersit, maxime vitandum, sed talis est futura qua neruus pungitur, ergo fugienda. Quod autem nerui punctura prædicta mala excitet probat Galenus. 3. artis medicæ, & 6. metho. capit. 2. & Auicenna. 4. 4. dict. capite vulnerum neruorum. Rursus si futura in vulneratis neruis uti oporteret præcepisset utique Gal. (omni genere doctrinæ auctor ac cultor optimus) apud quæ, nec vllum de ea verbû, adhæc Razes. 1. 3. continentis cap. 6. chirurgis præcipit, ut dum vulnus consuunt summopere caueant, ne acu neruum tangant, punctura enim (inquit) nerui conuulsionem euocare parata est. Vnde qui hanc partem de

ferunt, ex Raze colligunt: carnem duntaxat insuto derelicto neruo, consuendâ, hæc fuit opinio Dini Floren. Auic. interpretis, in illius cõmentario, Petri Argelæ. lib. 1. tract. 6. capi. de incisione neruorum, & aliorum. Contraria tamen longè verior & ratione, & longa experientia cõfenda est, quæ à Guid. tract. 3. cap. de vulneribus neruorum. & à Lanfranco, & Guilielmo de Saliceto probatur, sed Guilielmi excessum repræhendo, dum perperâ duplici futura, altera in carne, altera in neruis utendum præcipit. Hanc etiâ partem defendit Auicenna sæpe citato capite, in hæc verba si autem dirumpitur neruus, secundum latitudinem, necessarium est ipsum suere, etsi non, nõ conglutinat, & licet male, aduersæ factionis auctores, velut cæreum nasum, retorquere voluerint obiectionem illam ipsum ad vulnus, & solius carnis altam futuram nõ ad nerui referentes, non tamen vlllo pacto huiusmodi intelligentia defendi potest, cum clariora sint Auicennæ verba, quàm ut interpretatione egeant, nec vllus dubitaret, suendam esse carnem, sed non per se, sed cum neruis ipsis, nam si solam conserueres, insutosque (ut illi volunt) neruos dimitteres, cum non carni continui, sed contigui, lenes & lubrici, ipsi sint, dũ vulneris oras carnes ad suendum vehementius conduceres magis ac magis nedonẽ retrocederent, grandiorq; necessario generaretur porus, quæ seu sui & motui impedimento esset, & opinionis Auicennæ & reliquorum, fundamenta illa sunt, Primum ossa quæ sicciora & multo ipsis deorsum duriora sunt, primaria intentione sæpe in pueris ut caro ipsa immediatè consolidatur auctore Gal. 3. artis medicæ, & ibidẽ Trufiano interprete, ac Auic. 1. 1. doct. 5. capi. 1. de membro. anat. idem Auic. 5. 4. tract. 2. ca. 1. Fortius ergo glutinosi nerui futura media glutinabuntur. Porro ner

Secunda affirmatiua opinio tenenda quod nimirum nerui ac tendones cõsuuntur.

Guilielm. ex cessus repræheditur existimantis duplici & carnis & nerui futura vteendum.

Auic. locus male ab aduersæ opinionis doctoribus interpretatus, à prauo ipsorum sensu vindicatur.

tendones.

Primum affirmatiue opiniois fundamentum.

Ossa in pueris sæpe immediate primaria intentione consolidantur. Scdm fundamentum.

uofæ

De vulneribus neruorum.

113

Neruosque uosæ ventris particulæ vt Galen. 6. methodi cap. 4. probat, & experientia ipsa indicat, creberrimè per futuram coalescunt, igitur & nerui, in super Galen. 3. artis medicæ dum generaliter de curandis vulneribus ageret, nullum circa curationem (sola nerui punctura excepta) inter neruorum, & alia vulnera discrimen constituit, clarissimum scilicet argumentum, vt nec quo ad futuram, constituatur, imo & ipse Galenus. 6. methodi cap. 3. quem Paulus lib. 4. cap. 45. imitatur apertè docuit, vulnerum neruorum curationem, communè esse cum ea quæ alijs vulneribus accommodatur. Quod si de solis medicamentis Galenum intelligendum cõtenderes, totam quidem ipsius doctrinã funditus euerteres: qua passim monet, medicamina, morborumq; præidia, secundum vnus cuiusq; particulæ naturã varianda esse: ergo nõ de medicamentis sed de futura Gal. est intelligendus. Similiter si nutrimentali humore à natali die & nutriuntur, & augetur ossa, nerui, aliaq; seminalia membra, vsq; dum adolefcendit tempus excedant, præstantius multo eodem nutrimentali humore per futuram glutinabuntur. Potissimum in euechimis florenti ætate bonaq; temperatura corporibus. Quod si hæc cessent, negari certe non poterit quin conductis futura neruis, non tantus creabitur alienus callus, quantus infutis ipsis, consequenterq; facilius animalis spiritus, sensum, & motum ferens, ad vulneratum influet, atque irradiabit membrum: nec improbanda tam verissima, tanq; rationi consentanea sententia, longa oratio necessaria est. Nã etsi tantis argumentis destitueretur, vel ipsa certè clarissima conuinceretur experientia. Recensentur enim à doctoribus qui hanc partem fouerunt, mirabiles casus, vbi ope futuræ, membra vulneratis ueruis languida, in pristinum

Neruosque uosæ ventris particulæ vt Galen. 6. methodi cap. 4. probat, & experientia ipsa indicat, creberrimè per futuram coalescunt, igitur & nerui, in super Galen. 3. artis medicæ dum generaliter de curandis vulneribus ageret, nullum circa curationem (sola nerui punctura excepta) inter neruorum, & alia vulnera discrimen constituit, clarissimum scilicet argumentum, vt nec quo ad futuram, constituatur, imo & ipse Galenus. 6. methodi cap. 3. quem Paulus lib. 4. cap. 45. imitatur apertè docuit, vulnerum neruorum curationem, communè esse cum ea quæ alijs vulneribus accommodatur. Quod si de solis medicamentis Galenum intelligendum cõtenderes, totam quidem ipsius doctrinã funditus euerteres: qua passim monet, medicamina, morborumq; præidia, secundum vnus cuiusq; particulæ naturã varianda esse: ergo nõ de medicamentis sed de futura Gal. est intelligendus. Similiter si nutrimentali humore à natali die & nutriuntur, & augetur ossa, nerui, aliaq; seminalia membra, vsq; dum adolefcendit tempus excedant, præstantius multo eodem nutrimentali humore per futuram glutinabuntur. Potissimum in euechimis florenti ætate bonaq; temperatura corporibus. Quod si hæc cessent, negari certe non poterit quin conductis futura neruis, non tantus creabitur alienus callus, quantus infutis ipsis, consequenterq; facilius animalis spiritus, sensum, & motum ferens, ad vulneratum influet, atque irradiabit membrum: nec improbanda tam verissima, tanq; rationi consentanea sententia, longa oratio necessaria est. Nã etsi tantis argumentis destitueretur, vel ipsa certè clarissima conuinceretur experientia. Recensentur enim à doctoribus qui hanc partem fouerunt, mirabiles casus, vbi ope futuræ, membra vulneratis ueruis languida, in pristinum

Authoris opinio clarissima experientia in multis casibus probata est.

motum, sensum, & salutem restituta fuerit. Et testis ego sum oculatissimus, innumeros pene homines post confutos neruos, sensificam, & motuam resumpsisse facultatem, & inter alios vnus in manu sæuissimè vulneratus, cui à chirurgo carne duntaxat confuta, ob idq; motu digitis orbatis, & à me ad curandum hominem accersito, sectis punctis, & confutis neruis ecce subito manum, & digitos mouere cepit. Sed ad contraria argumenta respondeamus. Primum ex his quæ dicta sunt facile diluitur, Secundum in cæca quidem punctura non in futura nerui procedit, vt excitatis locis aperte videre est. Nec tertium conuincit, cum ab auctoritate negatiue locus non procedat. Quarto non in difficile fit satis, cum Razes citato loco tantum absit à contraria opinione, vt manifeste nostram docuerit, ibi nanq; defuendis neruis agens iubet, vt dum neruos chirurgi consuunt, caueant ne neruum pungant, non punctura, quæ transmissa acu, necessario, cum fuitur neruus, fit, sed cæca fueris chirurgi incuria, aut neruorum lubricitate facta, quæ (vt iam dictum est) & dolorem, & inflammationem, & conuulsionem ob impeditam respirationem, accersit, aliter atq; transmissa (dum neruum sumus) punctura, vbi si ichor aliquis generetur, facile respirat, aut in carnosam ampliorem vulneris sedem illabitur. Sed hanc nostram tam veram, tanq; securam traditionem, impugnare quidem videtur perigrinus locus Galeni. 3. de compositione medicamentorum per genera, cap. de vulneri. neruor. quem contrariæ sententiæ auctores referunt, dum inquit, itaque veritus tendines ipsis confuere denudatis prius illis à me, sic altioribus futuris vsus sum, haud ignarus carnosam ipsam musculorum partem periculo vacare, redines vero non itidem. Et statim subdit, cæ-

Casus satis notandus.

Responsio ad primum argumentum.

Responsio ad secundum argumentum.

Ad tertium argumentum responso.

Locus ab auctoritate negatiue non procedit.

Ad Quartum argumentum responso.

Locus Galeni quia doctores auctores sententiæ videntur, declaratur.

terum nonnulli opus à me cōfectū imitan-
tes, anatomes imperiti, ab omnibus mu-
sculis subiectas membranas auellunt, ne-
scientes has simul cum musculis tutò cō-
sui, tendines autem similiter ipsis dilata-
tos: non mediocri cum periculo. Quibus
verbis, tendines consue se non ausum,
quòd periculosa sit futura, fatetur Gale-
nus, sed, nec vos à rā rationi consona, aīsi
duoq; periculo probata sententia, deter-
reat Galen. series, nam in illa speciali gla-
diatoris (de qua agit) curatione idcirco
Galen. tendines non consuit, qđ scilicet
vereretur: in tā altissimo vulnere, vbi ten-
dines ipsi plurimū dissidebant, priusquā
acu traiceret, ipsos cæca punctura, quæ
prædicta parit incommoda: pungere, nec
mirum, cum tunc temporis, iuuenis in
exercitatus (vt ex eius textu constat) ef-
fret, cæperatq; (nuper gladiatorum cura-
tione à Pontificibus sibi commissa,) ner-
uorum vulneribus mederi, at postea, per-
fectam nactus neruorum curationem, in
tantis suorū operum voluminibus, futu-
ram minime damnauit, imo certe ea vtē-
dum præcepit quando non differre à re-
liquis, neruorum vulnera edixit, ergo no-
stram hanc medendi rationem posteris
commendamus, quam facilem, prospera-
raq; (Deo auspice) futuram spero.

CAP. XV.

De varia neruorum pertrans-
uersum incisorum futura, &
illorum curatione, ex pri-
maria intentione.

Neruorum
pertransuer-
sum inciso-
rum suendi
methodus.



Actenus conuenire in ner-
uorum vulneribus futurā
disputauimus, nunc de suē-
di methodo, ac reliqua cu-
ratione agendum. Ergo
cum ad neruos & tendines incisos curan-
dos accedis, præmissis victus ratione, &

humoris nocentis vacuatione, & conuul-
sionis præcauendæ præsidij præ oculis
in curandis vulneribus habendis, de qui-
bus vniuersali capit. absterse prius tenui
lintheo, concreto vulneris sanguine, la-
uabis ipsum aqua ex colla, seu glutine, de
qua infra cap. de medicinis vulnerū ner-
uorum. Deinde vulnus consues, non (vt
perperam arbitratus est Guilielmus de Sa-
liceto alioqui doctissimus lib. 2. cap. 18.)
duplici separatim futura, altera solius ner-
ui cum neruo, altera superioris carnis,
quod quā esset absurdum, nemo non
videt: nec (vt alius doctor non minus ma-
le docebat) alteram, nimirum carnis &
incisi nerui superiorem oram, cum alte-
ra tantum inferiori carnis parte, relicta
priori nerui ora, consuendo. Namq; si sic
consueretur, animalis spiritus sensum, &
motum deferens, manifeste euanesceret,
cum ad nerui alteram partem minime ir-
radiare posset, perindeq; & sensus, & mo-
tus membrum expers redderetur. Admo-
uenda igitur glutinatrix futura, quæ car-
nem, & neruos vtrinq; simul comprē-
dat. Distentq; puncta inter sese, pertrans-
uersi digiti spatium, reuoluta bis acu sub
ipso filo, ipsoque constricto & nodato.

Qua in futura, duo animaduertenda sum-
mopere sunt, Primum, vt vulnere simile-
tur, vt summo vulnere, summa futura,
alto, alta moliatur: si enim in summo pro-
funda, vtereris, dolorem sine causa exci-
tares: si vero contra supernæ atq; summæ
vulneris cohererent partes, internæq; dis-
fiderent, vt ex Gale. colligitur. 3. de com-
positione medicamentorum per genera
cap. de vulneribus neruorum, essetq; ma-
ximi nocuenti, cum necessario cauum
superesset vulnus, Secundum, vt nec laxa
nec stricta nimis futura sit, iuxta Gale-
num. 6. methodi cap. 4. in illa enim vulne-
ris oræ dehiscunt, in hac, dolor insurgit,
& interdum ipsæ oræ dirumpuntur, alia
etiam

Reprehēditur
Guilielmus de Sa-
liceto in ada-
ptanda futu-
ra.

Cuiusdā ta-
citiauthoris
quo ad futu-
ram repre-
henso.

In consue-
dis neruis
quæ obser-
uanda sunt.

Alto vulne-
ris alta futu-
ra summo
summa con-
uenit.

Sutura nec
laxa nec stri-
cta esse de-
bet.

De Vulneribus neruorum.

115

etiam non inutuli ego vtor futura vbi ob
eximium loci sensum, dolorem, atq; in-
flammationem futuram suspicor, quam
vt prædictam molior, nisi quod in hac,
non nodatur, nec scinditur, sed illaquea-
tur filum, vt scilicet, cum symptomata di-
storsierint, laxari (si oportuerit) pūcta po-
stea constringi possint, ne incidēda sint,
incisis enim, grandior generaretur po-
rus, hic tamen vos præmonitos volo, vt
si in articulis vulnus consistat, nisi infi-

gnitum altum sit, minime consuatis. Nam
ex futura non læuia sequuntur incommo-
da, & contrario, ea non adhibita, magnā
laborantibus comparatam vilitatem fre-
quenti experientia satis intellexi filum
aut firicum, aut incoeratum in vsu tibi sit.

Quauis Auenzohar sui theis tracta. 7.
cap. 4. de neruo suo vtero agens, setæ cru-
dæ filo aptius consui vulnus docuerit: &
talis futura, donec vulnus fere consoli-
detur non auferatur, ita tamen vt filum
non putrescat consolidetur, acus sit acu-
tæ, tenuis, & triangularis cuspidis, calibis,
non aurea, nec argentea, vt male voluit
Trusianus supra. 3. artis medicæ in com-
mentario illius. §. incipientis præcedit au-
tem eam, &c. cæterum si (vt nonnunquam
præsertim hyemali tempore euenit) à fri-
gore vulnus offendatur viuentem galli-
nam per medium incisa vulnere applica-
re, optimum præsidium censeo. admota
igitur futura, pannus cum simplici tere-
binthina, vulnere applicandus est, & cir-
cum circa, atq; de super, oui candido stu-
pæ infusa, deinde madefacti panni in oxi-
crato. Demumq; apta deligatura applicē-
tur, sed obijciat forsan quis quorsum cura-
tionis principio vbi sanguis fluit, ac vul-
nus ardet, terebinthina vteris, quæ calo-
ris experts non est. Cui respondebis, tere-
binthinam, maximam quidem glutinan-
di neruos vim retinere: esse que (authore
Aucenna. 4. 4. capi. vulnerum neruorū)

in signius neruorū medicamentū, cuius
calor si q̄s est oui candido & posca tēpe-
rat, præstat etiam, albumē ipsum oui per
se vel rubeo, (quem vocant) puluere com-
misto. Potissimum si sanguinis profu-
uium vrgeat, de quibus & alijs in antido-
tario latius. Sed si vllō articulo vulnus in-
federit oui candido ad dolorem sedan-
dum, omphacinum oleum permiscen-
dum, laxioriq; vtendum deligatura. Vti-
mo tabellas, aut capsulam membro ada-
ptabis vt vniuersali cap. docuimus. Secū-
da vulneris curatio iuxta doctrinā à me
dicto cap. traditam, vel properanda, vel
demoranda erit, & cum ad curandum ac-
ceseris, stypticovino albo calido incoctis
ibi lumbricis, pannos ac deligaturas ma-
defacies, ne cum abstuleris vulnus dilace-
res, sed caue ne huiusmodi pannos oleo
(vt quidam absurdè faciunt) intingas, o-
leum enim, & glutinationem impedit, &
putrefactionem inducit pannis sensim se-
motis attendendum est, reluceatne spes
aliqua glutinandi vulneris primaria intē-
tione: quæ si appareat, ad glutinationem
tota curatio dirigenda erit, ergo aqua ex
colla aut prædicto vino vulnus ablues,
quod si dixeris, huiusmodi vinum articu-
lorum vulneribus aduersari: Hippocra-
tis doctrina ductus de vlceribus libr. in
principio, dum inquit, vlcera nulla made-
fieri debent, præterquam vino nisi articu-
lum teneant, respondebo Hippocratis lo-
cum haud vllā ex parte obstare, nam (vt
in eius commentario optime explicat vi-
dus vidius) exceptio illa nisi articulum te-
neant non ad vinum, sed ad alia etiam hu-
mestantia medicamenta referenda est,
vt quauis alia vlcera solo vino made-
fiant, articulorum tamen, & vino, & alijs
madefacienda sint non vt vulnera sunt,
quæ exsiccatione egent, sed obpericulū,
quod ex natura affectæ partis ingens sub-
est, ne neruorum distensio superueniat,

ne exsiccatio
ne egent.

H 2 hocq;

Alia futura
quando do-
loris ac in-
flammati-
onis suspicio
est.

Nota

Si vulnus in
articulis co-
sistat, nō co-
suendum ni-
si insigniter
altum sit.

Filo ad suē-
dum, vel fri-
co, vel in co-
rato vti dū.

Acus ad su-
turā tenuis
triangularis
& calibis sit,
non aurea
nec argentea
vt male vo-
lebat Tru-
sianus.

Gallina per
medium in-
cisa vulnere
ab aere of-
fenso appli-
canda.

Curatio ex
primaria in-
tentione.

Terebinthi-
na cur vul-
neris princi-
pio tamur.

Vbi dolor
vrget laxio-
ri vtendum
deligatura.

Tabellæ aut
capsula mē-
bro applicā-
da.

Panni & de-
ligaturæ sty-
ptico vino
antequam à
vulnere se-
paretur ma-
defacienda
ne vulnus di-
lacet sed
non oleo in-
tingenda &
ratio.

Si glutina-
tionis spes
principio ap-
pareat ad
glutinationem
tota cura
ratio dirigē-
da est.

Vulnus vi-
no alluitur.
& Hipp. lo-
cū primoin-
tuitu contra-
rius declara-
tur.

Vulnera qua
tenus vulne-
ra exsiccatio
ne egent.

hocq; ex Hipp. de fracturis, libro & Gale. in eius commentario confirmatur, vbi ex eadem ratione in fractis, & vlcera-
particulis, non solū vino, sed etiam vino
& oleo & cærato, & rosaceo vti præci-
piunt. Fovebis postea membrum rosa-
ceo, & lumbricorum oleo commisto, cu-
ra adhibita, ne vulnus tangat, quod Gale.
monet. 4. methodi cap. 1. linimentumq;
aut (quod vocant) defensiuum ex bolo
Armeno in superiori membri parte ap-
pones supra vulnus, cæratum gummi
vernici, aut aureum vnguentum Guido
nis, vel ex colla, vel alia (de quibus infe-
rius) vulnere adaptanda sunt, de super du-
plicatus pannus eodem stypticovino ma-
defactus, & expressus, & cum vulnere cō-
solidatio iam apparet, pūcta subtiliter se-

Fila si facile
inciſis pun-
ctis extra-
ctioni nō ce-
dant sine dā
ut glutinoso
vnguento ex-
trahantur.

Cum cura-
tio ex prima-
ria intentio-
ne instituit
dirigentiā &
pus concita-
tia (quæ se-
paeatque
oleosa à Cor-
nel. & Gale.
dicuntur) fu-
gienda.

cabis & si illorum fila facile extrahi ne-
queunt ea finito, glutinosum enim appli-
candum medicamentum ea extrahet, id
erit, vel triapharmacum, vel apostolicum
chirurgicum vel oxycroceū, quod post
vulnere glutinationem applicabis illud
non obliuisci oportet ut quando curatio
nem ex hac primaria intentione institu-
ris digerentibus, ac pus concitantibus
(cum imperito vulgo) præsidij minime
vtaris, quæ à Cornelio lib. 5. capit. 26. de
glutinatione vulnere sepaece & à Ga-
len. 2. ad Glaucōnem cap. 2. oleosa medi-
camenta dicuntur naturæ enim operi in
vulnere glutinando aduersissima sunt.

CAP. XVI.

De prædictorum vulnere
curandi methodo ex secun-
daria intentione.

Ex secunda-
ria intentio-
ne quā docu-
ratio aggre-
dienda & cū
aggregatur
glutinantia



LI A curandi methodus
(quam secundariam intē-
tionem nostri vocāt) nūc
agredienda est: cū vulnus
vel ab acre alteratū, vel

de perdita substantia, vel corpore vitiosis
succis redundante, vel mala temperatura
prædito, vel dolore fluxione aut inflam-
matione instantibus primaria intentio
ne glutinari nequit quod dū hæc ad sunt
exsiccatia atq; glutinantia præsidia, cruē-
tis plagis alioqui (inter initia) efficacissi-
ma, vana & irrita reddantur ergo tunc
multis perfecta vulnere curatio compa-
ratur, nempe lenientibus, suppurantibus,
emundantibus, carnem producentibus,
ac deniq; exsiccatibus auxilijs. Primum
leni goſſipio aut liniamētis parum con-
tortis, vulnus suauiter absterges, Deinde
breuem turundam (quæ neruum non tan-
gat, ne dolor concitetur) in decliuorem
vulnere partem indito, sit turunda pene
absciso capite, ut puris effluxioni locus pa-
teat, nam integrum caput impedire exi-
tum puris certum est, de super digerens
medicamentum lintheo perforato (quo
sanies prodire valeat) imposito, fovebis
que abunde membri ambitum oleis, de
quibus præcedenti cap. nec inconueniet
(si dolor nimius sit), tantillo olei quando
que turundam inungere, nec enim alie-
num est ab Hipp. sententia, lib. de vlceri-
bus, & Gal. de simplici medicina lib. 1. ca-
pit. de sanguine columbino, atque Pauli
lib. 6. c. 9. qui curationis principio ad do-
lorem sedandū, & inflammationē coërcen-
dā intra cerebri tenuissimas, neruisq; cō-
textas mēbranas: rosaceū oleū infundi iu-
bent cōfert etiā insigniter ad doloris le-
uamē, papaueris syrupus vulnere delin-
gere autoritate Razes. 2. cōtinētis, & si
ob doloris acrimoniam in tēperie aliqua ca-
lida mēbrū corripiaſ, frigidarū herbarū
succis, cataplasmate, atq; vnguētis (quæ la-
tius in antidotario describent) corrigēda
erit, quā aut rōne cōuulsionis suspicio sit,
ei occurras: superi⁹ iā traditū habes, si ve-
ro inflammatio adoriaſ, eius curationis po-
tissimarō (modo vulnus non prorsus ne-

& exsiccatia
præsidia v-
na sunt.

Curatio ex
secundaria in-
tentione, hinc
tibus, suppu-
rantibus, &
mundantibus
carnem, pro-
ducētib; &
deniq; exsi-
cantibus au-
xilijs cōpa-
ratur.

In secunda-
ria intentio-
ne brevis tu-
runda quæ
neruum nō
tāgat immi-
tenda cuipe-
ne abscisum
caput sit &
ratio.

Si dolor in-
signis sit quā
que olei tā-
tillo turun-
da vngere a-
licum non
est ab Hip-
po. & Gale.

Papaueris
syrupus do-
lorem insi-
gniter sedat

Si vulnus in-
flamatio a-

gligas,

De Vulneribus neruorū.

117

*doriatur ei
curatio po-
tissimum in
cubedū mo-
do vulnus
non profus
negligat &
ratio.*

*Vulneris cō-
solidatio ex
sanguinis in
carnem con-
uersione fit,
cōuersio ve-
ro hæc ex
mēbri & san-
guinis tēpe-
rie constat.*

*Temperatu-
rarum & mē-
brorum di-
scrimen in
admodū obis
auxilijs ob-
seruandum.*

gligas, habēda est, vt docet Gal. 1. 3. meth. c. 8. cuius causā in promptu habes, cum nimirū vulneris consolidatio ex sanguinis optimi in carnē conuersione fiat, huiusmodi autē cōuersio, mēbri virtute, atq; sanguinis tēperie constat, quæ cum inflā- matione infestante, cessent, & conuersionem, consequenterq; consolidationem cessare necesse est, inflā mationis tñ curationē, postea proprio loco docebim⁹, vulnere iā suppurato ac symptomatis remissis, tūc emūdātibus deinde farcoricis, seu carnē producentibus, tādē exsiccantibus auxilijs vtēdum, obseruato tñ (vt passim monet Galen.) temperaturarū, & mēbro- rum naturę discimine, postremo empla- strū aliquod ex his quæ superiori capite scripta sunt, membro applicato.

C A P. XVII.

De neruis ac tendonibus per-
transuersum partim, non
ex toto, incisis.

*Cam nerui,
aut tendines
non ex toto,
sed partim
pertransuer-
sum præci-
duntur, peri-
culum febris
cōuulsio-
delirij alio-
rumq; sym-
ptomatum
impēdet, &
diligenti ac
vigilanti chi-
rurgo opus
est.*

*Sanguis in
vulnere ner-
ui per trans-
uersum non
ex toto inci-
si vberi⁹ mit-
tendus.*

*Vbi neruus
per transuer-
sum non ex
toto præci-
sus est, potit*

Venit per transuersum ner-
uos, atq; tēdines nō ex toto,
sed partim quandoq; præci-
di, quod vulneris genus pe-
riculi quidem plenum est,
quod febris deliriū, cōuulsio, aliaq; sym-
ptomata (quæ iā supra notauimus) conse-
quantur. Quare oportet, summopere di-
ligentem vigilantemq; chirurgū se præ-
stare. Ergo postquā vniuersalib⁹ semper
permittēdis documentis: fauciatum præ-
munieris hoc addito vt vberius in hoc
vulnere ægrotanti sanguis mittat⁹: autho-
ritate Gal. 6. meth. c. 3. præcipuū curationi
nis cōsiliū est, totū neruū a vulneris exor-
dio amputare. Nā si sic dimitteres, ad san-
nas integrasq; fibras a dissectis vicinis dā-
nū succederet, vt inquit Auic. sæpe citato
cap. Cōtra neruo præciso ad cerebrū læ-
sio minime cōscēdit, quā per ipsū neruū

afferri: satis cōstat fati⁹ em est debile par-
ticulā manere: q̄ hominē interire; vt ait
Auic. vbi supra, cui alludit Gal. 6. meth. c.
3. in fine quāuis interdū in bona tēperatu-

ra præditis, bona adhibita curatione, ali-
quādo in pristinam facultatē, præciso ner-
uō, mēbrū restitutiū viderim sectionis hu-
ius authores sunt, Galen. 3. method. cap.
9. & 6. c. 3. ac super lib. Hippo. de his quæ
in medicatrina fiunt cōm. 14. Paul. lib. 4.
c. 54. Razes. 13. cōtinentis. c. 6. atq; Auic.
dict. c. vbi neruū sic amputaueris, laquea-
ti futura cuius supra meminimus cōsfui-
to, hæc tñ in vulneris principio, antequā
recredefcat, fieri licebit in progressu ve-
ro, quū iā symptomata vrgēt, nulla; glutinā-
di vulneris spes superest nequaquā: cre-
scent em ipsa symptoma, sed ne vbi ner-
uū præcideris, retro ipse trahat⁹, fugiatq;
ad moliēdā statim futuram scindēdī, atq;
cōsueđi methodus (q̄ certe nec apud ali-
quē ex doctoribus legi, nec ea vtētē aliū
vidi, sed longa experiētia a me inuētā,
probatissimā, & vtilissimā scio) illa est,
traiecta acu per nerui partim incisi oras,
antequam ipsa acus cum filo prorsus ex-
trahat⁹, supra ipsam suppositā acū, neruū
præcidito, deinde acū extrahito, cui⁹ filo
neruū illaqueato sic em neruus (cum am-
putat⁹) minime retrocedet, hac tñ futura
in crassioribus nō in exilibus (præ illorū
tenuitate) vt poteris vbi aduertito hæc fu-
turā nō nisi primo vulnerata esse faciēdā
oborta em inflā matione poti⁹ noceret q̄
iuuaret reliqua curatione quæ aliorum vul-
nerum neruorum adhibenda erit.

C A P. XVIII.

De vulnerum neruorum se-
cundum rectitudinem, curatione.

*ED si vulnus iuxta nerui lēgi
tudinē factū sit: sola duorū ini-
teriorū deligatura curabis, vt do-
cet Gal. 3. meth. c. finali, ac. 3.*

*Sima curatio
in eo prorsus
amputat⁹
do consistit
& ratio.*

*Interdum in
bona tempe-
ratura præ-
ditis, bona
adhibita cu-
ratione præ-
ciso, neruus
in pristinam
facultatē
mēbrū re-
stituitur.*

*Sutura in
hoc vulne-
ris genere in
principio
postea con-
uenit & ra-
tio.*

*Novum fu-
turæ artifi-
cium ab au-
thore exco-
gitatū quo
sueudus ner-
uus.*

*Vbi præcidi-
tus minime
retrocedat,
quæ in cras-
sis non in te-
nibus vtē-
dam.*

*princip-
vulnere*

raduam fa-
cti, ore vt fu-
tura coeunt.

de cōpositione medicamētorū secundū genera cap. de vulneribus neruorum. vt enim dissidentis vulneris oris futura sic huiusmodi vulneribus deligatura (si re- cte admoueat) cōducit, curatio ad medi- camēta pertinēs: cōmunis est, cū alijs ner uorū vulneribus. Cāterum si (vt nō raro cōtingit) directū vulnus: partim obliquū sit, ob idq; per trāsuerfum neruus incida- tur, tunc curatio immediatē prācedenti cap. scripta cōpetit. Hoc discrimine obser uato, vt duplicata futura non supra vulne ris oras (vt aliās affolet) sed per latera per currat, sic vt vtrāq; partē carnis, & simul incisi nerui oras, simul cōprehendat, no- deturq; filiū, nō supra vulnus, Sed ad latus reliquam curationem vt in alijs neruo- rum vulneribus admoueto.

C A P. XIX.

De neruorum vulneribus cū carnis abolitione ipsorumq; extra vulnus prolapsu.

Multis mo-
dis nudari
neruos con-
tingit, &
quē sit curā
di methodo
obseruanda.



Rurifaria nudari à carne ner uū contingit, aut principio carne neruū operiente: telo amputata, aut curationis tra- ctu putrefactiōe aliq̃ oborta, atq; interdū ipsius nerui substantia dissecta, & qñque nerui ex toto p trāsuerfum incisi: extra vulnus prolabunt. Si carne telum neruos nudauerit: secundaria intentione (iam su peri scripta) curādos neminē latet, si pu- trefactio nascatur: eadē curatio est, nisi q̃ hic fortib⁹ abstergetibus (q̃ sensorijs spi- ritibus iā exhalatis, dolorē minime suspi- cemur) illic vero mitissimis, omnis acrimo- niæ expertibus (quod doloris atq; at- tractionis periculū impendeat) opus est, idq; & experiētia & à Guid. tract. 3. c. de neruo denudato probat, quārōne Gale. 6. meth. c. 3. ad fordē vulneris abluendā, non ficcis linamētis, sed mollissima lana,

Nudatis are-
lo neruis do-
loris atq; at-
tractionis pe-
riculū im-
pendet.

specillo circumuoluta tepenti sapa illita, deinde expressa vti iubet: quē aut accom- moda sint ad cōtusa vulnera medicamen- ta: in antidotario docebimus. Si extra vul- nus prolabant nerui: diuersa curationis ratio obseruāda, tūc enim calētibus pan- nis, vel gallina, vel palumbō per mediū viuo inciso, vulnere applicatis quod frige- facti nerui calfiant in suam sedem redu- cendi: atq; (vt diximus) cum carne con- fuēdi sunt, sed si his forsā adhuc reduci recusent: tūc cādētī ferramēto (citra car- nis contactū) subtiliter tīgātur, sic enim, frigiditate, & humore (quibus laxati pro- diere) igne cōsumptis: & cauteriū quasi lādētē rē fugiēdo retrocedēt, atq; reuer- tent, & certe species hāc vulneris (cū pro lapsu nerui, iā mihi se obtulit, q̃ nec apud antiquiores, nec recētiore legi, etsi Gui- donis nostri authoritas tract. 3. c. de ner- uo denudato, prācipiētis cauterio neruū tīgere: aliquo casu obseruanda est, nullo certe magis q̃ hoc: verū si admoto caute rio cōuerti neruus nequeat: cōsuto vulne re, dimittes inter puncta neruū illū quē (si nullo cefferit auxilio) prācidito, vul- nusq; secundaria intentione curato.

Prolapsi ex-
tra vulnus
nerui cura-
tio.

Cauterium
plapso ner-
uo, admotū
quo reduci-
tur: insigni-
ter iuuat,
quo casu in-
telligēda est
Guidonis au-
thoritas.

C A P. XX.

De neruorum & tendonum contusis vulneribus ab aere; offensis.



Ontusa & ab aere alterata neruorum, & tendonum vulnera, à reliquis trifariā differūt. Primum in futura: incisis namq; neruis, ac ten- donibus glutinatrix strictior istis verò la- xior (q̃ labiorū vulneris seruatrice ad tē- pus Guido vocat) adaptari debet. Secūdo (quod fere in idē recidit) in adaptāda de- ligatura, vt in p̃cisīs constrictiore duorū initiorum: in cōtuisis remissiore (quā ab ipso Guid. tract. 3. cap. vniuersali) medica- mento-

Cōtusa nec
uorum vul-
nera ab inci-
sistrifariam
differunt.

De Vulneribus neruorum.

119

mētorum retentrix nuncupatur vtamur. Tercio in medicamētis, incisa enim principio enēma, nempe coalescentia & exsiccantia expostulant, contusa, nequaquam, sed pus mouentia atq; poros dilatantia, hoc est digestionem, emundationem & tandem exsiccationem cuius differentia

Incisum simplex continui solutio est.

Contusum immedicatum impedit glutinationem quae in vulnere (vt vulnus est) semper procurari debet.

Omne contusum cum vulnere putrefieri debet in sanie conuerti necesse est. In contusis vulneribus quae medicamenta conueniant. Neruosa par ticula sic cior multo carne.

Natura par ticulae quod ad fieri possit semper obseruanda.

Fibularum sutura quādo & quā methodo vtendum.

Fibularum sutura.

ratio est, quod incisum, simplex continui solutio est, cui non alia complicatio adhaerescit contusum verò (praeter solutionem) alio complicatur, nempe ipsa contusione, quae immediatam impedit glutinationem in vulnere (vt vulnus est) semper procuranda, quia contusum omnecū vulnere, (auctore Hipp. lib. de vlcenibus ac de vulneribus capitis & ex omnium sententia) putrefieri, & in sanie conuerti necesse est, illud plane silentio non pretereundum, vt quauis neruorum contusa vulnera, per initia digerentibus, & saniem concitantibus egeant, aliter tamen atq; in carnosus vulneribus accommodanda, nam in his contusis, minus humida, putredinemq; inducentia conueniunt, nec adeo in eorum vsu demorandum, cum enim neruosa particulae (siccoris multo carne) semper (quoad fieri possit) natura obseruari debeat, fieret, vt (si aequae suppurares) maximam neruis putrefactio nem induceres quod ex Auerroe. 7. colligit. cap. de sol. cont. satis constat, Adhuc, si contusa vulnera vel sponte sua, vel multa sanie intus genita, vel calidis, & humidis plus quo ad motus praesidijs, dehiscant opere precium erit, fibularum futuram (quam vulgus plumacolorum vocat, apta administrare cuius notissima methodus est, eiusq; meminit Galen. 3. meth. cap. 4. & Cornel. lib. 5. c. de glutinatione vulnerum) ne tantus porus (impedimentum scilicet sensui & motui deferendis) in vulnere procreet, quod auxilium cōe etiā est incisis vulneribus, quā symptomatum causa dirupunt, curationē aut (ne fibulas inter-

curādū soluere cogaris) in hūc modum molire, per specillū perforatā cuspidē lintheolū lenissimū acu traicito, cuius priori sicca parte inter fibulas ducta, vulnus abstergito, Posteriori vero medicamento applicando illita intus relicta inungito alteramq; siccam partem praecidito vt si particulae contusio absq; exteriori vulnere contigerit, discutiētibus medicamētis vti decet, atq; pro virili cōcretū intus sanguinē phaliturum discuti & si adhuc renitens sit, leuibus praesidijs saniem mouentibus suppurari & praecociter ante perfectam suppurationem rescicare oportet (ne putrescant nerui) deinde ad emundantia, & sarcotica & exsiccantia medicamenta ocysime conuerti curationē necessum est.

Incisis etiā vulneribus cōpetit vbi symptomata causa dirumpuntur.

Si contusio citra externum vulnus contigerit.

CAP. XXI.

An organicum membrū ex toto praecisum glutinari valeat, & de futura retis.



ON alienum a proposito materia videtur, differere hic: an possibile sit, non solum amputatos neruos, venas, arterias, & ossa, sed totum organicū membrū ex toto praecisum glutinari nec vtraq; pars argumētis desit: p affirmatiua primū facit, qd excisas prorsus arbores alijs insertas coniungi atque copulari, copulataeque cōcrescere quoti die videmus, & a quibusdā, vt Auerr. 2. colliget atq; ab alijs affirmatū est animalū nō nulla vt spongiā marinā atque anguē disiecta cōiūgi, vel crescere: pterea Itali chirurgi p̄cisi nasi loco, ex admoto brachio alium plane substituunt. Contrariū tñ (praeter ipsam clarissimā experientia) & verius & lōge probabilius a Doctōribus cōfēt, p̄ertim a Gal. 3. artis medice, Trusiano ibidē cōm. 46. & Hah Rhodō in cōmentario eiusdē libri, atque Guidonis tract. 3. c. vniuersali & c. de vulnerib.

Praecisū ex toto membrū an possibile sit glutinari.

affirmatiue partis argumenta.

Primum argumentum.

Excisae arbores alijs insertae & coalescunt.

Secundū argumentum.

Sunt qui affirmant disiecta non-

Nulla anima
lia coniūgi.
Tertium ar
gumentum.
Itali chirur
gi cum ali
cui nā p
cidit ex bra
chio alium
substituunt.
Præcis or
ganici mem
bri impossi
bilis & gluti
natio & ra
tio.
Responso ad
primum ar
gumentum.

Secundi ar
gumentum re
sponso.

Brutorū for
ma ex mate
rie potētia
educitur.

Organicum
membrū cū
aīa ipsum in
formante cō
tinuatur ei
demq; spiri
tus & virtu
tem. Defert
et cum mē
brum præci
ditur infor
matio cessat
& glutinatio
est impossi
bilis.
Tertij argu
menti respo
sio.

naſi, huius potiffima ratio eſt quia præci
ſis ex toto poris, per quos nutrimentum,
ſenſus, & vita ipſi organico membro, de
ferebantur, ſpiritus, virtutes, atq; ipſa mē
bri vita (ob eorum eximiam ſubtilitatē
ac pororum raritudinem) continuo ex
tinguntur, & contrarijs argumentis faci
le reſpondetur: primò diſparem eſſe ra
tionem in plantis, vel arboribus, quarum
humor, atq; pori cū craſſiſſimi, & ſolidiſ
ſimi ſint, ſit, ut diſſecti ramī aut partes, hu
morem, ipſamq; vegetatiuam vitam mi
nime exhaleant quin potius diutiſſime re
tineant, & conſequenter, inſertus ramus
coaleſcat, at in homine (contraria ratio
ne) contrario contingit. Secundo argu
mento dicendum, nihil quidem (quod
ad conſolidationem pertinet) cōmune
cum cæteris animalibus hominem habe
re, nā (ut vulgatum axiomā eſt) brutorū
forma ex materiæ potētia educit̃, viſco
ſiorē præterea, & craſſiorem ſanguinem,
atq; denſiores poros habent, vnde ampu
tato bruti mēbro, poſſibilis eſt conſolida
tio, vel regeneratio, quæ cum in homine
ceſſent cuius pori, ſanguis & ſpiritus ſub
tiliſſimi ſunt: cōtinueturq; organicū mē
brū cū anima ipſum informantē, eidem
que ſpiritus, atq; virtutē deferat, quā pri
mū membrū abſcinditur: informatio illa
ceſſat, nec à naturali agente, cum vita mē
bri exhalata ſit, iterū induci pōt, ac per in
de glutinatio eſt impoſſibilis cū viuū cū
mortuo aglutinari nō poſſit. Tertij argu
mēti diuerſa etiā ratio eſt, ſiquidem quā
do ē brachio naſum componimus non à
mortuo, ſed à viuente mēbro: cum viuō
aglutinationē petimus, eidemq; os copu
lare laboramus, & ad locum abſciſi naſi
ipſumq; brachiū, ſpiritus, cruor, atq; vita
(ut nouā illā compaginē iuuent) cōcur
runt, quare reformatio huius cōtra ratio
nem non eſt, ſecus atq; in amputato pror
ſus mēbro, à corpore ſeparato ſpiritibus

ac ſanguine, & demū à vita deſtituto, nō
igit̃ deficit repugnantia medicinarū, ut
alirodoā, opinabat̃, ſed huc p̃inet explo
rare, quā nam ratione, aut methodo loc⁹
(à quo amputatū mēbrum diſceſſit) con
ſui (ut reliqua alia vulnera) valeat, & aſſi
dua experiētia, illā cōſuendi formā inue
ni (poſt vulnerationē) cōtractā carnē ver
ſus ptē ſuperiorē intētis virib⁹ verſ⁹ partē
inferiorē attraho ut quoad fieri poſſit vul
nus operiat̃, ac deinde cōſtrictō vinculo
ſuperiori vulneris parte, (ne cutis retro
iterū trahat̃) forti acu cęrato & contorto
filo, cutis oras in orbem conſuo, ſic ut cō
ſuta cutis quaſi clauſum maſcupium refe
rat, aliamq; de ſuper futurā (inſtar retis)
molior, ut merito retis futura à me voca
ri ſoleat, conſert hæc: tum ad ſanguinis
profluuiū his ſæuis vulneribus peculiarē
coercendum, tum ut operiente cute, ner
ui venæ, arteriæ, & præciſa oſſa à frigore
tueant̃, tum etiam ut (citra oſis expulſio
nem) breuius hominem medeamur: In
ſuperq; cauteria moleſtiſſima prohibēt.

C A P. XXII.

De neruorum & tendinum

attritione, & contorfione abſque
exteriore vulnere.



Ltra neruorū vulnera cōtinge
re etiā attritio atq; cōtorſio, (ei
tra vulnus) ſolent quemadmo
dum in athletis inquit Galen. 6. metho.
c. 3. cuius mali illa erit curatio, ſecta im
primis vena, bona adhibita victus rōne
(quæ apud Hipp. atq; Galen. ſemper pro
bono regimine in omnibus. 6. rebus non
naturalibus uſurpanē) conari debet me
dicus contortum membrum (ſi in articu
lis læſio conſiſtat) mitiſſime dirigere. Po
ſtea cataplaſma ex candido oui, & roſa
ceo, ac myrtinō oleo ſimul agitatis, com
miſto puluere roſarū & granorū myrti
affectæ particulæ calfactū admouere, de

Sutura quā
auſtor retis
vocat ab i
pſo inuenta
optima eſt,
ad conſuen
dum locum
vnde ampu
tatum ex to
to membrū
diſceſſit, &
quæ ſit futu
ræ huiusada
prandē me
thodus & v
tilitas.

Attritū, ac
contortine
ni vulneris
expertis, ca
ratio.

Cataplaſma
ad contortū
membrum.

inde

inde post triduū (mō nullū infestet symptomā) simili cataplasmate, modico olei camemælini, & pulueris manæ thuris ad dito, curationē iterabis, post hoc, medicamento quo vti præcepit Galen. citato loco, nēpe ex oxymelite, & fabacea farina (cui miscere soleo non absq; insigni vtilitate, florū camemæli puluere) nec interea obliuiscaris rosacei olei & aliorū quæ inflammationē arcere solēt in superiori lā si mēbri parte, post septimū diem citra inflammationis suspitionē super affectā partem medicamento ex melle, & myrtino syrupo pari portione mixtis, & ad crassiciē feruefactis illinies: sparso & desuper olibani, myrti, rosarum, atque camemæli puluere, & dolore non repugnāte, stupis & aptā deligatura admotis, sic p aliquot dies ægrotantē finito, cum aut cataplasma

Galenī medicamentum ad idem.

Aqua vitæ post extractum cataplasma.

Aliud cataplasma ad membri duriciem, vel articuli motus difficultatem.

Fugientiū tū q̄ reipub. p̄stis vulgares homines, & vetulæ luxatoriam artē temere exercentes.

ma sponte sua amoueā aqua vitæ in ampulla vitrea cæra opta calfacta, membrū irrigandū est. Tum ad membri corroborationē, tum etiam vt si qua infarta materies supersit, per halitū discutiat, vltimo, particulā vngueto dialtheæ calido, camemælino puluere atque cōmixtis perungito. Cæterū si duricies vllavel articuli motus difficultas māserit, aliud cataplasma ex virētis altheæ corticibus & dactylis simul incoctis & pistatis, puluere bde lij & lapdani, æqua portioe cōmixtis admoueto reliqua quæ huc pertinet à 24. capit. petenda sunt. Sed hic nō possum non aduertere, & Reipub. cōsulere vt tanquā ipsi pestē fugiāt, vulgares quosdā hoies & perfricta fronte vetulas luxatoreā artē inuerecundē sibi vendicātes q̄ cataplasmata vulgo bizmas luxatis, ac contritis mēbris fortissimē admouētes & manib⁹ crudeliter mēbra fricantes ipsa emortua atque sine vita reddūt sæpe quæ ægrotantes misere interimūt, quæ demētia vsque adeo inualuit, vt vix sit q̄ persuaderi possit, o sī ū fracturas, & articularū disloca-

tiōes ad chirurgū pertinere, sed istos accerseūt ac si Hippocrates, Galenus & alij. q̄ tanta volumina, de articulis, de fracturis, & dislocationibus scripsere tanta artificia machinati sunt his solis, nec medicis scripserint & insudauerint, deplorādum quidē cū alijs medicinæ calamitatibus.

CAP. XXIII.

De instaurandis mēbris, quæ post neruorum vulnerum coalescentiam imbecilla supersunt.

POST neruorum vulnerum agglutinationē, nō rarō mēbra ipsa imbecilla manent: cui malo qua rōne succurratur, quæ me, & ratio, & longa experiētia docuēre, explanare hic non inutile videtur. Et præmittere oportet, bifariā imbecilla mēbra à vulneratione reddi: aut nimio callo inter vulneris oras genito (cuius duricie, & magnitudine dissidētib⁹ inter se neruis, aīalis spiritus à cerebro pagat, senforiā, arque motiū p neruos deferēs virtutē, ad affectā partē irradiare nequit) aut ob pcedentes suppuratas inflammationes. Ergo si callus in causa sit, emollientiū herbarū decocto, membrum crebro fouendū: deinde plūbea bractea cū constringente deligatura admouēda est, Quæ ne dilabatur, sed constanter particulæ cohæreat, tenaci emplastro, cuius oræ bractææ orbem excedant, firmabitur. Fiet hinc, vt calli excessus cōpressionē extenuetur. Ad idem etiam confert pyritis lapidis igniti ex acerrimo aceto ad ignem, vel ardentem solem suffitus, aut si Pyritis copia non suppetat, molaris lapidis, non statim à prædio, vel cœna modò prius callum oleo ex lateribus illinias. Post aliquot dies calētibus lauacris, q̄bus leniendi, & discutiendi vis insit, fouendus, & illiniēdus callus est: postea fle

Bifariā mēbra imbecilla sunt.

pagati

Curatio mēbri ob nimium callū imbecilli.

Pyritis lapidis ignitis suffitus.

Plumbeum
globum ma-
nu gestare.

Quādo alia
prædicia va-
na sunt calli
excessus am-
putandus.

Chyrothe-
ca lenienti-
bus vnguen-
tis illita con-
fert & qua-
liter cavien-
dum.

stendū, atque extendendū membrū, & prædicta bractea alternatim vtendū: tan-
dē ad cōsuetā opera reducendū: adde nō
parū conducere, si in manu, aut brachio
vulnus cōsistat, plumbeū globū pānis in-
uolutū manu gestare. Conetur etiā pon-
dus aliquod eleuare: sed si ob medicifor-
san incuriā, vel vberiorē cibū, vsque adeo
callus increuerit, vt hæc auxiliāna sint,
calli excessum abscindere, & tractos re-
tro neruos sedulō perquirere, atq; laqueali
futura, de qua superi⁹, & cōi curatiōe vul-
neri mederi cogendi sumus, vt nonnunq̃
coactus feci. Adhæc, si callus nō insignis,
sed mediocris sit, q̃ aīales spūs facilius ir-
radiare possint, p̃sidijs de q̃bus in antido-
tario sigillatim, tractabimus, callū ex te-
nuabis: sed cauendū est, ne cū illis præ-
sidijs vtaris, intēperies calida membrum
occupet, qđ vehemēter, & fricāre, & fle-
ctere, tunc tēporis curabis. Demum vn-
guentū ex adipibus, vel alijs de quibus in
ipso antidotario per vngito, hæc securi⁹
multō ætate, qđ hyeme in vsu sunt, pla-
nē hiberno tpe sepatia emplastra, vt mi-
nus humida, ad idē accōmodatiora sunt,
de his oībus plenissimē in nro antidota-
rio. Interdum in manū globū ex dictis se-
patijs emplastris mittere, deligaturaque
ipsam manū clausam constringere: inter-
dū emplastrū ipsum ad extensam manū
deligatura applicare operæpretium erit:
deinde oleo ex lateribus, vel ex therebin-
thina membrū fouendū est. Denique oīa
alia cōferūt, quæ ad iuncturarū duricies à
doctoribus tradunt. Illud tñ cōmēdatiōe
dignū aduertito quod nō paucis salutare
fuit, vt nimirū, cui manus debilis sit, leniē-
tibus vnguētis, antidotario describendis
illitā chirothecā gesserit: cui⁹ digitis habe-
re consuant. Quibus nunc inflexi digi-
ti, & manus, ad brachiū colligēt: nunc
contra colligatis habenis, extēdant. Si ve-
rò ab inflāmatiōibus imbecillitas cōtra

cta sit, intentū totum erit, membrū corro-
borare: corroborabis cōfortantiū herba-
rum decocto, aliquali frictione in mem-
bro postea facta atque arietino, vaccino,
aut hircino sanguine p̃ sublimatoriū sæ-
pius instillato. Cōferre etiā nō parū scio,
manū, aut pedem inualidū aqua vitæ cal-
facta cui instillatiōis tpe Cinamomum,
costū, & Euphorbiū pari portione com-
mixta fuerint, addito postea ambaris gri-
sij, & muschi momento, manū, aut pedē
inualidū lauare, planē, haud parū etiam
pderit, brachio, aut cruri, vulturis, aut vul-
pis pellem adaptare. Ad idem mirē iuuat
quauis ex causa membrū infirmū sit, qñ
iugulant boues in ipsum iugulū mittere,
vsq; dum sanguinis calor remittat: dein-
de calentibus pannis obuoluere. Rursus
ad idem chirothecā muscho, & ambare
grisio interi⁹, exteri⁹que imbutam vul-
pini olei guttulis commixtis gestare.

Membris ob
prædictes
suppuratas
inflamma-
tiones debi-
lis curatio.

Vulturis,
aut vulpis
pellis mem-
bro adaptā-
da.

In iugulem
bouis manū
aut pedē in-
ualidū mit-
tere salubre.
Chirotheca
ambare gri-
sio, & mu-
scho imbu-
tam gestare
perutile.

CAP. XXIII.

Cur inualida infirma, atque
macilentia à vulneratione, nec non para-
lysi affecta membra, sensus, & mo-
tus interdum expertia: non
corrumpantur.



AVD immeritō quisquā dubi-
tare poterit qđ in causa sit quo-
minus infirma à vulneratione
membra, iteq; paralyti affecta sensu, & mo-
tu interdū carentia non corrumpant. Cō-
trarium em̃ illud suadebat, quod in hmōi
affectibus ea mala versent, quæ emortuū
membrū reddere solēt, aīalis, scilicet, spi-
ritus, sensum, & motū particulis deferen-
tis, impedimentū, & ipsius mēbri tēpera-
turæ hebetatio, atque compositionis, seu
harmoniz euersio. Hæc em̃ mēbrū cor-
rumpere plus qđ manifestū est, vt Auice.
Fen. 3. 4. tract. 1. ca. de esthiomēno docet.
Sed ratio quidem illa esse potest, qđ est

Inualida à
vulneratione
membra, &
paralyti af-
fecta, cum nō
corrumpantur.

Argumen-
tum.

Solutio.
natiuus

De vulneribus neruorum.

123

natiuus calor hoc in affectu remittatur, superfit tamen aliquis calor ad vitam conseruandam secundum particulæ exigentiam non insufficiens. Huiusmodi enim infirma membra ad sui conseruationem, spiritu duntaxat vitali, & naturali per venas, & arterias, à corde, & hepate deriuatis, non autem animali per neruos indigent. Quo fit, vt sine vitali, & naturali non si animalis desit, corrumpantur, vt aperte plantæ ostendunt: quæ nutritiua tantum vita vigent, & à putrefactione tuentur. Exemplo etiam sunt ossa, quibus sensus deest, quæ tamen per nutrimentum, vitæ expertia non sunt. At cum gangrena membra emoriuntur, omni vita, omni naturali, vitali, & animali spiritu destitui, certum est. Quæ si scalpello aperias, nec sentiant, nec cruor aliquis effluat, & quandoque non amputata per se decedant. Sed aduersus hanc nostram respon-

abscessus neruus cum altera abscessa parte retro iam tracta, nec parum distante, glutinetur) impedimento est. Quare spiritus ipse animalis per alios meatus diffusus nullam operam membri functionibus afferre potest, aliter atque in venis, & arterijs præcisus, quæ cū caua, ac veluti canicularia corpora sint, quibus ipse carnosus callus, sanguine assidue fluente, veluti spiritus vehiculo, ad præcisâ vasa transmissio, gignitur, vnde naturalis, & vitalis spiritus per sanguinis canales vehitur. Nec à callo impeditur, atque consequenter quauis animalis transire nequeat, & viuunt, & nutritur membrum. Tertiò, quia venarum, & artiarum cū maxima propagatio fit, quæ in multos ramos dispergitur, etsi præcipue venæ, & arteriæ præcendantur, ab alijs iuuari membrum poterit, quod in neruis secus est, quorum non tanta est propagatio. Verum in paralesi, quæ sensus, & motus expers membrum minimè corrumpitur, diuersa ratio est. Siquidem in ea callus non est, cuius duricie animales spiritus, vt in vulnerato impediuntur, sed vel spinalis medullæ (neruorum originis) læsio, vel crassioris materiæ membro infartæ obstructio, vel ingens resoluti membri frigus. Ex eo ergo membra non corrumpuntur quod vitalis, & naturalis spiritus transitus minimè impeditur.

C A P. XXV.

De neruorum abscessibus, seu inflammationibus.

SOLENT vulneratis neruis inflammationes, vel à materiæ calidæ simpliciter, vel præ dominantis, de fluxu, oboriri: quæ ex

Ossa sensu carent per se, sed vitæ expertia non sunt, galid tamen. Cū gangrena membra inuadit, omni vita destituantur, & quandoque per se decedunt. Obiectio.

Simulcum sanguine.

Prima responsio.

Natura semper membra nutrire, & in corrupta conseruare conatur.

Secunda responsio.

Callos spirituum transitum, & ne-

abscessus nerui interfectio hærent impedit.

Venæ, & arteriæ, cæcæ, & veluti canicularia sunt, quibus abscessus admittitur, callos creatur.

Tertia responsio. Venæ, & arteriæ in plures ramos disperguntur, nerui non in tantos.

Quæ impediunt animales spiritus in paralesi.

Cor paralesi affecta membra non corrumpuntur.

Inflammationes, à quibus causis præcedant neruis, & earum natura.

Anodina, vellargē repellentia ad neruorū abſceſſus conueniunt.

Propria repellentia abſceſſibus non conueniunt, niſi à vulnere diſtet inflammatio.

Putrefactia neruorū abſceſſibus incommoda ſunt.

Temperata admodū ſunt.

Rofaceum oleum dolo rem ſedat.

Lumbricorum oleum ad neruorū abſceſſus optimū.

Super halitum diſcuti inflammatio non poſſit, ſuppuratio leuibus vtiendam, alijs medicamentis, & euacuationibus diſmiſſis.

Euacuationes materiam non diſcutiunt, neque ſuppuratiōem demorant, & euacuationibus diſmiſſis.

quæ ex dolore, & præter naturalem habitum tumore, principio palam ſunt.

His vbi (vniuerſalibus documentis, de quibus ſuperius corpus euacuaueris) anodina, vellargē repellentia præſidia conueniunt: proprijs nanque repellentibus (ne ipſi nerui temperatura frigidi magis offendantur) minimè vtendum, niſi à vulnere inflammatio diſtet. Tunc enim (niſi aliud diſſuadeat (non in com- moda ſunt. Putrefactia rursus (vt aliàs admonui) infeſtiſſima ſunt. Ergo temperata anodina admouenda ſunt, quale erit rofaceum oleum, quod ſymmetrium eſt, temperamentum non excedens, dolorem enim ſedat, atque ab humorum fluxione membrum tuetur.

Quadrat etiam lumbricorum oleum, ad vulneratos neruos, nunquam ſatis laudatum. Hæc cum oui candido agitata, applicanda ſunt. Conferunt denique emplaſtra quæ vltimo capit. deſcribuntur. Reliqua curatio communis eſt cum aliarum inflammationum curatione, quæ per inſenſile diſſutū diſcutiuntur. Plane ſi per halitum diſcuti inflammatio non poſſit, leuibus ſuppuratorijs (omnibus medicamentis alijs, & alui ſolutione, atque ſanguinis miſſione relictis) vtendum eſt. Nanque huiusmodi euacuationes non ſolū materiam non diſcutiunt, ſed ſuppurationem demorantur quia ex halatis cum ſanguine ſpiritibus inflammatio reſcruſcit. Cui, ob ſimilem rationem, alludere videtur Auicē. Fen. 10. tertij. tracta. 1. ca. ſecundo. de pleureſi dum inquit (& cum phlebothomas, & euacuas, & non ſedantur accidentia ſcias, quòd prohibitio collectionis quam quæris eſt impoſſibilis: Non ergo iteris phlebothomiam, ne congeletur materia quæ habitura eſt collectionem. Ergo vbi ſuppuratam eſſe inflammationem cognoueris quàm primum ad apertionem pro-

perabis: deinde vt reliqua vlcera curabis. In inflammationis tamen ſuppuratiōe, & apertione tria ſummopere ſunt obſeruanda: primum, vt ſuppuratoria ſimplicia veluti matux, athea, lini ſemen, & ſimilia: Ex quibus conſtant emplaſtra, quæ ad hoc componuntur: non ex aqua, vt alias ſolent, ſed ex vino, atque lixiuio incoquantur, vt putrefacien- di vis, quam retinent, quæ neruis noceret remittatur. Alludit ad hoc Auicē. Fen. 4. quarti. tracta. quarto. capit. de vulneribus neruorum. Et iam à peritioribus chirurgis in vſu eſſe ſcio. Secundū vt præcociter apertio inflammationis fiat, ne puris nimia mora neruos offendar, vt docet Auicē. Fen. tertij. quarti. capit. 27. & communis eſt omnium ſententia. Nec te in contrarium moueat Cornelij. Celſi authoritas libr. ſeptimo. capi. ſecundo. de his quæ per ſe intumescunt, dum ait: Sed cætera etiam ſub cruda aperiri poſſunt: inter neruos verò vltima maturitas expectanda eſt, quæ cutem extenuet, eiꝫ pus iungat, quo proprius reperiatur. Nam doctrina Cornelij alias doctiſſimi omni quidem ratione in hoc deſtituitur: cum ei contrarij ſint reliqui authores. Tertium, vt ſi forſan abſceſſus materies eoꝝq; lenta, mucoſa, ac tenax, nonnulla flatuoſitate commixta ſit, quæ tactui parū respondeat, duplici deligatura membrum deuinciatur: altera ſuperiori loco, altera inferiori. Sic enim cōpreſſione facilè materiei inundationem percipies. Illud tamen perpetuè commendationis dignum eſt (quod cum magna laborantium vtilitate expertuſum) vt ſcilicet linamentum non integro capite, ſed ſerè abſciſo in apertione indatur: Si enim integrum caput eſſet, vt medicorum vulgus facere ſolet, facilè ipſo materia, vel pus operiretur, nec effluxioni puris locus eſſet, & retento

In abſceſſus ſuppuratiōe, & apertione obſeruanda nota digniſſima.

Cornelij reprehendit.

In curandis abſceſſibus linamento non integri ſed penè abſciſi capitis vtendum.

retento

retento pure partes internæ corrumpentur. Cum ergo linamentum diminuti capitis intromiseris torundam aliam tenuem inter apertum locum, & ipsum linamentum immitas, quò exitui puris amplior locus reddatur, quæ tamen statim abijcienda est. Reliquas alias apertio nis communes conditiones quæ septem à Guidone tractatu. 2. capi. vniuersali, & ab alijs authoribus connumerantur, obseruabis.

Septem apertio nis con ditiones ob seruandæ.

CAP. XXVI.

Antidotarius vulnerum, & aliorum affectuum neruorum.



Dvulnera, & alios neruorum affectus, simplicia & composita medicamenta, quæ à varijs Doctorib⁹ traduntur, & me longa experientia docuit, hoc in capite explananda propono. Simplicia igitur calidæ, & sicce temperaturæ tenuium partium acrimoniæ expertia sunt. Vt ex Galeni sententia. 6. metho. cap. 2. Pauli libr. 4. capit. 54. Auicennæ Fen. 4. 4. tract. 4. c. 3. de medicinis vulnerum neruorum satis constat. Sed neque id perpetuum est. Nam secundum temporum, & symptomatum vicissitudines huiusmodi præsidia, vel mutantur, vel præponuntur, aut postponuntur. Exempli gratia in cæca nerui punctura, cuius si medicamentum calidum, exsiccans, subtile, prodest, non tamen semper: sed ita demum si attractiuam virtutem retineat, atq; stipticitate careat. De quo latius capit. de nerui punctura differui mus. Sic etiam à contundente telo illato vulnere calida, & sicca medicamenta illi coadmoti incommoda essent: cum huiusmodi vulnus: emollientia, & partius

suppurantia potius expostulent. Idem in in vulneribus contusis, quæ & dolor, & inflammatio simul comitantur: cum hæc ad leuem saltim digestionem perducere conemur. Ergo documētum hoc in simplici vulnere non symptomatis vllis complicato à laborantis particulæ natura indicatione sumpta vsurpandum est. Calidæ temperaturæ necessaria esse præsidia ex eo dixi, quòd nerui calore maximè iuuentur, cuius proprius est, quàm frigoris, dolorem sedare, extraneumque humorem omnivulneri peculiarem pellere potissimum cum nerui quamprimum vulnerantur ambientis aeris frigore offendantur: Licet enim secundum naturam frigida membra frigidis conseruetur: ex quo Galenus tertio. Artis medicæ. Similia, inquit, similibus offeres, si volueris conseruare corporis crasim, Id tamen in sano corpore, non infirmo intelligendum est. Vnde affectis neruis suæ temperaturæ similia nocerent. Vt Galen. eodem loco asseuerat, dum air: & læduntur à similibus suæ crasi, iuuantur verò à contrarijs, moderato vsu, & ne Gale. pugnare videatur cum superiore textus hic de curatione, ibi verò de conseruatione intelligendus est. Ex igitur etiam, vt medicamenta sicce sint temperaturæ: Quòd ficitas humiditati, qua fauciati nerui infestari solent, opponitur. Sed quia in qua libet affectione membri natura conseruanda, contrariaq; repudianda est, vt multis locis methodi rectè admonet Galen. neruis ipsa carne ficcioribus ficciora medicamenta conueniunt: quæ primariæ substantiæ nerui callum ad similem desuper generent: Sicciora enim ficcioribus adhibere oportet ex Galen. Artis medicæ. 3. Nam ficitate ipsa membri natura conseruatur. Imò ficciora ipso neruo admo uenda sunt præsidia: vt ficitatis excessus ille, præternaturam affectum, hoc est, vul neris

Cur calidæ temperato ræ conueniāt præsidia.

infirmo //

Galeni textus interpretatur.

Simplicia calidæ, & sicce temperaturæ, tenuium partium, & acrimoniæ expertia, quibus vulneribus conueniant, & qui bus non.

neris humorem, consumat, iuxta Galeni sententiam. 3. Meth. capi. 3. vbi exemplo illo thuris, à se, & ab alijs tantopere decantato, vitur: quod scilicet thus sicca corpora humectet, humida exsiccat: Idē que euenit in alijs eiusdem siccitatis gradibus medicaminib⁹. Cuius ratio illa est, quod thus respectu corporis, aut membri temperati primum siccitatis gradum sortitur. Quare præterq^u q^u humidorum corporum naturalem temperaturam ad seruat: siccitate sua parū superante mēbri excrementa, quæ carnis consolidationem impediunt, consumit: contrā in ficcis corporibus, in quibus cum naturalem membri temperaturam minimè cōseruet, humens redditur. Humorem quidem exsiccare ineptū, sed concitare saniem aptissimum. Hinc rectè sanè Razes inquit: in vlceribus in quibus thus carnem producit Aristolochia eisdem saniem concitat, atque ē diuerso. Quod ante Razem tradidit Gal. 3. meth. c. 2. & 3. Quæ quidē differentia, non passiuus solum, sed actiuus etiam à temperamento parum secedentibus qualitatibus, cōparata est, vt Gal. 2. de simpli. medi. c. 27. ostēdit. vbi de rosaceo oleo scribit, refrigerata corpora, aut membra calfacere, calfacta infrigidare. Nam temperatum cum sit, vtriūque extremi particeps fit. Sed circa Aristolochiam, de qua nuper sermo erat illud ad praxim satis necessarium summè, aduertito: duplicem reperiri, rotundam, & longam: sed rotundam quidem multò efficaciorē, quā in ficcioribus corporibus, & particulis, secundum corporum differentiam vt oportet: in alijs minus ficcis, longa. Quod ex Galeno lib. 6. de simplici medicina colligitur, quem Paulus, & Aetius imitantur. Nec solum in medicamentis secundum corporum discrimina, diuersi contingunt effectus: sed in ipso etiā vniuersalissimo agente, sole. Nanque ali-

ter in nubem raram: aliter in stipatam, & spissam operatur, diuersos colores, & figuras fingens. Hic salem exsiccat & luminum: picem, & cæram liquefacit: faciem nigram reddit: Lineum pannum dealbat. Hinc Auerroes. 7. collectaneorum. Galenum. 6. methodi prope finem imitatus, asserit, aurium vlcera aceto sanescere, magna verò trociscis ex calce, vel scoria ferri aceto cōmixta, quæquidem alia non adeò sicca membra corroderēt. Imo idem Auerroes. 7. colliget, tractatu de cura solutionis continuitatis probat, in quibusdam corporibus valde ficcis nō esse impossibile viride aris carnis esse productiuum. Vnde non abs re eodem loco inquit: Cum membrum naturaliter siccum ad humiditatem humidi peruenit membri à sua natura nimis est elongatum, & propterea eget exsiccatuius in eo gradu ad quem peruenit membrum istud versus humiditatem. Nam medicina non sanant nisi quando sunt in contrario distemperatē, in eodem gradu, in quo membrum est distemperatum. Itaque si distemperatum fuerit in secundo gradu humiditatis, necessariū est, vt medicina distemperata sit in secundo gradu siccitatis, & parū plus & statim subdit: & scias quod quando vlcera non sanantur propter adhibitas medicinas, illud fit vna trium rerum: aut quia membri cōplexioni conueniētes non sunt: aut quia materia, quæ transmittitur, conuenibilis non est: aut quia membri complexio læsa est, eo quod ibi vna, vel plures species malæ complexionis sunt. Ergo scire debes quod vlceris sanatio, aut sit corporis euacuatione, aut temperamento complexionis, vel plagæ debita exsiccatione. Haftenus ille. Ergo vt rectè medicus medicinam exerceat naturæ, & medicamentorum differentias callere oportet, vt pulchro exēplo ostēdit Gal. 6. meth. c. 2. vbi ait. Ex

Solis variæ
operatiōes.

Aurium vlcera aceto
sanescunt:
magna ta-
men troci-
scis ex cal-
ce, aceto, &
scoria ferri.

Viride aris
carnem pro-
ducit ex A-
uerroes.

Thuris con-
ditio.

Rosacei o-
lei qualitas.

Aristolochia duplex

Medicus na-
turæ, & me-
dicaminum
differentias
cognoscere
tenetur.

127

Terebinthi
na ab Auc.
laudatur.

Myrrha.
Sarcocolla.
Propolis.
Thuris co-
rex.
Aristolo-
chia euphe-
bium.
Cyrenaica
lachryma.
Serapinum
: & Affa fo-
da
Euphorbij
vites quan-
diu duren-
Discrimen
euphorbij
veteris &
centis.

dicax

Sulphur.
A. Eris, & ferri
scoria
chryfocolla

dicax est, linguæ penè adhærescens: vetus contrà. Sulphur, scoria æris, & ferri. Chryfocolla, vulgò, aurigluten, Hispano sermone, borra, siccissima sunt. Simplicia hæc medicamenta materies quidem sunt compositorum: alijs alijs commixtis, pro vulneris, & particulæ exigentia. Connectamur nunc prædictis composita præfidia, & primò quæ sedandi doloris vim retinent: illa sunt, irinum camæmellinum, lutea ouorum, rosaceum completum, omphacinum & lumbricorum oleum. Sed lumbrici ætate acetohyeme verò vino suffocandi sunt. Ad idem præstat antiquum commune oleû, & ex terebinthina, Balsaminum, & sabinum, quod duplex esse potest: aut Sabine regionis, vel arboris huius nominis, cuius meminit Mesue, cum de oleis tractaret cuius loco sambucini substituere poteris. Ad idem valet euphorbij, & ex late ribus oleum. Ex his oleis ea quidem, quæ tenuium partium sunt nervi puncturæ, membrisque, quæ post vulneris glutinationem inualida, & imbecilla supersunt, accommodantur.

um sabinum duplex
; vel ex Berber seu
sabe sabinæ, vel ex
gione

Que habet
facultatem
glutinandi.

Glutinandi facultatem habent vnguentum ex vermibus: cuius compositionem describit Guido tracta. 3. capi. de incisione nervorum. Vnguentum gummi iuniperi. Cuius hæc est compositio. R. Gummi iuniperi, corticum thuris, sarcocollæ, myrrhæ, singulorum drachmas tres, & semis, masthici, drachm. vj. cæx. vaci. j. & semis. terebinthinæ selectæ albo vino lotæ vnci. v. pulueris lumbricorû. vnci. j. fiat vnguentum, quod postea manibus aqua vitæ madefactis subigatur. Sed aduerendum est huiusmodi vnguentum auctorores, de Sandarachavocare solitos esse iuniperum gummi sandaracham appellantes. Non igitur intelligas aurum pigmentum, quod à Græcis sandaracha dicitur: quo nihil fructius, nec glutinando vul-

Aduersio.

neri contrarius esse posset. Quem errorem tempestate mea, pharmacopola qui dam, nisi ego occurrissem, iam incidebat. Vnguentum hoc principio vbi nulla distorquent symptomata insigniter glutinandis vulneribus prodest. Ad idem eadem obseruata lege valet vnguentum ex colla, quod sic componitur. R. collæ minutæ albo vino optimo ^{veteris} per diem infusæ: deinde lento igne ad vini penè consumptionem incoctæ advnguenti formam redactæ, Adde terebinthinæ candidissimæ vnci. ij. olei rosacei, omphacini, hypericonis olei, masthici, singulorum vnci. sem. cum quibus vehementer agitetur, & cum ab igne separaueris commisce pulueris corticum thuris, masthici, lumbricorum, radice vtriusque consolidæ, centauræ, cuiusque drachm. sem. crebra agitatione commiscendo, vnguentum ex omnibus astruito. Sed si adhuc grandioris exsiccationis medicamenta exoptas sicciore nempe temperaturis, vnguento sine oleis dupla terebinthina ex beto addita, paucoque euphorbij puluere commixto, atque manibus hypericonis oleo perunctis, postquam ab igne separaueris subacto, ut caronti formam referat, vt ere. Ad idem Recip. collæ minutæ vnci. iij. quam in ampullâ aqua vitæ plenam immittito, ore massa occluso: sicque per triduum finito: postea in aliam ampullam excollata vt ere. Alia aqua ex colla ad idem sic construitur. Recip. Collæ valde comminutæ optimi antiqui vini albi lib. ij. in quo centaureæ, & vtriusque consolidæ ana. P. j. efferbuerint, terebinthinæ clarissimæ, ex beto vnci. viij. pulueris bistortæ, myrrhæ, aloes, corticum thuris. ana. drach. vj. omnibus cum vino commixtis, & per triduum sic dimisis, per sublimatorium insillentur. Poteris etiâ loco vini aqua vitæ uti: quâ Arnaldus à Villanoua, & alij tradunt ad

Aliud ad idem.

Vnguentum ex colla.

Aqua excollata ad idem.

recentia

recentia glutinanda vulnera plurimum valere, & hæc quidem vnguenta, & aque ex colla ad vulnerum glutinationem præter experimentum, nec ratione, nec auctoritate destituuntur. Ratio illa est: quod huiusmodi medicamina maximam glutinandi vim natura sua sortiuntur, ob maximam, scilicet, similitudinem, quam cum vulneratis neruosis particulis habent: cum ex neruis, & animalium corijs colla ipsa confert. Quæ ratione non solum ad glutinanda vulnera doctores exterius colla vtuntur, verum etiam ad tenaciorem scaroidem callum generandum, Arietinam, aut hædinam depilatam, & valde incoctam pellem, quæ ipsius collæ materies est, edere iubent, vt Auicēna. 4. 1. cap. de medicatione solutionis continuitatis, & 5. 4. cap. de curatione restituti, & conferre collam exterius ad motam, siue ex piscibus, siue extergeribus confert glutinādis vulneribus, probat ipse Auicēna. 2. canonis cap. de colla, atq; 4. 4. cap. de nascentia carnis in vlceribus. Accedit, quod emplastrum, quod cōtra rupturam (vbi glutinare neruofum peritonæum, totum intentum est) componitur potissimum ex Arietini capitis glutinosa pellicula decocta, ~~et~~.

Oleum Ap-
partij.

Nec reticere volui inter glutinantia præsidia, oleum illud Apparitij, empirici hominis per totam Hispaniam celebratum: quod (nisi ille sine defectu ad vulnera omnia, nullaq; obseruata victus ratione eo vteretur) negari certe non potest, quin glutinandis neruorum, & alijs vulneribus primaria intentione, insigniter præstaret. Sed si nec victus, nec vulnorum discriminum, nec symptomatum ratio habenda esset, maximum quidem arbitror delirium oleo illo curare: Ipsius illa est compositio R. hypericonis lib. semis. Valerianæ, cardi benedicti virentium. ana vncij. ij. his comminutis in li-

bras duas vini albi veteris optimi per diē infusis, excolatis, & expressis, addatur veteris olei lib. iij. tritici pugillus. j. ferueant lento igne, vsq; ad vini consumptionem, & vbi ab igne separaueris, addito terebinthinæ ex beto, vel communis libram. j. & iterum donec rectè commisceantur, ferueant, & separatis ab igne adde thuris optimi in pollinem redacti vncij. iij. cum quo iterum paululum ad vnam ebullitionem ferueant, & in vitrea ampulla cōseruato. Hoc etiam oleum ad lateralia incisa capitis vulnera, quæ futura facta primaria intentione glutinare procuramus insigni intervalere scio. Sed si primaria hac intentione ob varias causas vulnus minime glutinetur secundaria. aggredienda est: quæ digestionē, emundationē, carnis productionē, atq; exsiccationē comparatur, vbi nimirum contusa, aut ab aere nimis alterata, vel inflammatione affecta vulnera sunt.

Digerentia, seu pus mouentia sunt: vnguentum ex terebinthinā, & ouorum vitellis, gummoso thure, puluere lumbri corum æque mixtis crocei momento addito. Vnguentum basilicon minus, & alia huiusmodi. Aliud ad idem R. vnguenti basiliconis maioris vncij. iij. terebinthinæ vncij. j. euphorbij vncij. semis. commixtis omr.ibus, & agitatis, felle porcino addito, vnguentum compone.

Pus leniter emundat vnguentū illud. R. Rosacei mellis vncij. iij. terebinthinæ vncij. j. farinæ hordeaceæ. vncij. iij. misce. Emundat præterea, & carnem alit, magistrale hoc vnguentum. Recip. Rosacei excolati mellis vncij. iij. terebinthinæ ex beto vncij. j. Resinæ pineæ vncij. iij. inellis centaureæ vncij. semis. Aquæ vitæ vncij. j. farinæ hordei, atq; fabaceæ, mastichæ, corticum oliuani, myrrhæ, sarcocollæ, gummi, mirobalanorum citrinorum vniuscuiusque vncij. semis. in pollinem redactis,

Pus mouentia.

Pus emundans vnguentum.

Aliud vnguentū pus emundans, & carnem alens.

daſtis, quæ redigi poſſunt, vnguentum componito, cuius alia parte, addendo roſaceum mel, liquidiori reddita, ad intingenda, interius indenda linamenta, vti ſoſleo, alia ſolidiora facta, cæra, & oleo maſtichino additis ad vngendum pannum exterius applicandum.

Exſiccantia, multo pure in vlcere exiſtente, illa ſunt Recip. Olei roſacei omphacini, olei myrthini, ſingulorum vnci. iij. vini albi optimi in quo roſæ, myrthi grana, lauri baccæ, balaſtium efferuuerint, atq; chalybis candentes laminæ extinctæ fuerint vnci. viij. omnibus feruefactis ad vini conſumptionem, reſinæ, & terebinthinæ ana. vnci. ij. pulueris corticum mirobalanorum citrinorum lithargyrii Antimonij, pulueris nucû cupreſſi in polinē redactorû, cuiuſque dragm. iij. cum cæra, quæ ad coagulandû ſufficiat, fiat vnguentum. Ad idem vinum ſtypticum, quod & ad abluenda vlcera præſtat, conſtat ex olæaſtri, aut oliuæ, & lauri ramulis, cum ipſius lauri baccis rore marino cum floribus, centaurea chamæpithy de lumbricis, roſis cum capitibus, camæmello, cuiuſque pugillo ſemis omnibus contuſis, & ex tribus albi vini veteris libris viſque ad mediij conſumptionem feruefactis, excolaris, atque expreſſis fiat decoctum.

Aliud ad idem. Ad idem emplaſtrum triapharmacû Hiſpanæ, ſparatrapo, panno lini imbibitû, ſed loco cõmunis olei myrthinû, & communis aceti ſambucinû vſurpabis.

Præſidia ad inflammationes. Ad inflammationes vulneratis neruis ex calida cauſa dolore inſeſtante, & rubore apparente obortas. Recip. ſucci arnogloſiæ, & ſolani cuiuſq; lib. j. olei nymphaeæ, vulgo nenufa, & roſacei ana. vnci. ij. cum farina hordeo quod ſatis ſit cataplaſma componito.

Ad idem. Aliud. Poſt vulneris principium dolore adhuc inſeſtante. Recip. Panis medul-

lam in gallinaceo iure pingui incoctam, quam roſaceo, & chamæmelino oleo, atque oui luteo, & crocei momento addito, cõmiſce, ſed remiſſo iam calore illo emplaſtro vtere. Recip. ſapæ lib. j. olei lûbricorum, & chamæmelini ana. vnci. ij. furfuris torrefacti, & hordeaceæ, atque fabaceæ farinæ, & chamæmellini floris in pollinem redactorum ana. quod ſatis ſit. Ad ignem fiat emplaſtrum. Sed ſi aliqua ex his deſyderentur ex ſolis ſapa vini, furfuribus, & floribus chamæmelli in pollinem redactis conſtrui poteſt: erit quæ eiufdem penè vſus. Sapa etiam vini à Gal. 3. de compoſitione medicamentorum per genera ad neruorum abſceſſus laudatur.

Aliud. Recip. Artemiſiæ: foliorû paruarum maluarum ana. m. ij. coquantur in nigro vino, ſatis diluto, lumbricorum cõminutorum, & piſtatorum, pulueris florum chamæmeli, cuiuſq; ꝑ ſemis. piſtentur per horam in mortario, & emplaſtrû conſtruito: commixto modico vnguento dyltheæ.

Sed ſi vulneris principio, vel temporis tractu profluuium ſanguinis excitetur medicamentum ex thure, maſtichæ, ſanguine draconis bolarmeno æqua portione cum oui candido commixtis, & agitatatis, inſigniter iuuat. Ad idem tamen omnibus præſtat medicamentum Gale. 5. meth. cap. 4. conſtat ex thure gummoſo. Aloë, pilis leporis, minutim ſciſſis cû candido oui ad mellis craſſiciē redactis.

Ad enervatam particulam: materiei fluxionē impediendam atq; neruorum putrefactionem, atque ad tumoris abſceſſus reſolutionem materierumq; exſiccationem. Recip. lixiuij ex capriſfici, palmatum, illicis, & roris marini cinere, lib. iij. aceti non fortis lib. ſemis. mellis communis, vel oximelitis. vnci. iij. hordaceæ, fabaceæ, & orobi farinæ, ſingulorû vnci. j. ſemis.

Ad idem.

Ad ſanguinis profluuium.

Ad enervatam particulam fluxione mare riei, & ad impediendam neruorû putrefactionē, & reſolendum tumorem abſceſſu, & exſiccandû materias

femis. omnibus commixtis, & incoctis, confice emplastrum, cui si maior exsic- candi vrferit necessitas, addito cicerum, lupinorum, & lentium farinæ ana. vnci. femis. si verò maxima modicum serapini illicis cineris, atq; caprini stercoreis: quo- rum maxima pars à Galen. 3. de compo- sitione medicamentorum per genera, & Auicenna. 4. 4. tractatu. 4. capit. de apo- stematibus neruorū sunt desumpta. Sed cauere oportet vt antequam hoc empla- stro, quod solet maximè membro affigi, vtaris: particulæ ambitum, lumbrico- rum oleo illinias, ne dum amoueatur, do- lorem concitet.

Ad idem.

Aliud ad idem. Recip. Absynthij, flu- uialis, calamenti, artemisiz singulorum mañ. ij. lymphato vino incoquantur: Deinde comminuantur, atq; pistentur. Quibus adde mellis vnci. ij. olei chamæ- melini vnci. j. olei mastichis vnci. j. faba- rum farinæ, fursurum torrefactorum & tritorum, florum chamæmeli, stercoreis vaccini puluerizatorum ana. P. femis. ex quibus iterum pistatis emplastrum con- ficito.

Pastilla si
nerui sint de-
nudati, &
corrupti.

Sed si denudati, & corrupti ob præce- dentem inflammationem, & materie defluxum nerui sint, conferunt, pastilli ex calce, & cholcotar, seu vitriolo & vn- guentum AEgyptiacum, & aqua alchi- mistarum.

Quæ conse-
rant mem-
bri instaura-
tioni post
vulnerū coa-
lescentiam.

Ad instaurandum membrum, post neruorum vulnerum coalescentiam, im- becille, præter ea quæ proprio capite scripta sunt. Recip. Vini albi optimi lib. j. femis. sapæ lib. femis. olei chamæmeli- ni, & nardini singulorum vnci. j. femis. absynthij, florum chamæmeli, sterco- ris gallinacei singulorum pugillum. fe- mis. vnguenti dyaltheæ. vnci. j. vinum prius feruefactum, cum pauco cinnamo-

mo, oleis, & vnguento dyaltheæ commi- sceatur, postea tritis, terendis simul mix- tis atque incoctis fiat emplastrum, cui ad- dantur duo ouorum vitelli, & crocei scrup. femis. Hoc alternis diebus aufe- rendum, atque abstergendum est, ablu- to membro prope ignem, vel iure capi- tum, pedum, & intestinorum arietum cal- facto, incoctis ibi roris marini meliloti atque chamæmeli floribus: Post verò temporis intercapedinem vulpino oleo membrum fouendum.

Aliud. Recip. ladani vnci. femis. pal- mularum, passularum sine acinis folio- rum vlni, & maluarum, corticum radi- cum altheæ, fenugræci seminis lini, psyl- lij excorticati, seminis vrticæ, singulorū. P. femis. omnibus cum capitibus, pedi- bus, & intestinis arietum nimis incoctis excollatis, atque expressis, lauacrum con- ficito: In quo calente succida lana mada- facta ad ignem, vel ardentem solem al- ternis diebus membrum fouebis.

Demum illo vnguento. Recip. pin- guedinis prædicti decocti assungæ gal- linacæ, anatis, anseris, & anguis, adipis leonis, vrsi, & equi, medullæ cruris vac- cini, ac ceruini, singulorum vnci. j. vulpi- ni olei vnci. ij. cum cæra quæ ad coagu- landum sufficiat, fiat vnguentum.

Aliud. Catulum pinguem, in testam nouam, & recte obturatam conditum in furnum mittito: coquatur ibi, donec to- tus disiectus sit, mane atq; pinguedo qua membrum perungatur.

Aliud. Recip. assungæ mellis, vulgò, texon. Et hericij, aquilæ, & hominis, vn- guenti Aragonis, & Marciatonis, vn- guenti Agrippæ & dyaltheæ, hyssopi hu- midæ, mucilaginis altheæ, fenu Græci, &

feminis lini singulorum vnci. semis. omnibus assungijs prius liquefactis, & per pannum excolatis, reliquis commixtis, cum cera vnguentum conficito.

Ad idem.

Aliud. Recip. Assungia asininæ, muli, atque lupi, olei terebinthinæ, & ex lateribus, olei costini, & vulpini, singulorum vnci. semis. cum cera quæ satis sit fiat vnguentum. Prædicta æstate potius quàm hyeme conueniunt.

Ad idem.

Plane hyberno illo securè vtimur. Recip. sebi vaccini vitulini, hircini, atq; hædini, singulorum vnci. j. omnibus à pellibus euulsis, comminutis, atq; pistatis, feminis lini, fenugræci, & radicum althææ, atque ladani puluere, æqua portione mixtis emplastrum construito, quod membro cum deligatura calidum vndique ap-

plicandum est, atque interdum ex eo formatus globus in manum immittendus, deligatura desuper constringente: interdum etiam oleum ex terebinthina vel ex lateribus membrum fouendo.

Hæc tanta, tamque varia medicamina, & præsidia, non sine consilio à me scripta sunt. Nam quæ varia existunt neruorū vulnera varæ affectiones non nisi varijs remedijs curari possunt: Ex quib⁹ doctus, & circūspectus medicus secundum vulnorum symptomatum, regionis, temporis, & aliorum differentias & ægrotantis naturā, vberioresque, aut tenuiores facultates, quod aptius censueri seligat. Et sic finit liber hic secundus. Ad gloriam & laudem omnipotentis Dei, Deiparæq; virginis Mariæ: Quorum auxilio non pœnitendos, neque inutiles labores hos nostros futuros speramus.

Finis libri Secundi.

ANDREAE ALCAZARIS Medici, ac Chirurgi.

Liber Tertius, De vulneribus Thoracis.

CAPVT PRIMVM.

Hominis fabrica tribus vtriusque co-
stat.



Tex anathomica admini-
strationibus conspicuum
nobis est, totius microcos-
mi idest hominis machina
tribus ventribus constat:
nempe superiori, quo animata ac regalia
membra insident: medio, vbi spiritualia:
inferiori, vbi nutritiua: Nec enim repug-
nat Hippocratis. sententia sectione. 4. a-
phorif. 4. Vbi inquit, ætate superiores,
hyeme vero inferiores ventres purgabis:
vocat enim ventriculum: superiorem
ventrem, intestinorum respectu, quæ in-
ferius sunt: respectu tamen situs thoracis
inferior venter est: quemadmodum etiã
thorax, respectu situs capitis altioris: ven-
ter medius nuncupari potest. Præmissa
igitur vulnerum altioris ventris, idest ca-
pitis, nec non neruorum qui à cerebro
originem trahunt doctrina: nunc ad vul-
nera thoracis medij ventris explicanda
transire oportet: nam de inferioris ven-
tris regionis ab dominis vulneribus po-
stea (auspice Deo) disseremus.

CAP. II.

De causis Vulnerum Tho- racis.



RGO vulnerum thoracis
constat eas esse causas, quæ
secare, scindere perforare,
seu quouis modo membri cõ-
tinationem separare aptæ

sunt siue ense, siue gladio, sagitta, lancea,
fica, siue quocunq; alio telo vulnus fiat.

CAP. III.

Designis Vulnerum Tho- racis.



Ignorū igitur vulnerum
ad internam pectoris caui-
tatem peruenientium, quæ
dam sunt solius penetratio
nis statim à vulnere illato
apparentia, quædam vero temporis tra-
ctu: quædam autem læsionem interiorū
membrorum indicantia. Quod ad pri-
ma pertinet, Primum signum est anhelitus
paruus: quippe qui aëre per vulnus in-
grediēte, natiuoq; calore, atq; spiritibus
extra exhalatis, cor inde male euentilat:
ac perinde inspiratio & respiratio ad vitā
necessaria, recte exerceri non possunt,
anhelitu paruo inde conflato. Secundū,
spiritus, seu anhelitus per vulnus emissio,
præsertim naribus atq; ore ipsius vulne-
rati clausis, vel spiritu quocunq; modo re-
tento. Tertiū exiguus sanguinis ad exte-
riora exitus, atq; interdū nullus, recurrē-
te nimirum ad interiora sanguine. Quar-
tū extinctio, vel motus flammæ lucernæ vul-
neri admotæ, vel flosculi carminati gos-
sippi: spicillo enim huiusmodi vulnera ex-
plorari (vt nonnulli faciunt) periculosum
est: mēbra enim interiora huiusmodi ta-
ctus non patiuntur quare consulo ab huius-

Signa vulne-
rum pene-
trantium sub
triplici dif-
ferentia.

Indita quæ
vulnus pe-
netrasse fla-
mā demon-
strant.

Signa pene
tratiois vul
neris, quæ
per tractu
apparent.

modi experimento abstinere. Cæterum signa, quæ temporis tractu sanguinem iam putrem in thoracis cavitae indicare solent, ut medici fatentur, sunt, anhelitus difficultas, illius, foetor, & grauitas, atque pondus lateris, præsertim supra costas spurias, ubi septum transversum terminatur: ibi enim sanguis prolapsus congregatur. Euenire etiam solent ipsi vulnerato maximæ anxietates: & interdum syncope, actusis. Pannorum præterea, qui vulneri applicantur, grauis odor, cum ab eo infecti separantur. Adde etiam quod si pectus, vinculo aliquo illito linimento, ut est boli Armenici, vel alterius cuiuspiam rei tingentis, circum voluatur, citius multo linimentum, quod eam partem puris interioris tangit exsiccabitur: interdumque sputum putre excreatur. Est quoque eorum sermo velox, & non sustinet æger, in sanam partem decumbere, sed valde dolet, præ nimio pondere: si vero superlatus affectum decumbat, non dolet: suspensa enim plus dolent, quam si fulcumento aliquo innitantur, ut Hippo. libr. de internis affectionibus asserit. Verum læsionis interiorum membrorum hæc sunt signa, primò cordis vulnerati, extremorum frigiditas, sanguinis exeuntis nigredo sudor frigidus, totius corporis prostratio, venæ languescunt, hoc est pulsus fit imbecillus, color pallidissimus faciei, & locus vulneris prope mammam sinistram: quanuis cor centraliter in medio pectoris situm habeat (ut anatome indicat.)

Pulmonis vero vulnerati signa sunt, spumosi & rubicundi sanguinis exitus, æger calefit, & tussit: difficulter, & cum sonitu spirat, & locus circa latera. Septi vero transversum percussus indicia sunt. Præcordia sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus seu anhelitus rarus, & magnus, tussis sonans, & dolorosa: mentis alienatio,

sputum liuidum, sitis: cibi fastidium, cum eructatione, rigor pungitius, & sanguis spumans fertur, loci que vulneris iuxta spurias costas.

C A P. II.

De iudicijs: seu prognosticis
vulnerum thoracis.



Vdicantur à Guidone nostro & alijs etiam authoribus, thoracis penetrantia vulnera periculosa multo in posteriori parte, quam

Thoracis penetrantia vulnera periculosa sunt in posteriori parte & ratio.

anteriori: ibi enim principes venæ, ac nerui, & spinalis medulla, sita sunt: inquit etiam penetrantia ad interna membra, magna ex parte esse lethalia, aer enim, qui absque vlla præparatione ea ingreditur, ipsa offendit: calor itidem natiuus, atque vitalis spiritus, facile ad exteriora exhalant: quibus omnibus natura imbecillis admodum redditur: Adde etiam huiusmodi vulnera mundari intus recte non posse: Quo circa ferè semper & fistulas, & empiæmata gignere assolent, cum quibus ægri moriuntur, ut Caulicustrast. 3. cap. vniuersali vulnerum, tradidit. Sed illud mori cum huiusmodi fistulis, bifariam intelligi potest, aut cum illis miserrimè vitam, citra eius periculū, agere, cum nec agglutinari recte possint. Sed interdum pus in pectore coaceruatum, prout ipsi laborantes, atque tussientes, præsertim caua tenta plumbi vlceri admota, expellunt: interdum per sputum emittunt, aut aliter etiam, fistulam breuiori tempore ægrum interficere, vlcerato inde pulmone: cuius vlcus insanabile est, quod citra tussim expurgari non potest, etsi tussim excites laceraueris ipsum: Itaque, quasi per mutuas operas, malum hoc in orbem ducitur, & quod per multū, & longū interualum, medicamenta vim suam amittunt:

De Vulneribus thoracis.

135

vt Galen. 5. meth. cap. 2. asseuerauit: & quod assidue mouetur: nec non quia substantiam habet spongi formem, humiditatibus plenam, cum contrarijs vlcus indigeat, nempe exsiccatione, & quiete: & quod denique pulmo ipse sanguine bilioso & tenui (ac proinde consolidationi inepto) nutriatur: cum tamen vlceris consolidatione glutinoso potius sanguine fieri soleat: Ex quibus in hec ticam, atq; tabem laborantes conspicuum est incidere.

Lethalia sunt septi transversa si in eius nervosa parte sint.

Sed quod ad septum transversum attinet, illud admonere oportet, quod si in parte eius nervosa vulnus inflatum sit, tum ex eo quod ea ratione consolidari nequit, tum ob assiduum motum, quo vulnus magis dirumpitur, lethale censetur: verum si in carnosa eius parte, interdum sanabile, vt Gal. 6. aphor. inquit, in comm. aphor. 18. Præterea, leuiora symptomata multo serius vulnerato superuenire aduertito, quando exiguus sanguis putris interius continetur: grauiora vero ac sæuiora & citius si multus: vt periculo sæpe compertum habeo. Præterea illud in bello didici, lethalia magis esse vulnera pectoris penetrantia, quando aliquo acuto telo fiunt, quam glande plumbea sclopettorum: illa enim tela incidentia, sanguinem intra pectus impellunt, quo intus putrefacto, vitæ discrimen suboritur. Hæc vero forsân suo igne, cauterij loco sanguinis profluuium cohibent. Hæc igitur de causis, signis, ac prognosticis dixisse sufficiat, quare curationem aggrediam tempestiuum est: nam de cordis vulnerati prælagijs nil est, quod dicamus, cum mors ocysime sequatur.

Citius eueniunt symptomata multo sanguine intus prolapsio scilicet vero paucos. Lethalia magis sunt a rescindente illata vulnera quam a glande plumbea sclopettorum.

C A P. V.

De Vulneribus thoracis non penetrantibus.



QVONIAM A Vtem a simplicioribus semper est inchoandum, operæ pretium erit; prius vulnere non penetrantium curationem proponere: sed quoniam ab aliorum vulnere curatione non differunt, in quibus solam agglutinationem molimur, eadem curandi ratio seruanda est.

C A P. VI.

An inter initia: thoracis vulnera ad internam vsque cauitatem pectoris penetrantia futura, agglutinantibusve medicamentis absque linamento curanda sint, an è contrario.



IN H I S T H O racis penetrantibus curandis vulneribus non minor profecto quam in penetrantibus capitis, superioris nempe ventris, apud graues authores dissidium reperitur: Guidoni enim nostro, Theodorico, atque Henrico cum alijs, placuit, eiusmodi vulnera etiam penetrantia, nullo præsertim principe membro interius vulnerato, sanguine prius roto conatu expresso, (si futuram expostulent) esse suenda, & sine linamentis, vel turunda quomodolibet contingant, ænemis, seu agglutinatorijs, atque exsic-

Authorū dissidiū in vulneribus thoracis penetrantibus curandis.

14 canti-

Primæ opi-
nionis ratio.

curantibus medicamentis curanda: Quo-
rum opinio his fulcitur, quia si aperta di-
mitterentur vulnera, genuinus calor, ac
perinde viralis, & naturalis spiritus, ad ex-
terius corporis partes facile exhalarent: at
que etiam exterior nos ambiens aer, om-
nibus vulneribus, potissimum interiori-
bus infestissimus, interna, atq; præcipua
membra suo contactu valde offenderet:
quod sine vitæ ipsius vulnerati discrimi-
ne fieri non posset. Alij vero ex neotheri-
cis, ut Guilielmus Lanfrancus atq; eiusdē
factionis, alijs diuerso thoracis penetrā-
tia vulnera aperta cum linamentis ma-
nere iubent: quorum etiam assertio nec
minor ratione ab illis munitur. Clauso
enim (ut aiunt) futura vel agglutinantibus
medicamentis ipso vulnere, effluxu-
que carente, sanguis versus interiora ac
præcipua membra prolapsus, ac tandem
putris, lethalia symptomata excitabit.
Hæc igitur sunt quæ in his curandis vul-
neribus, chirurgos anxios, & ancipites
reddunt: Sed quid hæc dere sentiam, pla-
ne ostendam.

Ut igitur quæstionis huius veritas illu-
cescat, admonere prius oportet, peculia-
re esse, vulnera omnia (ut vulnera sunt)
vniōne, atque agglutinatione egere: est
enim indicatio prima, & medicis, atque
vulgaribus ipsis nota, ut Gal. 3. meth. cap.
1. atq; alijs in locis testatur: Sed hæc va-
rijs quidem modis auerti potest, atq; in-
terdū medici interdū frustrari, aut interue-
niente nimirū dolore nimio, fluxu, aut
inflammatione, aut aeris alteratione, cōtu-
sione, vel carnis forsan deperditione: siue vi-
tiosa aliqua humiditate, in aliqua princi-
pum membrorum cavitatē detenta: nem-
pe capitis, thoracis, ac ventris inferioris,
aut forsan ob ipsius vulnerati cocoe the-
agglutinationis maximum impedimen-
tum. Si igitur nulla harum complicatio-
num vulnerato insignis superuenerit;

medicus naturæ adiutor, pro viribus ei-
us opem ferre, ac conari tenetur, ut vulnera
tū membrū à naturali habitu iā lapsū,
ad pristinum reducat: Sed hoc condu-
ctis oris vulneris, vel deligatur, vel futu-
ra, aut vtraq; atq; agglutinatorijs præfi-
dijs fieri solet, nulloq; modo per linamē-
ta, quæ orarū vulneris agglutinationē, at-
que contactū prohibent. Ergo si in thora-
cis vulneribus prædicta impedimēta ces-
sauerint, eligēda iuxta Guidonis doctri-
nā, hæc medendi methodus erit, quæ ag-
glutinationē perficitur, oppositaq; repu-
dianda, quæ linamentis molitur. Nam
linamenta vltra id quod agglutinationē
prohibent, dolorē maximū excitant, atq;
in posterū, etiā si res bene cedat, post ma-
xima laborum, & dolorū discrimina, fi-
stulam per omnē ipsius vulnerati vitam,
pariunt. Cum vlcus rotundæ figuræ red-
dant, cuius difficilis atq; interdū impossi-
bilis agglutinatio est, nullo ab interna
parte solido fundamento cui caro ipsa ge-
nerāda innitatur, reperto, ut Gal. in cōm.
1. prog. cōm. 4. asserit. Quo circa cū hæc
oia Guid. tract. 3. ca. de vulneribus thora-
cis animaduertet, syllogisticē profe-
cto, hæc penetrantia vulnera consuenda
esse, & absq; linamentis curanda, satis pro-
bavit, etiam si non nihil sanguinis ad in-
teriora fuerit prolapsus, sumpta (ni fallor)
occasione ex Auic. Fen. 10. 3. tract. 5. cap.
de empiemate, vbi materiam in pectore
cōtentā à natura ipsa, vel per lotium, vel
secessum, vel apostoma ad inguina, vel
spuitione, sæpius expelli asserit, atq; etiā
4. 4. tract. 2. c. de casu & offensione, vbi ex
sanguine ab interna corporis parte ver-
sus exteriorē expulso, glādulas inadēnis
vel emunctorijs euenisse testat. Nec non
ex Hipp. sententia, tum libro de internis
affectionibus, tum etiam lib. 6. aphor. 27.
& 7. aphor. 45. & lib. 2. & 3. de morbis, &
7. aphor. 55. atq; etiam ex Galen. in eius
aphor.

Quæ nā sit
sententia in-
ter disiden-
tes auctores
eligenda.

Linamenta
& dolorem
concitant &
partium dif-
fidentia ag-
glutinationē
nem prohibe-
bent.

Natura sæ-
pe expellit
materiā in
cavitatē tho-
racis contē-
tam varijs
vijs.

De vulneribus Thoracis.

137

Aphorismi comment. necnon. 6. de loc. aff. capit. quarto. asseuerantibus, contingibile ac sæpius experientia visum fuisse naturam membris interioribus grauata, materiam per loca superius dicta expellere: nos quoque longo temporis periculo idem experti sumus, non solum incruentis vulneribus, sed etiam (quod creditu durius est) in antiquis:

Sæpius vlc. antiquū medicamentis mondatum, cruentatūq; vt vulnus recens prima-ria intentione agglutinatur.

nam cum post temporis multam intercapedinem, iam iam infirmi salute desperata, nisi manente semper penetranti fistula, non absque ipsius laborantis discrimine, tunc abiectis prorsus linamentis, expresso prius pure, ipso laborante tulsiente, cruentatisque ipsius vlcis oris, concitatoque exterius sanguine, & agglutinatorio medicamento, atque conglutinatrice deligatione, adhibitis, vlcereque ad vndecimum, vsque diem sic dimisso, ac si recens vulnus fuisset, vlcus conglutinatum vidimus. Nec interea temporis, cura nobis defuit, medicamenta per os exhibendi, tum emundantia, tum etiam extenuantia, atque expellendi puris vim habentia, per vias naturæ destinatas, vt nobis condentibus hæc certissimè euenit, in quadam nobili scæmina Abulensi, quippe quæ vlcere penetrante cum laborasset, atque per mensem integrum, & amplius non exiguum puris quantitatem ipsi lotio commixtam emisisset, expulso prius nõ modico feri lactis caprini, quod intra Thoracis cauitatem Syphone inieceram, quibusdam medicamentis emundantibus commixtis, prædicta medendi methodo, vlcus præter omnium, atque meam spem clausum apparuit, mirabile visu. De quibus medicamentis per os sumendis, atque alijs, inferius annuente Deo, diserturi sumus. Simile etiam Salmanticæ accidere vidimus, cum artem chirurgiæ in cathedra publicè le-

Medicamen- ta ore sumē- da multum conferunt.

Casus notā- dius.

Alius casus satis admi- randi is.

geremus, in quodam iuvene scholari, prope cuspidem cordis gladio vulnerato, penetratione quidem non exigua, nam nullo sanguine à vulnere prorsus egrediente, sed intus retento, illico vulnere clauso, vnico tantum puncto ipsum ocysime agglutinatum fuisse conspeximus: etiam si per integram noctem expers loquellæ, syncopa, & extremorum frigiditate, atque spiritus angustia laborasset. Vidimus etiam, cum pueri essemus, in ciuitate Guadalajaræ patria nostra, hominem transuersim posteriori pectoris parte vulneratum, cum spinalis medullæ incisione: & (ne demoremur) futura acuum (quam vocant) & absque linamentis sanitati fuisse restitutum, manibus domini mei præceptoris, atque foci magistri Antonij, cuius anima sceleriter requiescat. Mansit tamen vulneratus ille pronus & curuus. Postea tamen in regione admodum calida cum degisset, sensum pristinum corporis statum recuperauit. E diuerso autem multo post tempore, puerum quatuordecim annis natum, vidimus cuspidem cultelli prope spinalem medullam vulneratum, artissimè profecto vulnere, appositione solidissimi linamenti empirica manu, in dolorem ingentem, atque inflammationem & conuulsionem, & tandem mortem incidisse. ¶ Quibus omnibus, nempe ratione, atque experientia, nec non sapientum autoritatibus conuincitur, tutiorem multo esse viam inter initia, horum vulnerum agglutinationem aggredi, atque naturæ opus in hoc experiri. Sed haud immerito quisquam in hanc opinionem obijcere poterit, naturam forsitan imbecilem, sanguinem intra pectoris cauitatem concrementum nullo modo expellere posse: vt supponebatur: quo intus coaceruato, ac putrefacto, necessum erit mala, ac lethalia sympto-

Casus mon- struosus.

Linamentū forte in par- uo vulnere iuxta spina- lem medul- lam cā mor- tis fuit.

Obiectio in- Authoris cē- suram.

CAP. VII.

De vulnerum Thoracis curatione ad internam vsque cauitatem penetrantium, quando agglutinantibus forsan medicamentis absque linamentis curari possint.



I Sigitur vulneribus penetrantibus futuram (si alia non impediant) absque linamentis competere, iam superius & ratione, & auctoritatibus, atque etiam experientia ostensum est: curatione autem ita instituenta. Primum, vulneratus reclinandus supra vulnus est, vt sanguis ad interiora il-
latus foras exeat: iuuabit ad hoc, ipsi poscam, seu oxycratum tepidum propinare, vt sanguis eo incisus, ac dilutus aptius per os expuatur, vel extenuatus aceti vi, per vias nature designatas, expelli queat: quod Galeni sententia consonat. 5. metho. cap. 8. qui sanguine intra pectus coaceruato ex venarum diruptione, vel ingenti casu, vel ex nimia vociferatione, idem imperauit. Oportet etiam egrum tussire, vt sanguinem melius expellat, deinde sutura admota (si ea opus sit) nullo linamento in vulnere dimisso, puluis ruber inspergendus, qualis erit ex thure, mastiche, sanguine draconis, pari portione commixtis imponendum desuper medicamentum agglutinatorium aliquod, quod sanguinis profluium cohibeat, hoc erit, vel simplex terebinthina, vel oui candidum, puluere rubro ibi commixto, in circumambitu vero ipsius vulneris, stupeuorum etiam candido infuse applicentur, panni quoque posca madefacti, potissimum si sanguinis profluium suspicetur, ad mouendi sunt: pannis tandem siccis: atque deligatura apte desuper admotis,

Curatio quo modo in his vulneribus instituenda quibusve sanguis foras expellendus.

Quæ medicamentum vel nerieuusque circumambitas sit applicanda.

Responsio.

mata oboriri. Sed huic obiectioni facile respondetur, Nos quidem non perpetuo, ac sine discrimine, in vulneribus thoracis penetrantibus, agglutinationem, atque sine linamentis curationem consulere: sed inter initia tantum, ad naturæ vires, atque opus (vt diximus) experiendum, cum medicus illius adiutor sit, eidemque teneatur semper opem ferre: nulloque modo obstare: obstabit igitur, si à principio (vt antea dictum est). Vulnus apertum dimittatur: tum exhalatis spiritibus ab internis partibus, & calore nativo: tum etiam aere ex tertio intus ingrediente: nam si columellæ, seu vuluæ abscissio vitæ discrimen affert, vt testatur Auenzohar suo thei sit, ingrediēte nimirum aere ad pulmonem, & cor sine præparatione, à fortiori igitur aer extraneus, per vulnus, cordi, & pulmōni propinquior, maius longe periculum affert. Itaque oportet agglutinationem vulneris à principio medicum tentare. Cæterum si natura medicum voto (vt obijcitur) non respondeat, Ap parentibus indicij internam noxam indicantibus, facile profecto erit medico manibus vel specillo vulneris oras separare, ac linamentum immittere, data inde via, siue emissario, latentis intus puris effluxioni: præsertim infra triduum: quo tempore cum secunda vulneris permutatio fieri solet, auctore Albucasi, suæ operationis manualis libr. 2. solent symptomata proritari, quæ sanguinem putrefactum intus significant; quæ si suboriantur, facile (vt dictum est) vulnus referabitur. Tunc igitur alia aggrediēda erit via, aliaque curandi ratio instituenda. De prima ergo medendi methodo, quæ agglutinatione molitur, prius disseramus. ramus, deinde vero, hac forsitan prohibita, de secunda.

Quando oporteat agglutinationem post habitam consiliū mutare.

De Vulneribus thoracis.

139

Quatuor
scopi in cu-
ratione ser-
uandi.

De victura
ratione obser-
uanda.

Quomodo
varianda sit
victus ratio.

Quibus mo-
dis reuulsio
paretur.

motis, æger in lecto iaceat. Cæterum qua-
tuor in curatione præ oculis habenda, pri-
mum sit optima victus ratio, principio
quidem tenuis victus, qualis est ius pulli
gallinacei. Deinde excorticibus radicū
foeniculi, petroselini, concoctis, quæ ex-
tenuandi sanguinem, interius coacerua-
tum, nec non, aperiendi vias, per quas san-
guis ipse ad vteras, vel vrinarios me-
atus deferri aptius possit, vim habent, far-
quoque, cum iure pulli, vel amylium, con-
ueniet, ac perinde cicerum iusculum, diu-
reticum enim est. Similiter amigdalatū,
liquidum, ex cremore amigdalarum, at-
que ex saccharo albissimo confectum, vti-
le erit. Nanque in thoracis affectibus, ob
quatuor commoda, maximi momenti
esse. Abenzohar in suo thesaur. capit. de
pleuritide affirmat, scilicet quod pectus
leniat, somnum conciliet, spurum faci-
lius reddi faciat, morbi reliquias consu-
mat, tandem omnis victus ratio eatenus in-
stituta, minuenda, vel augenda est, qua
tenus ipsius vulnerati virtus postulaue-
rit, consideratis, & ætate, & consuetudi-
ne, & anni tempore, atque constitutione,
& regione, quod Gal. multis in locis, me-
thodi, medici peritiæ & iudicio. Relin-
quendum censet, quod literis exprimi mi-
nimè possit. Potus vero, principio ex plu-
uiali aqua, quæ ab Hippocra. libr. de aere
aqua & locis laudatur, quem Cornelius
multiq; alij auctores imitantur, siue de-
cocta cum hordeo, ac penidijs, vel gly-
cyrrhyza. Cæterum, initio vulneris te-
nuis inedia ad septimum vsque diem in-
iungenda, vt sanguis & quantitate, & qua-
litate temperator, ad vulneratum locū
deferat, sed deinceps crassior, vt sanguis,
producenda carnis materies, tenax, atque
glutinosus sit. Secundum vero intentum
erit, fricare atque fortissimis deligaturis
constringere crura, tum sanguinem mit-
tere, virtute, & ætate non repugnātibus.

Alius præterea (si non respōdeat) glāde;
vel clystere cienda est. Rursus, syrups
ad alterandum ac temperandum cum a-
quis, quæ ad id valeant, vulnerato propi-
nabis, veluti violaccum, rosaccum, & si-
miles, cum pectoralibus alijs syrupis (si
opus fuerit) commixtos, aquæ vero sun-
to, buglosæ, scabiosæ, herbarumve simi-
lium, elapso vero morbi principio, syru-
pus ex duabus, vel quinque radicibus, cū
aqua glycyrrhyza, aut scabiosæ, exhibe-
ri debet, neque obliuioni tradendum, vt
ante septimū diem, leniēs aliquod phar-
macum propinetur, ex manna, cassia, ele-
ctuario diachatoliconis, rhabbarbaro, sy-
rupō nouem infusionum. Cæterum, cu-
ratio vulneris, vel properanda, vel disse-
randa est, prout ægri valetudo, vel sympto-
mata postulauerint, si enim symptoma-
ta desint, non solum ad triduum, sed etiā
ad sextum, curationē differes, atque tūc
deligaturas, atq; pānos, vino prius (quod
vocat (stryptico, siue austero (si facile au-
ferri nequeāt) mades facies, & medicamē-
ta quæ cruentis vulneribus applicari so-
lent, adaptabis, inflammatione nimirum
non repugnante: ea erunt, vel vnguentū
gummi vernicis, seu iuniperi: aureū Gui-
donis, olei experts vel simplex terebinthi-
na, pulueri rubeo admixta: loto pri^o ipso
vulnere, vino austero, vt Gale. 4. metho-
cap. 2. præcipit, hæc quidem vulnere ag-
glutinando, vt vulnus est, competunt, in
ambitu vero olei rosacei, aut lumbrico-
rum, aut nardini (hyemali præsertim tem-
pore, fortius præcedat, ac proinde defensi-
uum ex bolo armeno, oleo rosaceo, atq;
candida cæra, liquefactis, addito modico
pulueris rosarum cauebis tamen, ne isto
rū aliquid vulnus attingat, coalescēte ve-
ro iam vulnere, futura auferenda est, at-
que medicamentis agglutinantibus (que
iam scripta sunt) vtendum, denique vul-
nere iam clauso, per aliquod tempus, ad
ad vul-

Qui sint su-
mendi syru-
pi quibusq;
aquis admi-
stis.

Quāto inter-
misso rem-
pore sit ite-
randam cu-
ratio.

Medicamē-
torum quæ
apponenda
sunt ratio.

vulneratæ particulæ confortationem, & robur. Oxy croceū vel huiusmodi aliud, quale esset emplastrum à Ioanne de Vigo descriptum (quod confortatiuum vocat) ægrum gerere oportet, ius vltimum (quod obseruandum potissimum est) versatur. Circa sanguinis putris interius forsan detenti, expulsionem, atque extenuationem, ad quod, medicamenta non pauca simplicia, atque composita, inferius dicentur.

CAP. VIII.

De vulnerum thoracis ad cauum vsque penetrantiū curatione, quando prima curandi ratione agglutinari minimè possunt. Sed intus detenta sanie, æger superuenientibus afflictionibus vexatur.



Actenus de thoracis vulneribus differuimus: quæ, nullo superueniente symptomate, agglutinatorijs medicamentis coalescere solent: nullo nempe sanguine forsan interius coaceruato vel forsan à natura per vias sibi designatas, iam expulso. Nunc vero de his vulneribus è diuerso agendum: quæ ipsa natura imbecilli, multo sanguine intus retento aggrauata, vel laborantis cacochimia, multo aliter se habent: tunc infestari ægrum infra triduum (magna ex parte) & tussi, atque spirandi difficultate, rigore, febre, atque alijs indicijs putrescentis sanguinis manifestis, affici videbis. Quo casu, putrem sanguinem expellere, atque pectus introrsum mundari oportere, manifestum est, quando videlicet natura ipsa, ob aliqua impedimenta, designatis vijs, nimirum per venteras ad vesicam: per meatus fecis ad in-

testina: per apostoma ad inguina: aut spiritum, per os deferre, aut expellere, nequit. Tunc ergo futura, si facta erat, scindenda est: atque vulneris oræ, siue manibus, siue spicillo, prorsus aperiende: atque ipse vulneratus rursus spiritumque vehementer retinendo, pus interius contentum, vitiosamve humiditatem foras mittere procurer: voluaturque in vtrumque latus: deinde pronus supra vulnus iaceat, sanie igitur, quoad fieri possit, extracta, vlcerique gossipio prorsus emundato, linamentum, quod vlceris cauitatem attingat, oui vitello, optimæque terebinthina, thure, & croci momento commixtis, illitum intromitto, aligare tamen filo linamentum oportet, vt si in ipsius thoracis cauitatem deligatura comprimenda, illabatur, extrahi facile possit, sed hoc cautè, ne vlceris orificium, linamentum cooperiat: sanies enim intus prorsus detineretur. Quare danda opera est, vt aditus aliquis pateat, quo pus effluere possit, quod non difficile continget, si linamento ea sit figura, capite nimirum abscisso, ne puris exitum impediat, nã si caput integrum habeat & pus detinebit & laborantis vitæ maximū discrimen adferret quod vitium, non paucos ex chirurgicis quotidie incidere video. Nec minus animaduertendum est, vt panni quibus medicamentum admouetur, in medio incisi sint, vt sanies, putresque exhalationes exire possint. Fovebis deinceps vlceris ambitum rosaceo, atque lumbricorum oleo, vel nardino, commixtis (hyberno potissimum tempore) igne calefactis, cura maxima adhibita, vt vulneris curatio, quam ocysime fiat, ne viscera longa curationis mora, ab extraneo aere offendatur, & natiuus calor, atque spiritus, exhalent. In vulneris præterea ambitu medicamentum admouebis, ex his quæ sequuntur confectum ex oleo rosaceo

Quando futura scindenda sit atque linamentum immittendum. Confert maxime ad puris expulsionem vulneratum in latus vtrumque volui, prorsusque supra vulnus iacere.

caput tentæ non debet vlceris orificium proferre claudere.

Medicamentum in ambitu vulneris ad ponendum.

Indicia puris interius contenti.

De Vulneribus thoracis.

141

Medicamen-
tum in am-
bitu vulne-
ris apponē-
dum.

Situs vulne-
ratiō.

Vnguētum
quo ingui-
na & spina-
lis medulla
vngēda sint
& loca ade-
nosa.

Emundanti-
bus atq; sar-
coticis, me-
dicamentis,
quando vti
liceat.

rosaceo omphancino, ad vnci. ij. oleo ca-
mæmelli, vnci. j. sandalis rubeis, rosis, añ.
dragm. j. & sem. bolo armeno, dragm. vj.
cæra, quod satis sit, & postq̃ ab igne cæra
& olea liquefacta separaueris, superaddi-
to puluere eorū quæ modo diximus, &
oui cādidū ad imbibitionē vsq; agitabis,
nanq; vnguētum hoc, vt ipsius simplicia
ostēdunt, & humorum affluxiones cohi-
bet, & doloris leuādi, atq; affecti loci ro-
borādi, vim habet: desup̃ vero stupa, vel
carminata lana, panni, nec non deligatu-
ra, cum artificio moliantur, quæ vt firma
sint, deligaturam super vtrunque hume-
rum, atque per crura percurrere oportebit:
Quod vero ad decubitus, & vulnera
ti situm, illud obseruabis, vt si vulnus in
altiori aliqua parte sit, crura quoad fieri
possit, reliquo corpore sint sublimiora: si
vero in inferiori, aliquatenus eleuetur e-
ger: vt puri expellendo commodior lo-
cus detur. Vt cunque tamen vulnus con-
tingat, ægrotū ipsum primum supra vul-
nus iacere iubebis: quod sanguis putris, aut
sanies, ab imo corporis, ad exteriora me-
lius deferatur: Quod si perpetuo fieri id
non possit, curationis saltem tēpore, per
aliquod spatium fiat, & tussiat, & supra
vulnus decumbat. Sed interim spinalis
medullæ cura sit, vngatur ergo, medica-
mento, ex oleo sabino, irino, camæmeli-
no ex lumbricis, adipe anserino, anatis,
muscillaginibus althææ, fœnogræci, & se-
minis lini, añ. vsque ad dragm. iij. pulueri
bus lumbricorum scrup. ij. puluere croci.
scrup. semis. superaddita. cæra quæ suffi-
ciat, quo spinalis ipsa medulla, inguina,
axillæ, & collum, deliniantur. Postquam
vero sanies apparuerit aliqua: à lenienti-
bus medicamentis intra vulnus saltem, ab-
stinendū prorsus est, ne humiditates quæ
intra pectus sunt, augetur, quin potius
emundantibus, ac desiccantibus vtendū,
sarcoticis deinde (si res bene cedat.) Au-

spicandum tamen erit ab illo medicamē-
to, quod continet rosacei mellis excola-
ti, vnci. iij. terebinthinæ ex beto, vnci. j.
ordeaceæ farinæ. vnci. j. quo calfacto,
vtere, Exterius vero supra vulnus, & cir-
cumambientes partes, vnguētum impo-
nito gummi enhemis, & quauis à conc-
liatore diff. r. r. ad aliud intentum, nem-
pe ad vulnera cum fractura cranei pene-
tranti, applicetur, experimento tñ com-
pertum est, ad huiusmodi vulnera nō pa-
rum conducere. Pus nanque quod intra
cavitatē pectoris prolapsum est, euocat:
Similiter huic malo potissimum conue-
nit resinæ vnguētum attractiuum inscri-
ptum, multis enim opem tulit, constat
ex ipsa pini resina, optima, atque cæra ci-
trina, noua, æqua portioe mixtis, & lique-
factis excolatisq; per pannū, manibusq;
perunctis oleo nardino. subactis, Eidem
quoque vnguēto superaddi potest, quar-
ta portio solius gūmi enhemis, id est oleæ
ætiopicæ, vel gūmi, oleastri, vt placeat Pli-
nio libr. 2. natura. hysto. Idem efficit v-
nguētum ex oleo rosaceo, completo, o-
leo nardino, añ. vnci. ij. resinæ pini, tere-
binthinæ ex beto. añ. vnci. j. gummi enhe-
mi, oppoponacis. añ. dragm. iij. sepi hædi-
ni. vnci. j. puluere caudæ equinæ herbæ,
propoli, nempe fordicie aluëorum apū,
añ. dragm. ij. sem. cæra, quod sit satis: cui
addito croci puluerem. scrup. j. impones
pāno perforato, vt sanies aptius foras ex-
pelli possit, quod commune in omnibus
vulneribus tibi sit, Desuper lenissimam,
atque tenuissimam spongiam, qua sanies
extrahatur, & imbibatur, adaptabis. Cæ-
terum, vt dolor sedetur, sanguisque intus
fortasse concretus discutiat, illud medica-
mentū iam dudū expertus sum, qđ con-
stat ex absinthio, calamentho, artemisia,
floribus camæmelli, ana. m. ij. minute in
cisis, vino atque melle incoctis, vehemē-
ter cōtritū cui addita sit farina fœnogræ-
ci, fur-

Medicamen-
ta pus atra-
hentia.

Sedantiā do-
lorem & san-
guinem in-
tus concre-
tum.

ci, fursur torrefactum : farinaq; fabarum, ana. P. semis, oleum nardinum, vnci. j. semis, croci puluis, Scrap. sem. addito etiā interterendū, modico eiusdem decocti. Ad mundificationem vero vlceris, & carnis productionem, sequens vnguentum vtile esse, periculo inueni, sumito, rosacei mellis colati, vnci. v. terebinthinæ, vnci. j. & sem. refinē pinī, vnci. sem. farinae fabarum, thuris, mastiches, myrrhæ, farcolæ, draconis sanguinis, mirobalanorū, citrinorum corticum, mumix, singulorum dragm. j. quæ in pollinem redacta, alijs commisceantur, additis guttulis aquæ vitæ, hoc vnguento, & in linamentis intra vulnus, & in pānis, exterius vten dum est. Sed id obseruabis, vt vnguenti pars, quæ in pannis admouetur, solidior conficiatur, addendo plus cærx, semotaque aqua vitæ. Cæterū alia medicamenta, tam per os sumenda, quàm exterius admouenda, atque syphone iniicienda, sequētibz capitibus auspice Deo, dicent.

C A P. IX.

De methodo in penetrantibus Thoracis vulneribus saniem iam intus continentibus, obseruanda, deque medicamentis admouendis.

QUANDO autē morbus iam prolixior, ac natura ipsa ad saniem intus contentam expellendam, imbecillis videatur, tunc oportet, vehementer naturam iuuare, quod duobus obseruatis efficies, tum medicamenta per os exhibendo, quæ mundare, ac extenuare saniem, eandemque expellere, vijs natura designatis, valeant. Tum etiam in thoracis cavitatē syphone inji-

ciendo, Primum quidem, multifariam completur, nam si febris infestet, vasculum decoctionis quam inferius describā mane, ac vespere, propinabis, continet, capillorum veneris, pimpinellæ pillosellæ, neptæ, summitatū canabis, rubec tinctorum, centauræ, teneritatum caulium rubeorum, glycyrrhyzæ, radicū arthemisiæ, caudæ equinæ, singulorum. P. semis cunctis prout ars docet ex lib. vj. pluuiæ aquæ, vsque ad semissis consumptionem, incoctis, excolentur, addantur scabiosæ aquæ vnci. vj. rosacei melli sexcolati optimi, vnci. vj. penidiorum, vnci. j. semis. Sed si febre careat, decoctum quod ex supradictis simplicibus cōstat, ex optimo vino fieri debet, vbi non rosaceum mel, sed simplex commune optimum, miscendum eo prius despumato. Sed hic admonendi sumus, Guidonem, nonnullosque alios, perperam in hac potione garyophyllos posuisse, sunt enim calidissimi, vnde illis, febrem, & incendium maximè inter initia, augerent, sed arbitrator, garyophyllos, pro garyophyllata herba, quæ odore garyophyllis est adsimilis, ex eoque nomen assumpsit, male usurpasse, huius herbæ quantitas, sit manipul. j. Mel præterea quod hoc indecocto continetur, ad pectoris interna vlcera, Auicenna Fen. i. 3. tracta. 5. capit. 3. & Galen. 4. meth. cap. 6. maximè commendant: cibi enim, atque medicamenti optimi, vim habet, vehiculumq; præbet, vt medicamentorum transitus velox sit, vnde Auic. loco citato. cap. de pleurisi, noui (inquit) & timorosi nō confidentes in se ipsis, in hoc timent mel, & ponunt loco eius zuccarum, sed antiqui innuebant, vtendū esse medicinis fortis mūdificationis, præparatis, cū melle, hæc ille. Quare nō immerito, Hipp. lib. de internis affectibus, cibi & medicinæ loco, origanū tenellam cum melle mixtam suppuratis præben-

Discrimen
potiōnes
bendē febre
molestante
vt minus.

Animadu
eritio.

Mel, & cibi,
& medica
menti vim
habet, vehi
culumq; est
aliorum me
dicamentorum.

Duplex na
tura iuuand
æ ratio.

De Vulneribus thoracis.

148

præbendam esse iubet. Verum si æger ingenti tussi excrucietur, pectoralia quædam medicamenta exhiberi oportet, qualia sunt, diapenidium, diacalamentum, diagragantum, atque huiusmodi alia, Syrupi quoque quos largos vocant exhibendi, qui confici possunt ex glycyrrhiza, hyssopo sicca, iuiubis, capillis veneris, passulis enucleatis, nucibus pineis, melle, ac saccharo, atque penidijs. Potus vero communis, sit pluvialis aquæ, glycyrrhizæ, decoctionis, & hordei excorticati, inter initia, postea vero, semoto, hordeo, mel optimum addes, hordeum enim tunc inconuenit, febre potissimum sublata.

Confectio-
nes varieg
ad
materiã ex-
tenuandam
in pectore
contentam
pellendãq;

Iuuabit præterea, ægrotum mane, per aliquot dies porare vnci. iij. aquæ ex. v. radicibus, cum confectioe earundem radicum diureticarum, ex melle optimo. Proderit similiter, ut materia subtilior fiat, eaq; ad veteras vias dirigatur, confectio ex dipfaco, id est, cardone fullone, est enim quàm accommoda, ut satis experimento cognoui, cum magna laborantium, ad Dei laudem, utilitate. Conficitur vero, melle optimo & vino albo veteri, prout ars docet, ut etiam sit, ex supradictis quinque radicibus, exhibenda est cum aqua instillata, vel ipsius dipfaci, vel diureticarum radicum, quas diximus, quæ quidem confectio ab Auerrhoe s. colligit summe laudatur. Superest, ea medicamenta docere, quæ ad internam pectoris cavitatem, syphone immittenda sunt, tum ut saniem emundent, tum etiã, ut ipsam extenuent, atque (ut sæpe dictum est) per veteras, vel alias naturæ signatas vias, facilius permeare possit. Quod varie perficitur: nam si aliquod febris vestigium adhuc supersit, sequentibus vtendum est. Recip. Hordei integri, rosarum, equinæ caudæ, radicis, dipfaci, corticum, capillorum veneris, ana. P. j. efficiesque decoctum, prout ars expostu-

lat, ex libra. iij. aquæ pluvialis, usque ad dimidij consumptionem, excolabis, ac superaddes vini albi vnci. iij. rosacei mellis ex colati vnci. iij. myrrhæ selectæ, in puluerem redactæ vnci. iij. efficies lauacrum, atq; intra pectus syphone tepidum iniicies, toties, quouique, clarum sine aliqua puris commixtione, exeat, eiusdem intenti est, lauacrum ex aqua lactis caprini, cum rosaceo melle. Sed danda opera est, ut vulneris curatio quàm ocysime absoluat, ne interiora membra longa mora ab externo aere offendantur, natiuique calor, spiritusque exhalent. Lauacro igitur immisso vulnere manu medici cooperito, æger ipse hinc inde super virum, latus agitur, ut interiora pectoris cavitatem lauacrum commodius attingat, saniemque diluat, postea vero, supra vulnus pronus iaceat, tussiat atq;, & spiritum retineat, ut lauacro iam pus dilutus egredi facilius possit, sed interim animaduertendum est, ne lauacrum statim foras emittatur, sed aliqua contracta mora, quod cum sanie commisceri aptius possit. Cæterum medicamento saniem emundante, atque exsiccante cuius superius meminimus, uti oportet linamentis adaptato: licebit etiam loco linamenti plumbeum specillum cauum, eodem medicamento illitum immittere: quo si quid puris intus supersit, instillari valeat: cuius meminit Hippocrates libro, de internis affectionibus. Sed oportet gossipij, aut lenissimæ & planæ spongiæ paululum applicare: quod progredientem saniem excipiat, atque in se imbibat: sit autem plumbeum specillum ad latera duobus, aut tribus locis perforatum: ut hinc inde ad seducere pus possit, quod quanto saniei effluxio minuetur, tanto decurtandum est, ut alia linamenta solent. At cum iam constiterit internam cavitatem à sanie esse emundatam (quod si lauacrum, clarum

Lauacro sy-
phone per
vicosini cie-
da.

Æger cura-
tionis tem-
poris agitari
ac cœcuti de-
bet ut laca-
cro sanies
attigat, & si
vulnus iaceat
vulnus iaceat
quod pus sa-
cat.

ca. 1480

clarum prorsus egrediatur, intelliges) tunc temporis exsiccantia, locaque interiora corroborantia medicamenta admovebis, ea sunt: vini albi veteris, atque optimi libra, iij. rosarum cum capitibus suis, balastiorum baccarum lauri, ac foliorum eiusdem, granorum & foliorum myrthi, centaureæ, roris marini, ana. P. semis. concoqui debent prout ars postulat, usque ad semisis consumptionem, posteaque excolari, atque in ea decoctione eandentia auri lamina extingui; superaddes rosacei mellis excolati vaci. iij. lit. drachma. iij. mellis centaureæ vnc. i. myrrhæ in pulverem redactæ drachm. iij. granæ selegissimæ in pulverem redactæ drachma. j. commixtis omnibus. Sed maxime cauere oportet, ne interius metallica medicamenta vel ore exhibeantur, vel syphone iniiciantur, ut viride æris, rutæ, litargirium, cerusa: licet enim exterius innoxius sit eorum usus, interius tamen, ut venenosa, vitæ discrimen afferunt, ut Galen. 4. metho. capit. 7. affirmat. Sed obijciat quis, nonne vitum apostolorum (quod vocant) vnguento, cum augetur caro super cerebri membranam, in quo viride æris contineri nemo dubitat: similiter Galen. 4. de compositione medicamentorum secundum locos. Tum etiam quinto Isis vnguento in cerebri membranis, loco periculocissimovti iubet: in quo non solum viride æris, sed alumen, atque acerrimum acetum continentur. Guido etiam tractatu 4. capit. de viceribus thoracis, ea vnguento apostolorum mundificari iubet, cur ergo affirmat ipse Guido perituum ægrum, qui his medicamentis curaretur. Sed responsionem colliges ex prædicta Gal. sententia quarto metho. cap. 7. & 3. de temperamentis, nimirum, aliud esse per os medicamenta illa vehementia exhibere, aut syphone in interiora immit-

tere, quod lethale esset: aliud vero (quod Galen. atque Guido admittunt) exterius supradictis vnguentis uti: verum si res secundè cesserit, sanie exsiccata, ægro sine febre. Tunc temporis, & in medicamenti quæ per os sumuntur, atque illis quæ syphone mittuntur licebit (imo oportet) styptica, atque austera, agglutinatoria commiscere, qualia sunt thus, mastiche, acacia, sarcocolla, dragagantum, balauustum, cupressi nuces, litium, symphitum, bolus Armenus, hypocistis, cidonium, & his similia. Idem observabis in his medicamentis, quæ exterius vulnere applicantur, atque interius: incibus quoque perutile erit, nonnulla etiam austera, quibus ut liceat, commiscere.

C A P. X.

De præcauendo errore Chirurgorum quorundam existimantium vulnera pectoris penetrare, cum secus sit. Deque modo procedendi in curatione præter superius dicta.



Admonenditamen sumus, ne cum Chirurgicis in anatome parum exercitatis decipiamur, membranam, quæ mediastinū nuncupatur, cavitatem thoracis, ac pulmonem secundum longitudinem diuidentem, à natura, ob maximas utilitates, quæ inde proueniunt, cum ad anteriore partem peruenit, in duas diuisam esse partes, cavitatem inter ipsas aliquantulū spongiformi manente: quo fit ut existiment chirurgici, quādo vulnus ea pectoris parte, ad hanc cavitatem tantum protendi-

Bipartitur mediastinū cum ad partem anteriorem pectoris protenditur.

Disparat.
non quod
disparat.

Metallica
medicamenta
non cre
scentia, nec
syphone in
terius inieci
da.

Obiectio.

Responsio.

Aduertitur
chirurgorū
error existi-
mantimpe-
netrasse tho-
racis vulnus

Discrimē in-
dicans verā
penetratio-
nem vulne-
ris & appa-
rentem.

Quando li-
namenta mi-
nui, & quan-
do auferri
prorsus con-
ueniat.

Sarcotica
exsiccantia
medicamen-
ta.

tur, prorsus ad interiora penetrasse: eo decepti, quod lauacrum iniectum intro recipiatur: Vnde medicamentis à ratione alienissimis abutuntur. Igitur vt errorem hunc caueamus, illa erunt indicia ad internam pectoris partem penetrationis quod anhelitus per vulnus respirat, quod odor atq; mundificantis lauacri sapor ad ipsum vulneratum non solum peruenit, verū etiam interdū lauacrū ipsum cū pure vel sanguine commixtum per os emit titur. Si vero hæc absint, non penetrare intelliges: quod & per anatomen conspici cum mihi fuit: & longo experimento didici: posteaq; apud Carpum virum insignem mundini anatomes interpretem inueni, comm. 2. 3. cap. de anatomia panniculorum pectoris. Vbi asserit, se Florētiā in quadam nobili fœmina fistula eodem loco, nempe parte pectoris anteriori laborante vidisse, tuncq; etiam medicos fuisse deceptos, dum existimarent vlcus penetrare. Quo sic animaduerso, curationem prosequamur. Vulnerato igitur ipso iam febre liberato, sanieq; exsicari incipiente tunc si res bene cedat, linamenta paulatim minuenda, ac eādem auferenda sunt: locusq; ipsius vlceris exco-riandus, cruentandusq; vt ipsius oræ facilius coalescant, de super vnguentum gummi vernicis, vel aureum Guidonis sine oleo, imponatur in ambitu vero duplicatus pannus, stypticus vino madefactus. Vinum sic conficies. Assumas nigri vini meracissimi libra. iij. ex quo vsque ad semissis consumptionem, prout ars præcipit, incoquantur flores chamæmeli meliloti, flores lauri, cum baccis, oliuæ folia, marinum ros, cupressi nuces, myrthi folia, balaustum, rois cuiusq; P. semis. alumenis dragm. iij. Thuris, mastiches, acatiz, gummi iuniperi, conuassatorum, singulorum drag. j. quæ omnia in panino simul apponantur, fiatq; decoctū

prædicto modo. Curatio vero quanto fieri possit serius fiat. Sed interim vini potus nigri vulnerato exhibeatur, atque austera, vt cotonea aliaq; styptica & agglutinantia cibaria, qualia sunt capita, & pedes arietum vitulorum, hædorum: Ex quibus tenax, forte, atq; conglutinofum conficitur alimentum: ac perinde sanguis: quod ex Galen. 4. metho. cap. 7. colligi potest. Summopere tamen animaduertendum est, etiam si res secundè cesserit, oportere ægrotum multis diebus manē, vespereq; prædicta diffaci confectio ne, atque quinque diuriticarum radicum aqua vt si sed finge (vt euenire sæpius affollet) contentam interius saniem, à natura per vias sibi designatas, expelli non posse: imo per vlceris os, per omnem diem ægro præsertim tussiente, & prono, manare, vlcusque in callosam iam fistulam temporis diuturnitate conuerti. Qua ergo tunc curandi ratione vtendum erit?

Qua in re arbitror blanda seu (quam dicunt) palatiua curatione vtī oportere, nimirum vt morbus licet non aboleatur, (id enim per difficile est) saltem vt laborantis & dolor & passio mirefcat. Quauis nonnunquam huiusmodi curatio in propriam, atque integram curationem, præter spem couertatur: Vt testatur Guido tractatu. 4. capit. de vlceribus thoracis. Atque ego interdum periculo hifce oculis contigisse vidi: Sed præsertim in euchymis, mundisque corporibus, ac bona victus ratione vtentibus, nullaque febre vexatis, sed huiusmodi fistulæ curatione, plumbeo cauo specillo; & in lateribus perforato: vt hinc inde, saniem recipere, atque expellere aptius possit: intra vulnus admoto perficitur, capite etiam, & reuoluto, & per intervalla inciso: atque lini panno, ne carnem lædar, subterposito: vt in praxi peculiare est. Sed panus cum attractiuo refinæ vnguen-

Videtur ratio, quæ agglutinat vulnere molitur.

Diffaci confectio molitis diebus iudicanda est.

Quādo blanda seu palatiua curatione fit vtendum, quæ interdum in propriam conuertitur.

guento (cuius supra meminimus) de super immediate applicetur: ea parte, quæ vulnere correspondet, incisus, statimque tenuissima ac leuissima spongia, lenique gossipio. vulnus abstergendum est. Raro sed aliquando tamen tepidum aliquod lauacrum intus syphone immitendum est: exhydromele, vel vino & melle, aliquodve decoctum, ex simplicibus superius commemoratis: fuggendaque ab ulcere interdum sanies est: vel per instrumentum puris attractiuum, quod Galeno. 5. methodi. capite. 8. ac. 2. ad Glauconem capite. 8. de sinu, pyulcam vocat non dissimile vitreo instrumento, quo præcipuè in valentina ciuitate mulieres ad fuggendum mamillarum lac, à partu retentum, communiter vtuntur. Attrahit enim pus omne, suctu duntaxat laborantis: nec in ipsius os, sed in instrumenti ampliorem cavitatem cadit. Sed si instrumentum id fortasse non reperis, syphone ipso prorsus vacuo, vti poteris, vel sicca cucurbitula angustii osculi: sed id raro, ligatis interea atque constrictis cruribus, vti per reuulsionem dolor ab affecta particula deriuetur, & ne humorum fluxio ad eam partem at-

Pyolca instrumentum puris attractiuum.

Cucurbitula sicca pus attrahit.

Alius attrahendi puris modus.

trahatur: Attrahi etiam pus poterit, si amicus aliquis seu cognatus vulnerati, calamo saniem ipsam fuggere secum sustineat, vti fecit tempestate mea immundus quidam chirurgus, qui loto prius acerrimo aceto ore, non parum puris suxit. Quibus modis vti licet, quando pus à pectoris cavitare, alia ratione ad exteriora euocari nequit. Verum enimvero, etiam si hoc diligenter fiat, interdum euenit, fistulam per ætatem omnem, ipsam vulneratum (citra aliud tamen documentum) comitari. Sed meo tempore, (Deo auspice) nonnullos (sed raros) curavi, palatiua co-

Aliquos curavi: an thor quibus pa-

rum curatione in propriam, & perfectam conuersa: quippe paulatim diminuta iam sanie, atque pectore interiorius emundato, callosam carnem (quæ huiusmodi antiquis fistulis peculiaris est) abscindendo, sanguine inde concitato, veluti vulnus recens, atque cruentum curabam: agglutinante videlicet aliquo medicamento: veluti aureo Guidonis, vel iuniperi gummi, exterius admoto. Postea pannis, & constringente deligatura pectus ligabam: nec per aliquot dies, vulnus detegebam. Adhibita cura, vt æger in lecto decumberet, ciboque conglutinoso, ac potu vini nigri (febre scilicet deficiente) per multum tempus, vteretur, Cibus aptus erunt, arietinæ, hædine, ac vitulinæ extremitates. Nec minus conueniet dispaci confectio, (de qua superius) per aliquot dies, albo vino sumpta, quam certe ad hunc effectum, æquis laudibus efferre nequeo. Oportet etiam, circa sex res non naturales, laborantem se bene gerere: nam (vt est in communi verbo) non minor est virtus quam quærere, parta tueri.

liatio vera est in propriam curationem, & quærationem.

C A P. XI.

An in thoracis penetrantibus vulneribus, ad internam vsque cavitatem: pectore ipso pure grauato, contra aperire liceat.

SED quia non levis momenti est, in thoracis penetrantibus vulneribus, pure intus retento, eoque natura grauata, sci-

re, an

De Vulneribus thoracis.

147

An contra
aperire li-
ceat vero
don.

Negatiue
partis argu-
menta.

Affirmatiue
partis quam
auctor tenet
argumenta.

re, an contra aperire liceat, (vt nonnulli voluerint) an non. Dubium hoc, ad vtranque partem agitandum, hoc capite proponimus. Et pro negatiua parte, primum argumentum illud est debilibus debilitatem, ac dolentibus dolorem addere, non oportet: sed sæua hæc ac fera apertio. Id ipsum efficit: Quippe quæ post temporis intercapedinem, iam ipsius laborantis viribus contractis, à chirurgo instituitur, ergo conuenire non potest. Secundum, vbi tumoris, vel inflammationis, vestigium aliquod, quo medicus ducipossit, non adest, neuiquam aperire licet: sed costis sua duricie prohibentibus, ad exteriores partes eleuari pus non potest: nec locus intumescere, Igitur apertio inconuenit, Sed contrarium, & ratione, & experientia, atque grauissimorum auctorum doctrina, conuincitur, Experimento, quidem, ego ipse vidi hæc oculis, nonnullos his vulneribus, iam prope mortem, hac contra apertione (fauente Deo) sanitati fuisse restitutos. Ratione etiam conuincitur, nam quibus alia salutis ratio non est, & quæ vnica videtur, ea dubia est: necessum arbitror his est, aduersos periculis ire. Galeno asseuerante. 10. methodi. capite decimo. Cornelius etiam Celsus libro secundo. capite decimo. melius (inquit) est, anceps expriri auxilium, quam nullum: sed nulla alia in hoc casu, euasione spes superest, ergo extremis morbis extrema, atque exquisita remedia optima sunt, ex Hippocratis sententia. 1. aphorismorum, aphoris. 6. Quocirca, ad hanc pectoris contra apertionem, veluti ad sacram anchoram confugiendum est. Et primum, ex Auicennæ sententia. 10. 3. tractatu. 5. capite. 5. quifit inquit, Cum autem existimaueris in pleurisi, materiam plurimam, & non

mundificatur, in quadraginta diebus, nec in paucioribus, immo facit cadere in phthisim: tunc oportet, tenui cauterio aperire, vt fanies extrahatur, & ab ea pectus mundificetur. Eiusdem quoque sententiæ est Galenus, multis in locis, præsertim libro. 5. methodi. capite. 8. tum etiam libro. 6. aphorismorum. 27. in eius commentario. 7. aphorismorum. 45. & Hippocrates. libro de internis affectionibus duobus in locis. Purulentis vel suppuratis, hanc refectionem fieri consuebunt. Neoterici quoque auctores, vt Guidon. Guilielmus de Saliceto, Niculus Florentinus, ac fere omnes alij, tanquam cedere inter se omnino percusso, præfatis auctoritatibus suffulti in vulneribus pectoris penetrantibus, reterto intus pure: pariratione. Idem faciendum esse docuerunt, Sed reliquum est, argumentis in contrariam partem adductis, satisfacere. Ad primum igitur, minor negatur: cuius negationis ratio est, quia longe maius iuuamentum ex puris extractione, facta refectione sequitur, quam sit nocumentum, ex nonnullo dolore, tempore sectionis inducto. Ad secundam vero partem, minoris distinctione, responderetur. Nam aut ipsius laborantis virtus constans est, aut imbecillis, imbecillis quidem, aut ex puris aggrauatione, & contra aperire conuenit, extracto nanque pure, velut ifarcina qua præmebatur deposita: natura potius robustior redimatur, aut infirmi robur contractum est, ex virtutis resolutione, quo casu, nullo modo competit. Sed si virium robur laborantis adsit, refectionem conuenire conspicuum est virtus enim fortis omnia sustinet, ac tolerat: debilis vero, quibus licet contristatur, Galeno. 1. method. asseuerante. Ad secundum vero argu-

consuebunt //

Solutio ar-
gumentorū.

Nature im-
becillitas de-
plex.

mentum, concessa maiore, minor negatur. Non enim (vt falso in casu supponebatur) costarum durities impedit tumorem apure intus retento conflatum, sursum eleuari. Illud enim, subueris, ac inte-

Septum transuersum, non transuersaliter, sed diagonaliter spiritualia membra à nutritiuus diuidit.

gris costis, verum esset: Sed cum septum transuersum, non quidem directè, transuersaliter, sed diagonaliter, vel oblique membra spiritualia, à nutritiuus diuidat, & quasi ad secundam vsque costam mentosam, siue spuriam, versus spinalem medullam descendendo, protrahatur, vbi pus in pectoris valtitate contentum retinetur, nullum in hac parte, nempe costarum spuriarum, impedimentum, erit, cum locus carnosus sit, quo tumor sursum eleuari, atque exterius apparere, & aliquam editionem facere possit. Qua exterius aliquatenus prodita non aliter, referatio fieri debet. Quod non solum recentiores, vt Guilielmus de Saliceto, & alij, qui in arte chirurgica clauerunt, sed etiam veridicus Hippocrates. libr. de internis affectionibus, idem faciendum esse censuere.

Referatio non facienda nisi vbi exterius pus editione aequam fecerit.

CAP. XII.

Quo differitur quo tempore contra aperire liceat, & quando nullo modo: & vtrum inter quartam, & quintam, vel tertiam, & quartam costam, atque qua parte sectio molienda sit, & de modo editionem, ac de instructo quoreferatio molitur.



QUOD AD REFERATIONEM attinet, nec illos sanè laudare chirurgos possum, qui pauco tempore, à vulnere

in parte pectoris superiore inflicto: nullo habito discrimine, quia melius (vt aiunt) mundetur, statim antequam omnia alia præsidia. Atque naturæ opus (vt liceret) experiantur: partem pectoris inferiorem, inter quartam & quintam, vel inter tertiam & quartam costam, satis temere aperire properant. Est enim tunc, proprie dolenti dolorem addere, & afflictum affligere, imbecillumque imbecilliorrem reddere: exhalatis inde nimirum spiritibus, atque genuino calore, & extraneo aere intus offendente. Nec ex diamentro, reprehendi minus sunt, qui pure intra pectus retento, non expurritione, non lorio. Nec alia vlla via à natura expulso, vulnerato in dies deterius se habente, etiam si externa aliqua pars tumeat, vel congregatum pus ex indicij appareat, virtute præsertim valida, contra aperire formidant. Quando quidem, ipse Hippocrates internarum affectionum, lib. superioribus videlicet concurrentibus: in purulentis, vel suppuratis, contra aperire sua sit. Idemque ex eadem (imo maiori) ratione, in penetrantibus pectoris vulneribus, vbi pus retinetur, conueniet: Cum in suppuratis, imbecillior multo ob temporis diuturnitatem, virtus sit, quam in vulneratis. Id ipsum, celebres alios authores Hippocratis vestigia sequutos, præcepisse legimus. Verum, si tumoris vehiculum aliquod exterius non appareat, virtusque ægri contracta sit, contra aperire non consulo. Ad secundum, nempe: an inter quartam & quintam, vel tertiam & quartam co-

Nullo modo statim vulnere accepto, contra aperire licet.

Reprehensio eorum qui apparentibus symptomatis, interioris puris, referatione differunt.

Virtute imbecilli nulloque tamore exterius apparente, contra aperire non licet.

stam

De Vulneribus thoracis.

149

stam, aperiendum sit, inter aliquos aucthores, dissidium reperitur. Ego vero Hippocratis doctrinam sequutus, anatomicisque administrationibus ductus, inter tertiam & quartam costam spuriam, prospero interdum successu. Contra aperire consueui. Prius tamen periculum quod imminet, prædicebam. Hæc tamen costarum connumerationem à parti inferiori facias, ab spurjijs videlicet costis, ut Hippocrati internarum affectionum, sæpe citato libro. Atque alijs ex neotericis, placet. Nam à parte superiore connumerare costas, absurdum esset, quippe cum, ad pus retentum nullo modo daretur aditus; nec ipsius exitus, nisi in uerso corpore: quod quam ridiculum sit; nemo est qui nesciat. Ex huiusmodi tamen apertione, haud in modica dubitandi ratio infurgit, si enim in anteriori pectoris parte vulnus contingat, (cum pectus duodecim costis utrinque constet: septem quidem veris, atque integris, quinque vero spurjijs, non integris, sed diminutis: ob maximas, & notas commoditates à natura ad inuentas. Easque costas, veras à non veris, pariterque spiritalia membra à nutritiuis, septum transversum diuidat incisione facta, inter tertiam & quartam costas spurias, quartam, atque quintam, simulque septo ipso transverso. Versus superiorem partem ratione incisionis, omisissis) videtur, incisionem frustra eo in loco fieri. Cum pus ipsum, cum ipso septo transverso, in quo continetur, in superiori parte necessario relinqui deberet. Nisi inter quintam & sextam, ultimam quidem ex spurjijs, connumeratone à parte inferiori (ut oportet) facta, & primam ex ueris, secares. Sed ad obiectionem respondeas sic procedere, si in pectoris anteriore parte, sectio moliretur.

Sed non quidem in anteriore, sed in posteriore, necessario fieri debet. Nam septum transversum (ut obiter etiam superius adnotavi) non quidem directe, sed diagonaliter siue oblique spiritalia membra, à nutritiuis, veras costas, ab spurjijs diuidit, nempe descendendo, quasi vsque ad secundam costam spuriam, versus spinalem medullam, ut anatome ostendit. Quare, siue vulnus in anteriore pectoris parte, siue posteriore: contingat, reseratio semper facienda est in lateris vulneris posteriori parte, licet Hippocrati, libro 2. de morbis. Placeat, in parte laeva reserationem esse faciendam sed hoc insuppuratis forte, ex eo, quod ibi cor, à retento pure, magis offenderetur, aut quia dextera pars, calidior cum sit, inflammationem magis accersit. Nescio tamen, qua id ratione defendi possit, nam si in dextera parte pus prolapsum, continenti reseratione in parte laeva pectoris facta, quo pacto mediastino prohibente pectusque secundum longitudinem diuidente, expurgari posset? nisi fingeres, corruptum iam esse mediastinum, sed hoc (saluo homine,) quomodo contingeret? Sed forsitan hoc dixit Hippocrates. velut quoddam præfagium, quasi diceret, periculosiorem esse in dextera parte reserationem ex supra dicta ratione. Caterum, oportet ab ipsa spinali medulla per tres, quatuorue digitos, in sectione discedere, ac per transversum, secundum costarum longitudinem aperire, sic enim, musculorum fibrae ea parte incedunt, Sed offert sese locus Hippocratis, libro 2. de internis affectionibus, ubi circa sectionem, parum sibi constans videtur, modo enim secari prius iubet, vsque ad costam; modo secari, ac simul vri, modo cum caua terebra costam perfo-

K 3 rari,

Dissentio au-
toru de lo-
coreferatio-
nis, atq; au-
thoris opi-
nio.

Obiectio.

Respon-
sio ad
obiectiones.


Respon-
sio ad
obiectiones.

Hippocra-
tis locus de-
claratus.

unum est
quod
est parum

rari. Hoc tamen ego sic conciliarem, ut si facta carnis sectione, vel vltione, inter costas, pus ob eius crassiciem, egredi non possit, tunc costa parum terebranda sit, sin minus. Ego tamen, Hippocratis sen-

tentiam, atque Galen. 6. lib. aphorismorum. 27. nec non Cornelij Celsi libro. 3. capit. 22. & Auice. Fen. 10. 3. tracta. 5. capit. 51. sequutus, subtili candenti ferramento (cuius hæc est effigies) aperire consueui.



Extenuanda sanus est lausacro per syphonem iniectione.

QUOD si fanies crassior sit, lausacro per syphonem iniectione, subtiliorem, quod egredi facilius possit, reddes. Vnde opus non est, in huiusmodi penetrantibus vlcerebus costæ terebratione.

CAP. XIII.

De methodo, obseruanda in refectione, tam vulneris in parte posteriori quam anteriori pectoris inflati, ac de varijs instrumentis ad abluendam pectoris cauitatem, extra hendumq; pus, idoneis.



LICET SVPERIUS dixerim, ad refectionem, ignitum cauterium mihi esse in vsu, suadeo tamen chirurgis. Parum in opere exercitatis, præsertim tumore exteriori vix apparente, ut rasorio potius,

vel scalpello sensim locum aperiant, ut interdum etiam feci, ac nonnulli iubent: sed inuoluto panno rasorio. Vel scalpello: cuspidem tantum detecta. Verum si tumor aliquatenus exterius emineat, resectione candentis tenui ferramento commodius multo fiet. Non solum enim locum aperit: sed profusum sanguinis cohibet, locumque roborat, materias exsiccat. Sed cur obsecro Galen. supra citato loco, super. 6. libro. aphorismorum. 27. in suppuratis vltione, in hydropicis vero, punctione, aut sectione uti iubet? An quia in hydropice, si actuali cauterio resectione fieret: crusta, aut scara. Necessario relicta, eaque postea remota, consequenterque ore vulneris extenso: tota hydropici aqua irruens, simul extra fluere, ob maximamque, ac subitam euacuationem, æger periret. Quæ interpretatio nostra, maximam habere videtur rationem, cui forsitan concinit auctor ipse Guido, vniuersali capite sui operis, qui secandi hydropicos modum docens, abdominis cutem, quantum fieri possit versus superiorem partem, contrahi, ac eleuari, dein de ferro pungere, vsque ad aquæ cauitatem iubet, aquamque per calamus, prout vires, virtusque ægri patiantur, extrahi: cutemque postea ipsius abdominis dimitti, in propriamque sedem collocari, ut

Authoris sententia.


Dubitanda ratio atque ipsius responsio.

Quo instrumento fieri debeat resectione.

ri, ut eius pars sana peritanei os coope-
riat: ne aquæ nimia, præter medici vo-
tum, egrediatur. At in suppuratis, id peri-
culum minime contigit. Cum inter co-
stas ad apertio fiat, quarum duricies. Atq;
coherrentia vna cum ipso linamento im-
modicum puris exitum (si quando eue-
nisset) coercerent. Sed non abs re erit,
subdubium illum aphorismum Hippo-
cratis. 45. sectionis. 7. interpretari, in-
quit enim quicumque vruntur aut secan-
tur, si pus purum fluxerit, & album, eua-
dunt. Si vero subcruentum, & foetidum,
pereunt: nam id perpetuo verum non est.
Nanque in vulneratis, subcruentum pus,
& aliquatenus foetidum egredi potest,

ægro interdum saluo, modo reformatio ^{ta simul fa-}
non serius multo fiat: sed eo tempore ^{nies.}
quo nondum prolapsus sanguis, ex vul-
nere iam diu retentus, in putredinem
prorsus conuersus sit. Quare ego inter-
pretor Hippocratis. sententiam, in sup-
puratis (de quibus ea in parte est ser-
mo) potius quam in vulneratis, pro-
cedere. Sed iam vnde digressi sumus
sermonem conuertamus. Vt igitur me-
lius contra apertio fieri possit, plum-
beum instrumentum huic operi ac-
commodum, circino omnino adfi-
mile ex meo (quod aiunt) marte
iam dudum ad inueni, cuius hæc est
imago.

Instrumenti effigies quo reformatio paratur, atque
modus referandi.



CIVIS adaptandi, aperindiq; me-
thodus illa est, immisso per vlcus
ipso plūbeo instrumēto leni, hebetē, lon-
go aut breui, prout aperiendus locus, ab
ipso vlcere distabit: & hoc sensim, do-
nec septum transversum tantis per tan-
gatur: tunc atramento eam partem signa-
bis. Vbi circini instrumenti cuspidem per-
tigisse, exterius editione aliqua facta, ap-
paruerit, vel ad summum, per transuersi
digiti spatium, supra locum, quē subtili-
ter, vel tenui candenti ferramento, vel
alio instrumento (si expediat ut dixi-
mus) ad internam vsque cauitatem me-
diocriter secabis. At si pus forsan abun-
dauerit, non simul, sed paulatim extrahe-

tur, ne spiritus, genuinusque calor exha-
lent, ægerque animi deliquium, ac forte
mortem incidat, ut periculo iam euenif-
se vidimus. Atq; ita Hippocrates. 6. libr.
aphorismor. 27. & Galenus in eius com-
mentario posteris faciendum esse literis
mandarunt. Verum si vlcus anteriorem
pectoris partem occupauerit. Cum rese-
ratio in posteriore eiusdem pectoris par-
te molienda sit, (ut iam superius ex ana-
tomica experientia probauimus) tunc
temporis plumbeum illud instrumen-
tum parum (imo nihil prorsus) prodes-
set. Inuestigandum ergo est qua nam me-
thodo sectio fieri debeat. Qua in rescire

Non extra-
henda est to

Signa acmē
thodas di-
gnoscēdipw

resq; magni ac pondus maximè infirmo supra latus oppositum subcumbente, infestant, coaceruati puris ibidem signa esse. Quæ si adsint, modo iam dicto sequare opus est: sin minus, ut contentum pus agnoscas, infirmum humeris adprehensum concutito, atque ubi sonitum audieris, secabis: quod docet Hippocrates in purulentis, at in vulneratis lauacrum intus solitus ego sum per vulnus immittere, quo sonitus melius percipiat, quod in suppuratis minime fieri potest: cum exteriore vlcere careant. Sed ante apertionem abluendus locus est multa aqua calida, tum ut apertioni locus aptior reddatur: tum etiam ut pus extenuetur, quod facilius per apertum locum effluat. Adde, aliud esse experimentum, aut indicium contenti puris: nam si vinculo linimento rubeo intincto, ægrotantis pectus alligaueris, qua in parte linimentum illud citius desiccatum conspexeris, ibidem pus esse iudicabis: quod docet Hippocrates libr. De internis affectionibus. At vero ego consulo nullo modo apertionem hanc fieri, nisi ubi tumor externam aliquam editionem fecerit, atque ipsius laborantis virtus tulerit: ex Hippocrate eodem, De internis affectionibus libr. simulque mortis periculum præfagire oportet, nam reformatio huiusmodi interdum prospero interdum aduerso successu à me facta est. Aperto igitur loco mediocriter (ut diximus) linamentum vaccineo butyro liquefacto illitum nouo vulnere admoueat, veteri absque linamento dimisso: ut aptius agglutinetur, ne orificijs duobus magis natura offendatur: admissio nimirum extraneo aere, natiuoque calore, spiritibusque exhalatis: sed si forsitan antiquius vulnus callosam cicatricem circum circa iam contraxerit, scalpello dirumpere opus est: ut cruentato


vlcere, eius oræ aptius coalescant. Deinde in vulneris ambitu, oui candidum rosaceo, atque lumbricorum oleo agitat, cum stupis impones: verum si forsitan contra apertio sera moliatur, pusque foetidum egredi conspexeris: tunc vaccineum butyrum non intromittes, ne putredinem putrefactioni addas: sed medicamentum digestiuum inscriptum, ex terebinthina, oui vitello, puluereque crocei aliquo commixto admouebis. Deinde post duos tresve elapsos dies, emundantibus medicamentis, atque exsiccantibus (de quibus superius sermo fuit) recens illud vulnus curabis, atque antiquum linamento prorsus statim semoto obturandum est, ex citato prius sanguine: conglutinosoque aliquo (ex supradictis) medicamento admoto, ac deinceps, omnem curam ad nouum illud vulnus reformatione factum conuerteris, cui lauacrum aliquod (ex superscriptis) accommodatius, per syphonem intromittes: ac sensim locum interiore munda dabis, exsiccabis, ac tandem vulnus conglutinabis. Non solum (ut antea admonuimus) medicamentis exterius admotis, sed ore exhibitis, quorum iam meminimus. Sed quia per syphonem aer semper simul cum ipsa lotione, intra pectus immittitur, cogitavi, quo pacto id malum præcauerem: ac tandem duo alia instrumenta excogitavi, quibus sine hoc incommodo lauacrum satis accommodè injiceretur. Primum plumbeum est, cuius os instar infundibuli est: quod sequitur vero angustum, ac longum: versus cuspidem etiam hinc inde perforatum, ut lauacrum ad utranque pectoris partem infundi melius possit. Hoc igitur instrumento, intra vlcus admoto, immissum lauacrum sensim per ipsum ad pectoris cauitatem traicitur, cuius hæc est forma.

Insera contra apertione butyro vaccineo non est vitandū.

Alius modus cognoscendi puris.

Præfagire oportet infirmi mortem ante reformationem.


Vulnus antiquius quam claudendum facta reformatione.




Secundum instrumentum.

Secundum instrumentum constat ex fuilla vesica, intra barsam tenuissimi corij
intromissa, atque ligata, cum eburneo ore. Lauacrum in ea intromittitur tepidū
per argenti infundibulum, cum calamo, vel argenteo vel eburneo affixo: tunc laua-
crum illud intra thoracis cauitatem manu exprimitur. At (si forsan) lauacrum vel pus
intus retineat, vt foras prodeat, quidam cucurbitulam vlceri affigunt: quidam verò la-
biorum suctu: alij autem piulca educunt: cuius meminit Gal. 5. meth. cap. 8.

Totius simul instrumenti ecce figura.



Infundibuli figura.



Immisso, igitur per aliquod (ex supradictis) instrumentum decocto, tunc ex-
ger tussire, spiritum que ore, & naribus
clausis, continere, atque hinc inde volui
K s debet

Aeger hinc
inde volui
debet ut p
expellatur.

Obiectio.

Solutio ob-
iectiois, Et
Nicolai Flo-
rentini re-
prehensio.

Galenus me-
 exponitur.

Casus admo-
dum diffici-
lis.

debet. Postea super vulnus decumbere, ut pus omne lotione iam dilutū, & commixtum simul foras mittatur. Sed in hac nostram sententiā forsā quispiam obijciat: perperam nos huiusmodi tussim atque commotionem precipere: cum Nicolaus Florentinus sermone. 7. capit. De vulneribus thoracis penetrantibus (vbi Galenum etiam lib. 5. metho. cap. 8. in testem affert) contendat, huiusmodi vulneratos, à tussi, à motu, atque agitatione summopere cauere oportere, ac sub silentio esse. Sed errat in hoc vir ille aliqui doctissimus: omnes enim & veteres, & recentiores, in Apollinea arte clarissimi, contrarium docuere, ipsaque experientia docet. Nam si quies, tranquillitasque illa obseruaretur, in pectoris cauitate cōtenta sanies, nullo modo foras prodire posset. Et ad Galeni auctoritatem ab ipso Nicolo perperam adductam, dicendum, ipsum eo in loco, non de vulneribus pectoris penetrantibus: sed de alicuius principis venæ interioris disrptione, casu, vel valida vociferatione facta, agere, vbi tussis, anhelitus retentio, ingēs motus, atque loquacitas, diruptæ venæ osculum per rumperent, ut ex Galeni serie manifestè constat. At in sanguine, vel purè, ex vulnere intra pectoris cauitatem coaceruatis. Longè aliter euenit. Nam necessario æger (ut diximus) lauacro iniecto, tussire, atque spiritum retinere, corpus hinc inde agitare, atq; in omni motu versari debet, atque etiam inflare, ut vitiosa quæque humiditas in pectore clausa melius expellatur. Vnde non abs re eadem monstruosum hic casum (difficilem quidem creditu) narrare. Nam iuuenis quidam Martini Muniofi oppidi incola,

in posteriori pectoris parte vulneratus, magno atque alto vulnere. Ex quo tamē in vndecimum vsque diem nil sanguinis, nec puris, expuitione, nec vlla alia via effluxerat: me ex ciuitate Abulēsi (vbi tūc degebam) accersiuī, ut opem ei afferrē: & cum multa, quo sanies emitterē, frustra experirer, inlasi ipsum cornū, seu buccinā, quanta posset vi, insufflare, & ecce coram multis, qui huiusmodi inuentio- nem prius irridebant, multa puris latentis intus quantitas egreditur: paulatimq; pectus à sanie mūdatur, atque post tempus ægrum pristinae sanitati (præter omnium atque etiam meam spem) ad Dei gloriam, Deiparisque virginis, restitutū videres. Sed ut huic tractatui finem iam imponamus, illud admonēdum, post pectus à sanie emundatum, exsiccatis, atque agglutinantibus interius & extra (prout latius dictum est) vti conuenire. Paulatimque linamentum seu tentā minuere, alotioneque ipsa cessare: posteaq; prorsus linamentum auferre: tunc nimirum qñ lauacrum ipsum immissum omnino liquidum & clarum egrediatur: manifestum scilicet mundati pectoris indicium. Deinde per aliquod temporis spatium æger emplastrū aliquod ex his quæ locum corroborandi vim habent, supra vulnus, partesque circumstantes gestabit: quale esset cæroneum, vel centaureum, aut vtrunque mixtum: addito granæ selectissimæ puluere, momentoque moschi, & ambari grisij. Et sic finitur lib. hic tertius, ad laudem omnipotentis Dei, eiusq; beatissimæ matris virginis Mariæ:

quorum auxilio nostros hos
labores Reip. vsui futu-
ros speramus.

Finis Libri Tertij.

ANDREAE ALCAZARIS
Medici, ac Chirurghi.

Liber Quartus, De vulneribus ventris inferioris, regionis abdominis.

CAPVT PRIMVM.



Ventris inferioris quædam continentes partes, quædam contentæ.

CVM IN SUPERIORIBUS libris, de vulneribus superioris: atque medij ventris, nempe capitis, & thoracis, egerimus. Nunc de ventris inferioris regionis, abdominis, vulneribus, differamus nempe à septo transuerso, ad reliquas vsque alui partes. Membrorum igitur totius inferioris ventris, alia contentoria, alia vero contenta sunt. Continentia à parte anteriori, abdomem, ex cute, pinguedine, panniculoque carnosio, ac musculis constans, atque peritoneum, membrana nimirum neruea, fortis. Omentum & intestina amplectens, quam ex duplici tenuissima membrana, constare, Galenus sexto metho. cap. 4. asseruauit, quamuis (vt inquit) plerique ex anatomicis geminas esse, minimè norunt. Cum ita cohæreant, vt labor sit eas separasse & summa pterea sint tenuitate prædita, à posteriori vero parte, sunt vertebræ renū, quinque, & caro ipsis supposita. Contentæ partes sunt, omentum, ventriculus, intestina, hæpar, fel, splen, mesenterium, renes, & vesica, cum matrice, licet hæc inter partes ab ischijs procedentes, rectius connumerari possent. De his igitur inferioris ventris vulneribus, differendum nobis est, sed de causis, signis, & prognosticis prius tractemus.

CAP. II.

De causis Vulnerum ventris inferioris.



Vulnerum ventris causæ, quæ aliorum omnium sunt, quæcunque videlicet, scindunt, pungunt, dirumpunt, continuumque soluere apta, vt ensis, gladius, pugio, fœca, hasta, sagitta & si quod aliud telum est.

CAP. III.

De Signis.



Signa horum vulnerum exteriora, vt aliorum oim, visu, tactuque intelligunt, sed an interiora pertigerint, necne, nõ nisi alijs indicijs percipiunt, voco autem nõ penetras vulnus, qd ad peritoneum vsq; pertrahit: penetras, qñ eo disrupto, Omentum, vel solū, vel cū intestino aliquo, foras emittit. Nõ penetras vulnus, in misso digito, vel exerea candela, vel omentum neq; exciderit, neq; appareat, intelliges. In quo tñ, præcauedus est, chirurgorum vulgariū in huius explorandis vulneribus, error: qd ab dñe dūtaxat vulnerato, longe diuagatum esse vulnus existimant: eo decepti, quod digito, aut specillo, abdomem non difficile à peritoneo separatur. Vnde linamentum per longum immittit, quo dolor magnus infurgit, inde fluxio, inde inflammatio, ac sæpe vulnerati

Signa vulneris non penetrantis.

Error quorundam chirurgorum.

nerati mors contingit. Qui si animaduerterent, ab domem ipsum peritoneo non continuum, sed contiguum esse, ac sine magna difficultate separabile, non ita de-

ceptantur. Quare consulo, leuiter ac sine vi villa, huiusmodi vulnera siue digito, siue specillo, explorari. Penetrantis vero vulneris indicia sumpto, omenti, vel

Signa vulneris penetrantis.

intestini. Aliquis exitus, sed quia præter penetrationem ipsam, interdum etiam interiora membra læduntur, igitur de læsionis ipsorum signis agamus. Prius igitur vulnerati ventriculi hæc sunt signa, ut auctores, ac ipsa experientia docet; biliosus vomitus cum sanguine interdum, atque ipso cibo commixtus, interdumque puri sanguinis interdum vero solum cibi per vulnus emissio, ut rupto intestino, egestio egreditur. Appetitus prostratio, singultus, extremorum frigiditas, syncope, Pulsus imbecillus, Dolor præterea ad clauiculam vsque protenditur augefcitque, cum acida, atque mordicantia fauciatus edit, vulnere potissimum in ventriculi ore inflicto. Est enim ea pars nervosa, summaque sensibilitate prædita, quo fit, ut sæpius deliquium animi ea læsa pro uocet, ut de fatigato corde contingit. Quæ ratione, antiquiores ventriculi os, cardiam, id est alterum cor, nuncupauere.

Hepatis percussio nota.

Hepatis vero percussio notæ illæ sunt, percussio sub dextro hypochondrio, rubri sanguinis profusio, dolores, punctiones, ad iugulum vsque ascendentes; biliosus interdum vomitus; præcordia: spinam versus contrahuntur, cibi fastidium, indigestio. Signa vero fellis percussæ, Bilis per vulnus profluuium, ut Razes: 14. continentis testatur, atque ipsa experientia docet, quemadmodum vesicam incisam, lotij exitus in sequitur. Splenentum indicant, percussio in sinistro hypochondrio, crassus, niger, exiguusque profluens sanguis, præcordia ex eadem

Splenis ictu signa.

parte, indurescunt. Vulneris renum signa, lotij, vel difficultas, vel omnino nulla emissio & si quid emittitur, subcruentum, vel prorsus sanguineum. Vulneratorum vero, quorundam intestinorum

Renum vulneris signa.

ieiuni, ac portanarij (sic enim denominantur) indicia communia sunt, cum his quæ vulneratum ventriculum sequuntur. Nempe, per vulnus cibi, ac potus exitus, biliosus vomitus. Reliqua vulnerata esse intestina ostendunt, vel stercus prodiens, vel eius fœtor, seu graneolentia, vel utrunque, cum flatu aliquo.

Intestinorum ieiunij, ac portanarij culorum signa.

Intestinorum vulneratorum nota.

C A P. IIII.

De Præfagijs.



T à vulnerati ventriculi præfagijs exordiamur, scire, oportet, ut ex illustriū auctoriū monumentis præfertim Galeni. 6. method.

4. capite: constat, ipsaque docet experientia, in ipsius ventriculi ore inflicta vulnera, exitalia esse, ex eo quidem, quod locus nervosus sit, consolidationi ineptus: sensibilis nimis. Accedit, quod exhibita per os medicamenta, non nisi cursim vulnus attingunt, neque ibidem morari possunt. Contrario euenit, in vulnerata ventriculi inferiore parte, quæ cum carnosa agglutinationique apta sit, & in qua medicamenta ore sumpta detinentur, medicabilis atque sanabilis sæpe redditur: ut Galenus citato superius loco aperte demonstrat, quanuis cibi, potusque humor sæpe agglutinari huiusmodi non sinat vulnera. Vnde non parui à me æstimatum est, dum nautam quendam curarem, in carnosa hac parte vulneratum, cibo etiam per vulnus egredientem, ad

Exitalia sunt vulnera, in ore ventriculi, sed contra in parte inferiore carnosa.

Carnosa nota.

De vulneribus ventris inferioris. 159

te, ad Dei gloriam, sanitati fuisse restitutum, vidi præterea alium, ex magna ventriculi inflammatione, iam dudum suppurata, suaque sponte dirupta, per vlcus paulatim, cibum semper emittentem, multum tamen tempus vixisse. Hepatis vero vulnera, siue magna, siue in parte eius caua sint, nisi in summa tantum superficie, lethalia sunt, ob præcipuas nimirum venas, quorum origo, ipsum est hepar. Accedit, esse naturalis virtutis sedem, quæ vniuersum corpus gubernat. Splenis vulnera non adeo exitialia, cum eius functio, ac officium, non tam vitæ sit necessarium. Vulnera renum periculo non vacant. Nam cum vulneratione, reddantur imbecilliores, aquaticum humorem, neque à iecinore separare, neque trahere valent. Vnde, & hepar, & ipse sanguis offenditur. Cæterum, intestinorum gracilium vulnera, quæ ordine, in superiore ventris parte sunt, in sanabilia prorsus, ac lethalia iudicantur: vt ex Hippocrate Apho. 6. 18. & Galeno, in eius commentario, & 6. meth. ca. 4. constat. Tum quod tenuia valde, tumque exangui sunt. Idque potissimum in ieiuno intestino euenit, vt Galenus citato loco affirmat, ex eo, quod eius tunica neruosa, præ tenuis est, nec non, quod totam, puriorem bilem, ad se trahit: vicinioremque hepatis locum obtinet. At vulnera, quæ crassius in testinis infliguntur, sanabilia sunt, vt Galenus, citato loco aperte censet. Quod præter anatomem: ipsum longam, seu rectum intestinum, carnosum, etiam manifestat. Nam licet sæpe foras prolabatur, ac vlcerosa corrosione infestetur, sæpe numero tamen, pristino loco, atque etiam sanitati: restituitur, vt periculo in comperto est. Idemque cõspicitur, cum sectio in extrema eius parte molitur: quãdo in sedis penetrante fistula, vtrumque, & sedis, & fistulæ orificium, falce vnitur,

vt authores docent. Fit enim hoc securè, nanque sunt huiusmodi intestina, crassissima atque carnosæ, consequenterque, agglutinationi, quam maximè accommoda. Circa quod, ego mea tempestate, monstruosos casus interdum vidi, quorum aliquos narrabo, quidam ex intestinali hernia, inguinis sectione, deligatione, & testiculi cum sua membrana (vt fieri solet) extractione, curatus fuerat, ob laxam tamen funiculi deligaturam, ante completam agglutinationem, vulnus diruptum fuit, & per vomitum, per totam vitam, stercus semper emittebat. Non dissimilem casum narrat Albucasis, libro secundo. capite octauo. de quodam, qui hasta fuit vulneratus, vidi præterea alium, cui lapis incisione fuit extractus, qui per fistulam manentem, excrementa emittebat. Et Salmantica, dum hæc scriberentur, hisce oculis vidi hominem, cui ob seram apertionem, inflammatum serotum corruptum, putrefactumque fuit: & tandem cum aperirem, ecce pus, pariterque lotium, cum egestionem prodire. De vesicæ vulneris præfatio, nunc dicendum, & prius Hippocratis in hoc, Aphorism. sexto. Aphorism. 18. & Galeni, in eius commentario placita afferam. Deinde quod me experientia docuit. Vesicæ quidem corpus, cum duplici, neruosa, tenui, exangui, atque consolidationi inepta membrana consistet, fit, vt corporis ipsius vulnera, mortalia ab Hippocrate, & Galeno, citatis in locis iure optimo censentur, verum secus in vesicæ vulnerato collo contingit. Est enim sanguineum, carnosum, corpulentum, ad agglutinationem aptum: vnde vulnus ea in parte, facile sanatur: vt quotidie in extracto à vesica sectione calculo, videmus: & affirmat Galenus, in dicto commentario, & mea tempestate, dum ciuile bellum con-

Casus satis admirandi.

Vesicæ vulneris lethalis Hippo. censetur.

Vulnus colli vesicæ, agglutinatum.

ira Carolum Quintum, imperatorem inuictissimum, apud Toletum arderet, curavi commilitonem, prope ischiam, sæuissimè ense vulneratū, cui, per quindecim dies, lotium, per vulnus exiuit (res incredibilis) & Dei nutu, præter omnium spem, sanatus est. Similem casum depingit Gal. libr. 1. de locis affectis. capit. 1. Et ad ipsius auctoritatem citato Apho. dicendum, eum intellexisse, non leue, sed magnum, altumque vulnus, ipsam vesicam dissecās, aut dirupens, esse lethale, quod verba illa aphorismi, scilicet, discissa vesica, ostendunt. Atque ita innuit Galenus ibidem. Vel dicas, in illo admirando casu, vulnus vesicæ collo propinquius, quam ipsius corpori, fuisse: unde agglutinari non fuit impossibile. Vel denique dicas, cum Auerr. 7. colliger, interdum euenire monstrum in morbis, quemadmodum in ipsa natura. Vidi etiā Salmantinum scholarem, per sedem, vrinam prorsus excernētem, quod malum, ex sedis iam dudum suppurata inflammatione, valdeque sero aperta ei contigit. Circa muliebris vteri præsagia, Auenzo. libr. 2. tracta. 5. antiquorum auctoritate ductus, censet: etiam si totus muliebris vterus prorsus excisus, aut amputatus sit: nullum tamen vitæ periculum, mulierem subituram, cum nullo alio vsui muliebris vterus sit, quam ad venerem, & conceptum appetendum. Et vt præciso virili membro homo viuit, sic mulier vtero. Describit etiam ipse Auenzo. ibidem. quæ ratione prolapsus vterus curetur, sub positis nimirum mulieri, filo alligatis muribus, quod ego in Abulensi muliere, expertus sum, quæ per biennium, vterum à propria sede tractum, forisque pendentem habebat, vsque adeo, vt vlcerosa excoriatione, iam coxe afficeretur. Iussi enim, vt sub cruribus alligati mures subito mitteretur, quo facto, cum

mulieri metus vehemens incuteretur, ecce, repente, vterus impropiam sedem reductus est, mirabile visu, vidimus præterea postmodum, mulierem, cui per longum tempus foras pependit exulceratus vterus, citra tamen mortis periculum.

C A P. V.

De curatione vulnery ventris.



N curatione quidem ventris vulnery, animaduertere oportet, quædam in continētibus partibus contingere, quædam vero ad contenta vsque mēbra penetrare. Quædam etiam ipsa interiora lædere, ac percutere. Quorum distinctio, signis, indicij, atque symptomatis, quæ in superiori capite continentur fit. Igitur à non penetranti, vt à simpliciore, incipiamus. Et quidem curatio non penetrantis vulnery, ab ea, quæ incarnoso vulnere molitur, non dissidet. Consuendum enim est, & enæmis, seu agglutinantibus medicamentis curandum, facta reuulsione, vel per artium frictionem, vel vinculi constrictionem, vel denique ex talo, sanguinis missionem. Obseruatis etiam bona victus ratione, ægrotantis temperatura, ætate, regione, virtute, atque consuetudine, vt capite. 6. præcedentis libri admonuimus, & ipse Galenus passim monet. Quibus vero medicamentis vtendum sit, ibidem latissimè scripsimus. Sutura communis satis in his vulnerybus sufficit. Sed deligaturam ad humeros, ad cruraque vel solam, vel fasciis quibusdam confutis (ne inconstans sit) adstringi oportebit. Verum, si huiusmodi vulnerya contusa sint, suppuranda prius

*Imago lo-
nate aly
bellarum,
p. 945.*

Casus satis
reuer-
endus.

Cuius stu-
pendus.

De vulneribus ventris inferioris. 159

prius quā agglutinatorijs, aut sarcoticis vtaris. Iuxta Hippocratis vulgarem traditionem, tum de vlceribus, tum de vulneribus capitis. lib. atque Galeni, ipsum sectantis. quarti method. capite quinto. Auicennæ. Fen. 4. quarti. tractatu. 3. capite secundo. vniuersali, de vlneribus, affeuerantium, contusam carnem, prius suppurari, vt minus flegmone corripia- tur, postea de ficcari.

CAP. VI.

De curandis Vulneribus to-
tius ventris inferioris, quan-
do ad interiora membra
penetrant.

IN curandis penetrantibus ad interiora ventris inferioris vulneribus, illud præmittendum duxi. Nullam apud auctores dissi- diū reperiri, quemadmodum in curatione vul- nerum ventris superioris. Nempe capi- tis, atque ventris medij, scilicet, pectoris reperitur. In capite enim cum fractura cranij penetranti vulnerato: auctores du- bitant an perforatione & linamentis vul- nus curandum sit an non: in pectoris vul- nere vero penetranti vulnerum: an clau- dendum futura, vel agglutinantibus me- dicamentis sit, an linamentis apertum re- tinendum, at vero in hoc inferiori ven- tre omnes conueniunt.

VT vulnera pectoris consuantur, at- que enæmis siue agglutinantibus, siue li- namentis curantur, hoc docet Auice. 4. quarti. tract. 1. c. 7. probatque Cauliacus auctor, efficacissimis rationibus, conuin- citurque vulgatissima illa regula, scili- cet, si quod magis videtur inesse, &c. Nā

si in vulnerato pectore, natura ipsa, quan- uis putrefacto intus sanguine aggrauata, per lotium, aut secessum, aut etiam apo- stima ad inguina, sæpe saniem expellere valet, vt Hippocrates de internis affect. lib. Gal. lib. 6. de locis affectis. cap. 4. duo- bus in locis. & Auic. 4. quarti. tract. 2. cap. de casu, & offensione testantur: & ipsa ex- perientia demonstrat. Quanto fortius, materiam intra ventriculum, vel intesti- na contentam, per excrementorum, aut vrinæ meatus, loca quidem aptissima, ip- sa natura nullo impedita, expellet. Verū, licet huiusmodi vulnera futura, aut ag- glutinatorijs curētur, non tamen vsum li- namēti, perpetuo chirurgicis interdicto. Nam si tumor aliquando vel à sanie, vel à concreto interius sanguine, in aliqua vulneris parte infurgat, qui per vulnus ex- purgari nequeat, tunc apertione paruula decliuiori loco facta, linamentum, breue immittendum est. Caterum, circa qua- tuor potissimum versatur, tota curandi huiusmodi vulnera ratio, ex Gale. 6. me- tho. cap. 4. primum, in intestinorum re- stitutione, si qua pro lapsa sunt, consistit, cui addito, omenti demissi, aut folius, aut cum intestino, in suam sedem repositio- nem. Secundum, in loco suendo, Tertiū, in medicamentis applicandis, Quartum in præcauendo ne princeps aliqua parti- cula ab affecto vicino, loco offendatur. Ego addo quintum, qualiter nempe vul- nerati corpus collocadū sit, ac decum- bere oporteat. Sed quæret aliquis forsi- tam? Cur non solum Guido noster, Gale- ni in cunctis imitator, sed Galen. ipse, in omni vulnerum ventris, curatione, san- guinis missionis vel pharmaci exhibitio- nis, non meminerint: quæ antecedētem materiam (quam vocant) euacuare va- lent, vt alijs in morbis ipsi passim. Cur- ue Gale. deuictus ab ægrotante seruanda ratione, nec verbum vllum fecerit. Sed

Scopi in cu-
ratione ob-
seruandi.
Dubia.

Solutio de-
bij.
causa

Ventris vul-
nera pene-
trantia absq;
linamentis
initio cura-
da.

Argumentū
a fortiori.

causa esse potuit, quod neminem latere putauerint, per tritum Canonem, nempe, virtute, & ætate ferentibus, sanguinis missionem: atque in ediam, etiam in leuioribus vulneribus conuenire. Nam licet negatiue locus ab auctoritate, in rebus dubijs vrgere aliquatenus videatur, in insignibus tamen, & claris, non conuincit, sed arbitrandum est, tanquam notas, ab auctoribus prætermittas esse. Sed

Aliud dubium.

Solutio dubij præcedentis.

quid de pharmaco dicendum, cuius in hac curatione oblitus videtur Galenus, quod quidem, vulneratis, ad minuendam antecedentem materiam, vel cacochimiam, accommodum esse, nemo est, qui nesciat. Sed respondendum, non sine magno consilio, Galenum silentio prætermisisse & solius euacuationis per clistere meminiſſe euacuationem, quæ per pharmacum molitur, an quia præceptum illius est. 4. metho. capi. sexto. Hippocratem imitantis. & 13. eiusdem methodi capit. 6. & 11. alijsque in locis, intestinorum: colle ac sedis morbis laborantibus, pharmacum exhiberi, perniciosum valde esse. Cum tunc à totius corporis superioribus partibus: ad affectam particulam, excrementa deferantur. Imo è contrario, in his inferiorum partium affectibus.

Vomitum conuenit affectibus inferioribus.

Vomitum mirum immodum conferre docet: quod ad opposita materiam impellat, ac simul euacuet. Sed certe, si fides aliqua hac in parte mihi (qui vltra quinquagesimum annum in chirurgia, ac medicina, infudau) haberetur: vomitum his ventris vulneribus, præsertim aliquo intestinorum læso, perniciosissimum esse censerem. Maxima enim vi, & conatu, ex ipso vomitu concitatis, ventris vulneris, præcipue si magnum esset, dirumpetur. Neque est (vtopinor) sui compos vllus, qui hoc negare possit. Sed quid ad Galeni, Hippocratis, & aliorum sententiam, vomitum, in inferioribus affecti-

bus commendantium, dicendum. Et existimo (vt ipsa ratio suadet) intellexisse illos, in intestinis, colle & sede: non quidem vulneratis: sed inflammatione, vel alio quopiam affectu correptis, vomitum conuenire: vnde non abs re Galenus citato loco, clysteribus duntaxat, ad deriuandam materiam, in ventris vulneribus vti suafit.

Conciliatio sententiarum Galeni cum Gale, serie.

CAP. VII.

De ratione reducendi intestina, & omentum, extra ventris vulnus prolapsa.



T igitur, quinque superiori capite proposita prosequamur. Primum, de reducendis intestinis, atque omento, doceamus, in quo animaduertendum est, duo impedimento esse, quominus hæc in pristinum locum collocentur: nempe, aut vulneris artum, & strictum osculum, aut contrario amplum. Si enim angustum sit, siocyssime non reducuntur, ambientis aeris frigiditate, vsque adeo intestina inflantur, vt restitui (nisi difficillime) nequeant. Si vero amplum, facile labuntur, atque excidunt, difficiliusque flatu exterioris contracto reuertunt. Quare, haud immerito Galenus ipse citato loco, in mediocri vulnere, non adeo difficilem esse curationem arbitratus est. Ergo si breuius vulnus contingat, occurratque illico dexter Chirurgus, manibus, atque calfactis pannis, antequam intestina inflentur omentumve frigeat, in locum suum suauiter reponere procuret. Et futura facta (si opus sit) & rubro puluere, de quo in antidotario inferius describendo, su-

Modi reducendi omentum & intestina.

Vulneribus ventris penetrantibus vomitum non conuenit ex auctoris sententia.


De vulneribus ventris inferioris. 161

do, super inperfo, vel terebinthina, panno applicata, medeatur. In ambitu vero, & supra vulnus, oui candidum, commode agitatam, cum stupis adaptabis: ac de super, latiore panno, aceto centaureæ decoctionis madefactum, quod sanguinis profusio, ab internis partibus immunes, arceatur, vnde Auic. Fen. 4. 4. tracta. 1. c. 7. de huiusmodi vulneribus agēs, inquit. Interio in eo, quod existimamus, quod est fissura, aut disruptio interius est vt incarnetur, & non dimittatur sanguis coagulari, in interioribus, ita vt prohibeatur fluxus sanguinis. Et subdit, & melius medicamentum ad hoc est, vestimentū quando decoquitur in aceto, hæc ille. Cōtrouertunt tamē doctores, Auic. interpretantes, quid sibi velit ipsi in illis verbis, scilicet, vestimentū quando decoquitur in aceto. Et exponunt, id est pannus lini, ex aceto decoctis. Sed à medica quodā Arabica in lingua doctissimo, audiui, in originali Auic. non dicta verba sed illa, nepe Cētaurēa in aceto decocta, staret, Egoq; medicū illum, atq; ipsam rationē sequutus, panno Centauræ, atque aceti decocto madefacto vtor. Deinde enā mis me dicamētis, vt vngueto gūmi vernicis, vel ex glutine, atq; styptico vino, de quibus

inferius agemus, Sed si (vt sæpius euenit) intestina, aut omentum, in angustum vulnus intromitti, quantūuis, chirurgus sua industria conetur, non possint, tunc vt al legato loco docet, Galenus altero duorū opus est, aut aeris intra intestina inclusi euacuatiōe, quæ per insensilem fiet exhalationē, aut vulneris ampliatione. Ad primū, cōfert nigri vini calidi cū spōgia foetus aut auis aliqua, per medium incissa, ægrotante supino, cruribusq; eleuatis, decumbente: super posita: aut alia: quæ eandem vim retineant. De quibus in Antidotario latius. Sed si his omnibus in arcto vulnere tentatis: res forsā non succedat, tunc, ad vulneris ampliationem, per syringo tomum instrumentū, ad incidendum fistulas accommodum, iuxta Galeni placita, perueniendum est, fistulæ tamē, instrumentique nomen, duplicem per se fert intelligentiam, aut enim significat id, quo fistulæ hoc est muscales tibiæ subcauantur, aut quo sedis fistulas secamus, quando nimirum vtriusque orificium vnitur: prout authotes docent. Est id, instar curuatæ falciculæ, altera tantum parte secantis, hebetæ cuspide, quæ iam diu apud me est, cuius hæc est effigies.

Duplex instrumenti, & fistulæ significatio.

Hæc est effigies.



Instrumenti effigies.

Reductis igitur intestinis, calfacies calidis pannis crebro applicatis, & alijs, quæ latius in illo Antidotario describam. Exhibebis nec non potionem aliquam,

L

quam,

quam, exijs, quæ lib. de vulneribus thoracis dictæ sunt. Illæ enim cum saniem, vel intus coaceruatam sanguinem discutiât, ac expellant: ex pari ratione, in his etiam vulneribus, conueniens. Sed antequam ad alia sermonem conuertamus, narra-

Casus stupē-
dus.

bo casum, qui Segobiz mulieri cuidam accidit, cum maxima inguinis inflammatione corripere, sponte sua, ei aperta est, peritoneique membrana sensim corrupta. Et cum humeris disparem quandam farcinam sustineret, ecce peritoneo disrupto. Intestina omnia subito irruere, atque progressa sunt: circumstantibus haud immerito stupefactis. Accercitus ego toto conatu, atque opera, in suam sedem paulatim intestino reduxi. Apposito de super prius anserē, per medium scisso, lacrimis de quibus inferius, etiamque futura, instaretis, vti. Sic mulier ad Dei gloriam, & beatissimæ eius matris, præter omnium, & meam spem, sanitati restituta fuit.

CAP. VIII.

De omento interdum excidendo & qua ratione.



IRCA EXCIDENDUM omentum, iam superio-
ri capite præmissum est. Conuenire, cum extra vulnus prolabitur, antequam ab externo aere infestetur, in suam sedem repouere, alias enim, facillime liuesceret, ac putrefieret. Teste enim Hippocrate. aphorismorum. 6. aphorism. 98. cum omentum excidit, necessario putrescit. Licet hoc tunc verum: obtineat, cum longa mora ab elapso omento contracta est. Sed si reduci omentum non contingat: danda opera est, vt à naturali dispositione

iam prorsus mutata. Ad nigricans eius pars, amputetur: vt Galenus. 8. method. capit. 4. & de vitiis partium. 4. capit. 9. docent. Licet hoc non sine magno incommodo fiat. Si insignis omenti pars præcidatur, cum inde frigidior, & ad cibi concoctionem peragendam, imbecillior ventriculus reddatur. Hoc inuit Galenus, supra citato loco de vitiis partium, ubi, omentum totum vulnerato gladiatori se ademisse narrat. Qui licet sanatus, patiebatur tamen, & lædebatur ab externa frigidityte, vsque adeo vt non sustineret, nudum habere ventrem, deficiente nimirum nativo calore, qui ab omento, ipsi ventriculo præstabatur. Præsertimque (meo iudicio) contingit macilentis, secus atque in obesis, in quibus vepinguedo, ita & calor exuberat. Capiet ergo (cum curare voles) hæc eam partem, filoque forti alligato, deinde, nouacula quam ocysime amputabis, ipso filo extra vulnus pendenti relicto. Quemadmodum, quando in intestinali hernia inciso inguine, testiculus cum interna membrana extrahitur, fieri assoler. Vt facta interius agglutinatione, à natura, funiculus melius expuatur. Sed dum curatur æger, frigus etiam æstiuo tempore, fugiendum, imo ad moto igne, & cubiculum, & ipsa applicanda medicamenta cal fieri iubebis. Sed

Animaduertio casus Galeni.

Modus alligandi omentum, atque sciendū.

Dubium.

Solutio dubij.

Quod in herniosis minime contingit.

CAP.

De Vulneribus ventris inferioris. 163

CAP. IX.

De abdomine, ac peritoneo vulneratis, consuendis, deque præcis intestinis curandis.



VM ipsum quidem abdomen ex substantia quadam carnosa, atque musculoſa, agglutinationi accommodata: Peritoneum vero

è diuerſo, extenui, neruoſa, non prima intentione agglutinabili conſtet: ſit, vt Galenus. 6. meth. cap. 4. atq; alij multi, in huiusmodi conſuendis vulneribus, qñ ipſum peritoneum conſolidationem ipſam à ſanguine, quaſi à vicino, mutuo accipiat, iubeant non ſimul abdominis & peritonei oras ſuere: Sed prius, per abdomen tantum acu tranſmiſſa, relicto in ea parte peritæneo, in altera, peritæneū ſimul cum abdomine, futura iungere, & è diuerſo, in altera parte ab domem tantum acu trajcere, in oppoſita vero vtriuſque oras, donec totum vulnus hoc modo conſutum ſit. Nam ſi abdomen cum abdomine, peritæneum cum peritoneo vnires, ob abdominis laxitatem, inteſtina foras dilaberentur, peritoneo illorum fulcimento non conſolidato, ſed duntaxat, carnoſo abdomine: quemadmodum in herneofis accidere ſolet. Hoc nos Galenus allegato. 4. capite docet: ſed obſcure ſatis, ac longiore oratione. In ſuper alij ſunt ſuendi modi, à Galeno, & alijs traditi. Nempe communis, vbi vtraque pars abdominis ac peritænei conſuitur, Sed abdominis ora, parum peritæneo ſuper poſita: Sic enim aliqualis conglutinatione ab ipſo abdomine peritoneo mutuatur. Alia futura eſt duplicata, quæ per vulneris latera molitur, nempe, ſuper ipſius oras filo non tranſmiſſo, ſed apud latera in

nodato deinde exciſſo. Alia dñ acutū futura, quæ ab Albucasi deſcribitur, ſit trajciendo acum per omnes quatuor & abdominis, & peritonei oras, in vtramque partem. Cum reuoluto ad ipſam acum filo, prout à ſceminis, cum acus ſeruant, fieri aſſolet. Sed oportet acus breues, velut pel lionum, eſſe, Alias enim, impedimento maximo, non vſui eſſent. Alia etiam eſt, qua ego apte vtor, quæ pellionum dicitur, vbi pñcta, quo vulnus præcipue magnum, firmitus ſuperſit, crebiora admoventur. Sed ſtudebis, vulnus maxima dexterritate conſuere, apprehenſo nimirum manibus idonei miniſtri toto vulnere, ne inteſtina foras elabantur. Ipſeq; miniſter ſolum eam partem ſuenti chirurgo diſcooperiat, quæ vniciuique puncto ſit ſatis. Ipſumque punctum, illico eadem manu non ſubleuata operiat, Quod Galenus ſubſcure ſatis, citato in loco voluit, dum, inquit, debet enim, vbi manib⁹ ſuis totum vulnus extrinſecus apprehenderit, intro reprimere, tunc conſtringere, atque exiguum ſemper ſuenti prænudare. Verum ſi vulnerata pars vel medici incuria, plus iuſto futuram conſtringentis, vel ex fluxione aliqua, temporis tractu intumeat, tunc, quo in loco magis expedire videbis, punctum ſcindes. Tum vt dolor miteſcat, tum vt puris fluxioni locus pateat. Notaui hic, medici in curiam. Nam in abdomine ſuendo dupliciter delinquit à medico poteſt: aut ſumma tantum vulneris cute apprehenſa, aut contrario, nimis profunda futura atq; conſtricta illud, quod conſutum eſt, facile diſrumpit: hoc, conſtrictione nimia, dolorem excitat, præterquam, quod cutem ſædem in glutinat. Circa ſili conſiſtentiam, etiam erratur. Nam ſi iuſto durius eſt, cutem rumpit. Si mollius, ipſum prius rumpetur. Quare in his omnibus, vitato exceſſu,

Sub obſcure verba Galeni, breui atq; clare expoſita.

Quo tempore aliquod vulnus pñctum coactè excindendū.

Duplex error qui in cōſuendo abdo mine à chirurgis pñt committi.

Primus modus conſuendi abdominis, vbi Galeni intentione breuioriatque clarior ſermo ne explicatur.

eligenda media via est, iuxta Galen. sententiam. 6. metho. cap. 4. Sed, si sanguinis profluvium instauerit, medicamento, quod tantopere à Gale. 5. meth. cap. 4. effertur, sistendum est: nempe ex oui candido, pilis leporis minutissimè scisis thure atq; aloë ad mellis crassitiem mixtis. Vbi obiter aduertito, cur Hipp. lib. de vlceribus & Galen. 4. meth. cap. 6. atque etiam Guid. lib. 3. capit. de vulnere carnofo & Auic. 4. 4. mediocrem sanguinis profusionem vulneribus pro futuram esse asseuerauerint. Atq; eo, velut inflammationem cohibentem, concitandam esse. Cæterum locis citatis in vulneribus dumtaxat ventris, (quod mirum est) Hipp. atq; Galen. idem negant his verbis omni recenti factò vulnere, nisi in ventre sit, expedit ex ipso statim sanguinem plus, minusve effluere: quippe flegmone minus tentabitur. Sed ad hoc, meo iudicio, dicendum, causam esse, ne sanguis in ventris vastitatem illabatur: ibiq; retentus, putrescat. Quod in membris alijs (solida cum sint) non euenit. Si enim ab ipsis mediocris sanguinis quantitas effluat (quia foras fertur) inflammationem prohibet: contra verò in ventre. Et certe huic nostræ explicationi Auic. 4. 4. tract. 1. capit. 9. subscribit: ubi potissimam in his vulneribus curandis intentionem esse dicit, ut non dimittatur sanguis coagulari in interioribus ita ut prohibeat flux⁹ sanguinis. Verum, si intestina, vel scifa, vel perforata sint, quod ex flatu, atq; stercore exitu, palam fiet, abluenda prius sunt, vel aqua vitæ, vel styptico vino calfacto, si temporis angustia tulerit. Deinde, subtili pel lionum dicta sutura. Præsertim crassa intestina, quæ consolidationi obediunt, suantur. Foras autem, futuræ filum dimittatur: ut in suendo abdomine, etiam admonuimus. Sed neminem latere existimo, duplicem hic admouendam esse su-

turam. Alteram, intestini (ut dictum est,) alteram, in abdomine, simul cum peritongo. Nam ipsa intestina cum abdomine, nemo nisi demens consueret. Insuper, audiendi nullo modo sunt, qui nulla alia ducti ratione, quam ut artificiosi, aut paradoxo hominibus videantur, duplicem aliam intestinorum futuram somniauerunt, alteram, ex formicarum capitibus, alteram alicuius animalis intestini portione aliqua, cum hominis intestino confuta. Quo nil stultius esse potest. Nam etsi fingeremus, (quod impossibile est,) medicum viuentes formicas vulnerationis tempore, in marsupio portare, quarum abscessis capitibus intestina confui possent: quæso obsecro corporis humiditatis, tum excrementorum, tum alijs, an confutum non diffueretur? Quod in altera intestini animalis tam extraneæ rei futura, etiam contingeret, præterquam, quod particulam exanguè, emortuam, cum viuente, forsang; exangui (tā longa potissimum in quærendo animalis intestino, ipsoq; confuendo contracta mora) coniungere, erat impossibile. Vnde esset, & operam, (ut in verbo est) & impensam perdere. Vnde fugienda à ratione hominis sunt hæc deliramenta.

Sutura capitum formicarum, irritanda atq; frustra intestini animalis confuti.

C A P. X.

De medicamentis ad omnia ventris vulnera, & primo de victus ratione.



Ventriculus, atq; ipsa vulnerata intestina, cibi ac potus via, receptaculaque sunt: consequenter, humiditatibus illis agglutinatio impeditur. Vnde inter vulneris initia, ad septimum vsque diem, tenuis inedia ac medicinalis, non solum virtute, & potentia, sed etiam substantia sicca, iniungenda

Ad septimū vsque diem inedia, virtute, & substantia sicca iniungenda.

Modos mendiendi intestinis incisiss atq; confutis di ipsa.

De Vulneribus ventris inferioris. 165

genda est. Et si in ventriculi regione vulnus sit. Confortationem eius respicies, exhibendo amyllum velfar. Modico coryandri præparati, ac cinamomi momento, vel menthæ commixtis, in aqua calibis, vel ferrata, his omnibus conditis, aut infusionem tertiam furfuris, in eadem ferrata aqua, ad mellis crassitiem, post excolationem, redactam, cum paululo coralli, rosarum : atq; præparati co-

& vitulorum depilatis pedibus. Atque capitibus. Potus, sit vinum nigrum, & tandem, paulatim ad veterem quam sanus observabat consuetudinem, æger erit reducendus.

CAP. XI.

De medicamentis sanguinis profusionem cohibentibus, atq; agglutinantibus.



VLNERI inflato non penetranti, simplex terebinthina, vel oui agitatum candidum, illico applicatum, sufficiet. Et si

symptoma aliquod non infestauerit, quãro tardius curaueris, tanto magis proficies, & cum iam ad curationem perueneris, styptico dumtaxat vino calfacto, vel aqua vitæ, vulnus abluendum est. Deinde, terebinthina rubeo puluere admixto applicanda, puluis, continet thuris, mastiches, sanguinis draconis, lumbricorum, qui in neruosis affectionibus, maximam vim habet, ana. dragm. j. Vinum autem recipit, squinanti, filcris montani, pulegij, florum chamæmeli, anethi, meliloti, cumini, baccarum lauri, anthos. ana. P. semis. vini nigri lib. ij. coquantur prout ars docet, vsq; ad semissis consumptionē.

Vulnus quotardius curatur, nullo symptomate videlicet prohibente eo melius.

CAP. XII.

De medicamentis in vulnere ventris penetranti exterius etiam admouendis, & de his, quæ concrefci sanguinem non sinunt.

L 3 Verum

Temperatura membrorum nutritiuorum quæ vulneratur in cibis atq; medicamentis obseranda.

Cibus si aliud non prohibeat sensum ad augendum. Cibus vero sensum mutari debet, nam post tenuem inediam, iusculum pullæ, inferrata aqua nimis coctæ, vbi centaurea, ac radices consolidæ, etiam incoctæ sint, exhibebis. A potu summopere (quantum ferre poterit) æger abstineat, & cum iam bibendum ei sit, propinabis pluuialem ferratam aquam, incoctis ibi mastiche, thure, gummi iuniperi, cum guttulis syrapi myrtini, aut ex citri cortibus. Initio prandij, vesca tur prunis syluestribus, modico sparso saccaro, aut citonio affo, cinamomi & saccari momento commixto, aut coryandro, saccaro præparato. Postea si res bene cefferit, crassioribus vtatur, vt gallinis, caponibus, perdicibus. Postea hædorum

C A P. XIII.

De medicamentis intestino-
rum flatum discutienti-
bus, quo in suum lo-
cum melius redu-
cantur.



ERVM si penetrans vul-
nus fuerit, post reducta in-
testina, & omentum exci-
sum (si excisione opus fue-
rit,) vulnusque confutum,

ipsum huiusmodi medicamento tepido
abluendum est, Maximam enim agglu-
tinandi vim retinet. Recipit, aquæ vi-
tæ vnci. vj. collæ, siue glutinis dragm.

ijj. mastichis, gummi arabici, gummi dra-
gaganti, sanguinis draconis, ana. dragm.
prima. omnib⁹ in polinem reductis, cras-
so modo, in vitrea ampulla, cæra coo-
perta, seu farinacea massa, recondes, in
duplici vase omnibus serue factis. Eiuf-
dem viserit superscriptum vinum, ablu-
tione facta, in ambitu applicabis pannū,
in decoctione Centauræ ex aceto fa-
cta, madefactum. Supra vero, aliquid ex

Vulnus post
saturam, a-
bluendum
quo medica-
mento.

Vnguentū ex
colla fatisc
eodem.

his quæ supra diximus, quale est vnguen-
tum ex glutine, siue colla confectum,
quo in secunda etiam, atque in alijs cura-
tionibus, vti poteris. Id ex meo (quod a-
iunt) marte compositum est, continet
collæ, aut glutinis comminuti, in infusio-
ne vini styprici optimi, ad duodecim ho-
ras dimissi. vnci. ij. & postquam cum vi-
no, ad ignem ebulluerit, ad consumptio-
nem fere vini, super addesterebinthinæ
abietis, vel ex beto. vnci. j. semis, resinæ
vnci. semis. thuris, mastiches, sanguinis
draconis, gummi vernicis, in pollinem
reductorum, ana. scrup. ij. ex omnibus de-
coctis, efficies vnguentum, quod vbi la-
uacro (de quo superius) vulnus ablu-
eris, vtaris apponito. Sed quia (vt ad-
monuimus,) quandoque refrigera-

ta, atque inflata intestina, in
suum locum reduci ne-
queunt quibus reducan-
tur præsidia accom-
moda, atq; exper-
ta affera-
mus.



T intestinorum flatum di-
scutias, calentes pannos,
aut lanam sordidam super
imponito, manibusq; aut
suilla inflata vesica, ipso æ-

erotante supino locum leniter compri-
mes: Deinde, spongia decoctione vi-
ni, rutæ, chamæmeli, meliloti, atque pu-
legij, intestina fouebis: quæ si non pos-
sint: arietino, aut vaccino calido pulmo-
ne, applicato: aut lintheo sacculo confu-
tis intus, cumini, anethi, pulegij, rutæ,
floris roris marini, ac lauendulæ pulue-
rizaris, uel viuo anseris, catulo, vel porcel-
lo, per medium incisus. Curationem ten-
tabis: Si vero hæc ad discutiendum æ-
rem non valuerint, per sedem follibus
immisisis, flatum ibi receptum, extrahes.

Nanque vt ab Hippoc. libr. 4. de morbis
cap. de voluulo, & ipsa experientia do-
ctus sum, eius modi immisi folles mire
conclusum aerem extrahunt: vel eleua-
tis cruribus, & capite, vt moueatur æger,
leuiter curabis. Nam sic, omentum, atq;
intestina, manibus compressis, in suum
locum forsan restitues. Sed si tantis, tam-
que medicinz, ac rationi, consonis reme-
dijs, huic malo occurrere posse dispaue-
ris, tunc ad vulneris abdominis amplia-
tionem, per syringotoma (vltimum qui-
ddem auxilium) peruenire cogendus es,
vt Galenus citato loco docet. Instrumen-
ti effigiem superius. 7. capite. depictam
habes, Et quia non leuis momenti est de

Medicamē-
ta quæ fla-
tum intesti-
norum discuti-
unt, vt me-
li⁹ intra vul-
nus reducā-
tur.

Nous in nen-
rio extrahē-
di flatum in
testinarum
per sedem.

Modus am-
plandi vul-
neris abdo-
minis, quæ
do alia ad
reducēda in-
testina non
profuit.

situ

De vulneribus ventris inferioris. 167

situ ac decubitu vulneranti agere, itaque sequenti capite de ipsis differemus.

C A P. XIII.

De præcauendo, ne ventris vulneribus sana præcipua aliqua pars ab affecta vicina offendantur, ac de vulnerari de cubitu.



Ultimo restat, qualiter sanæ particulæ innoxie ab affectarum morbo seruentur adnotare, quouè modo ægrum decumbere conueniat, qui licet huius libri fini reliquerimus, tamen in medici obseruatione primum esse debet. Primum quidem efficias, si præcipua membra, cor nempe, atque hæpar, epithymate aliquo, vt vnguentum rosaceo, aut sandalino, commixto pulueris momento, diarrhodonis abbatis, ac diamargaritonis, vel similibus, corroboraueris, & adenas, principium membrorum emunctoria, oleo rataceo, irino, chamæmelino, hyssopo humida, adipe auium, cum cera confecto vnguento per vngeris, quo dolori, atq; conuulsioni his partibus imminenti, obstare possis. Secundum, edocet nos Albucasis auctoritas, inquit enim. 2. lib. cap. 87. de vulneribus ventris, & exitu intestinorum, in hæc verba, cum ergo amplificatur vulnus, vel quia per se amplum inflictum est, vel instrumento syringotoma amplificatum, & ingreditur intestinum, tunc, oportet, vt sit reductio eius secundum formam suam naturalem, in loco suo, sibi proprio, si possibile est, quoniam est melius, quando vero disruptio est ampla, in inferiori parte ventris, tunc oportet, vt infirmum facias iacere super dorsum, & ponere cru-

ra sua, altiora capite suo. Et si est in superiori parte ventris, tunc pone caput eius & pectus, altiora, &c. Deinde subdit, pone intentionem, & considerationem tuam in hoc, vt pars in qua est vulnus, sit altior parte altera, hæc illæ. Quæ quidè à Galeno desumpta sunt. 6. meth. cap. 4. qui etiã præcipit, vt si vulnus in dextris sit, in contrariam partem corpus decumbat: si vero in sinistris, in dextram: ne intestina, quæ in opposita regione sunt, læsam partem comprimant, ac lædant. Deniq; iubet Galen. iure optimo, vt, quæ vulnerata pars est, semper altiore locum occupet. Qua in re, tam grauissimorum partium sententiam attulisse, contentus, tantum illud addam, expedire maxime, ægrotantem quiete iacere neq; etiam ad egerendum moueri. Sed per ipsum perforatum lectum, egerere, aut apprehenso manibus pendenti fune, eleuari.

Decubitus vulnerati.

Modus quo vulneratus immobilis pene egerere possit.

C A P. XV.

De medicamentis aduersus intestinum tormina, & dolorem, ac tumorem ventris vulnerum à ventriculo vsq; ad inferiora intestina.



RECIPE, Absinthij, chamæmeli, meliloti, calamenti, singulorum. m. j. concoquantur in vino optimo albo. Deinde minutissime incisa, conterantur: quibus, addito nardini olei, absinthij, lumbricorum, ana. vncij. squinanti, drag. ij. spicæ nardi, drag. j. saxo græci, vncij. in pollinem quæ redigenda sunt, reductis, commixtis omnibus, ac contritis, efficias instar cataplasmat. Quod calfactum, vulnere applicabis. Et

Quæ sunt commiscenda medicamentis quæ

Confortanda sunt membra præcipua, quæ ex affinitate vel consensu patiuntur.

Per vngenda sunt emulsi stoma.

168 Liber Quartus, de vuln. vent. infe.

applicatur
vuln. cratis
particulis in
teriorib' vt
earum natu
rā afferres.

si in ventriculi regionem vulnus verferit, menthæ pulvis, rosarum, & similia, addendus est. Si in hæpatis, mastichinum oleum, cum farina ordacea. Si in splenis, paululum fabucini aceti, atq; ex cappariibus olei. Si vero versus inferiora intestina, oleum rutæ, & ruta ipsa ex vino decocta. Sed hic illud admonendi sumus, ex

Vulnera crassiorū intestinorū remedijs, quæ per sedem iniiciuntur, magis egent. Quippe cui, magis sunt propinqua. Secus atque in tenuibus, quoniam, & longinquiora sunt, & medio situ posita. Vnde ambo requirunt, nimirum, & quæ supernè exhibentur, & quæ infernè per sedem iniiciuntur. Sacculi etiam, ex pulueribus prædictarum herbarum non parum conferre solent. Clysteres quoque, ex eodem vini decocto, superaddito cumino: eisdemq; oleis, nempe rutaceo, & ex lumbricis, addita benedictæ confectio, insigniti contulisse vidimus. Et cum iam agglutinare ventris vulnus opportunum videbitur, tunc & cibus per os exhibendus, ac potui. Atq; etiam medicamentis exterius supra vulnus admouendis, nec non clysteribus, quæ conglutinandi vim retineant, sunt admiscenda. Ea erunt, gummi arabicum, dragagantum, mastiche, cidonia & similia. Quales autem esse debeant conglutinosi ipsi cibi, iam supra à me explicatum est, clysteres vero per sedem iniiciendi, constare debent ex optimo vino nigro ferrato, in decoctione Rois, balostiorum vtriusq; consolidæ, capitum rosarum, nuncum cupressi, thuris, mastichies, dragaganti, gummi arabici, boli armeni, sanguinis draconis, glutinis corij, sarcocollæ, in pollinæ redactore ana. drag. ij. omnibus incoctis, deinde excolatis, & ex-

pressis, fiat clyster, cui addito, mellis centaureæ, vnci. semis. iniicitur tepidus. Et per os exhibeantur trochisci, ex bolo armeno, pruna syluestria, saccharo delibuta, ne sapor ægrotantem offendant. Exterius supra vulnus vtaris prædicto medicamento, ex glutine corij, vel collæ, vel aureo Guidonis, vel quod sequitur, Recipe olei rosacei, omphacini hypericonis, cidoniorū, ana. vnci. semis. incoquantur, ex dupla vini nigri, styptici quantitate (de quo superius, quo ad, totum vinum consumatur, postea, addes resinæ, vnci. ij. terebinthinæ ex beto, vnci. j. semis. quibus cum oleis simul liquefactis, postquam ab igne sepe raueris, addes, pulueris gummi vernicis, thuris, mastichies, sanguinis draconis, sarcocollæ, in puluerem redactorum. ana. scrup. ij. ceræ quod satis sit, efficies admodū cæcati. Verum si forsan emundatione vlcis opus sit, recurrendum est ad tertium librum, de vulneribus thoracis, vbi medicamentorum quamplurimum copiam inuenies. Postremò, post totius vulneris agglutinationem, oportet ægrum per multum temporis spatium, in tota vulneris regione aliquod, ex emplastris membrum corroborantibus, gerere. Vt cæro-neum ex Centaurea, oxycroceum, aut simile. Et si vulnus inguinibus, aut vmbilico proximum sit, experientia, perutile esse didici, brachiali ex duplici scuto, per aliquod tempus vti, quo imbecillæ particulæ robur præstetur. Quod si, & supra dictum est, omenti pars insignis aliqua necessario incidenda sit, conueniet, ægrotantis ventrem assidue lanis obuolui, ne ab externa frigidityte lædatur & vt concoctionem iuuat prout Galen. 4. de vfu part. capit. 9. suadet.

Medicamē-
ta exterius
admoūda.

Brachiale
ita dicitur
maiorē rē
post san-
tatem & rō.
Insigni quā
tate omen-
ti incisa ac
ex tracta o-
porter post
inductā ci-
atricem le-
uā lana obuolui.

Finis Liber Quartus de vulneribus ventris inferioris.

✠ ANDREAE ALCAZARIS Medici, ac Chirurgi.

Liber Quintus, De Pudendagra, vel Mentagra, vel Lychenis vulgò Morbo Gallico.

Prooemium Authoris.



Vanquam me audaciorem fatear dubiam hanc tractationem affectus Gallici vulgò nuncupati (nondum à priscis, nec recentioribus prorsus enucleatam in præsentì differturum) prouinciam tamen hanc aggredi non erubui: tum nonnullis amicorum (quibus mos gerendum erat) id efflagitantibus: tum etiam, quia huiuscemodi latissimus campus penè in culto me audacia reddit. Quamobrem etsi maiora viribus aggrediar, nullus tamen iure optimo mirabitur, si hoc æquo animo perpenderit. Nam si forsan aliquid emolumenti opus hoc attulerit: laudi potius quàm vitio doctissimus quisque verteret. Igitur Angelorum regina in hoc atque alijs opem ferente huic operi accingamus.

CAPVT PRIMVM.

Quo author ostendit aduersam hanc luem longè antiquiùs à nostro seculo etiam vexasse eandemque non solum à neotericis, sed priscis authoribus inter alia morborum genera esse tractatam: indicatque eiusdem affectus descriptiones.



VANquam à multis, non solum vulgaribus, sed etiam nonnullis medicis, iam diu assertum sit hanc rebellem valetudinem à nullo priscorum, neque recentiorum esse descriptam: multò tamen secus res ipsa se habet à multis si-

quidem ipsorum explorata est. Quippe cum Plinius Veronensis vir nempe stupendæ eruditionis lib. vigesimo sexto. Historiæ naturalis cap. 1. De lychenis: huius deterrimi affectus cum omnibus suis notis fuit memor. Aseuerans ibidè hanc luem in Italiâ aduentasse Tyberij Clau-

Probat author contra valgi opinionem hanc aduè: sã valetudinẽ esse antiquissimam.

nam gallicum nomen dicitur Caesaris principatu, quodam Persino equite ab Asia contagionem huius morbi importante, à Græcisque lichenis nūcupari. Speciem nimirum pro genere (ut opinor) autumantibus. Latini verò, quia huiusmodi pustulæ à mēto, vel circa prope semper inter initia infedebant, menta gran vocauēre. Vnde sic infectos solo leui osculo alios infecisse refert, Aegyptumque huius morbi genetricem fuisse, & inde medicos hanc solam opem affertentes aduētasse, Nicolaus etiam Leonicensus modernis tēporibus huius morbi lepidissimum tractatum edidit. Ad hæc Hugo Senensis suis consilijs de cutis infectionibus cum pustulis faciei huius morbi aperte meminit, asseuerans iuuenem viginti annis natum ostreacofas, testaceasque pustulas totum corpus ambiētes intensis doloribus passum fuisse, eisdem noctu magis molestātibus, diuque lentescētib. Princeps quoque secundo Canonis cap. de Olibano hunc morbum aperte his verbis pandit. Et confert (dicens) thus illitum cum aceto dolori, qui nominatur compositus, ex quo proueniunt in corpore sicut verrucæ cum quadam re quæ est sicut ambulatio formicæ. At verò Hippoc. ipse Græcorū auctor vetustissimus, primusque Medicinæ parens multis in locis præsertim. 3. Aph. videlicet. 20. Apho. lichenum meminit. Vnde Iacobus Forliuiensis eū exponens lychenes cutis defecationes esse, ex falsa pituita ortum habentes testatur. Ipse etiam Hippoc. 2. de morbis cap. de carie, seu terebrine, tubercula atque vlcera, hodie hunc affectum comitātia, atque ossa ante apertionē erodentia, suis tēporibus euenisse refert. Quibus ostēsis licet difficile admodū sit hunc morbū tot, tantisque speciebus associatū prorsus definitiōe propria explicare vniuersim tñ ab eo que quæ plurimum in hoc morbo molestat vehi-

culum fumentes iuxta quorūdam authorum mentem dicamus: Mentagra vel pudenda est cutis corporis, vel ipsum ex tremorum vniuersa defecatio cum dolore, excoriationeque haud immodica, vel aliter: Mentagra est pustula, vel pustulæ ex varia humorū corruptiōe obortæ propter aeris nimiam in caliditate & humiditatem præsertim intemperiem, pudenda vel mentum, seu gutturis particulas primum, deinde reliquum corpus cum magno interdum dolore ambiētes.

Cur igitur pudenda primum hic affectus inuadat duplex est ratio: tum quia venereo accubitu sæpius huius aduersæ valetudinis principium cōtrahit, nempe partibus obscenis mulieri eo morbo infectæ adhærentibus: tum verò earum partium temperatura calida & humida, aqua potissimum humiditate superante putrefactio oboriri solet.

Mentagræ descriptio.

Alia descriptio.

Quia ratio hic morbus ut plurimū pudenda prius inuadat.

C A P. II.

Quo indagatur quid in causa sit, ut hunc morbum. aliàs antiquissimū, cuius prisca authores meminere à Neotericis recens nuncupetur arbitratibus nostra tempestate ortum contraxisse, & de eius causis.



Iscē iam disertis indagare pretium operæ erit, quorū hanc vetustissimam luem superioribus sæculis iam diu inuadentē (ut præcedenti capite ostendimus) nouam siue recentem nonnulli fuisse censueverint. Cui obiectioni bifariam satisfieri poterit primum, quod dupliciter eius origo potest cōsiderari primū aut penes eius antiquā radicē siue originē & ita vetustissima nūcupari potest quæ rōnabiliter probare nititur Nicolaus Leonicensus suo libro,

De morbo Gallico.

171

de morbo Gallico his verbis. Ego (inquiens) sicuti neque illis assentior qui varias huic morbo indidere appellationes, haud quaquàm eius naturæ congruētes, ita ubi considero eadem natura præditos homines sub eodem cœlo natos, sub eisdem sideribus educatos, eisdem etiā semper fuisse morbis obnoxios, cogor existimare. Neque potest mihi in caput meum peruenire, nempe natam hanc repente labem nostram ita infecisse ætatem, ut nullam superiorem. Aliter verò si consideretur penes eius post multa annorum curricula inuasionem, ita ut nullus memor esset eius prioris radices, dicimus, quod ex aliquorum neotericorum autoritate hic morbus ortum habuit ex quodam bello quod Neapoligestum est, Anno 1493. & ex aliorum assertione constet hunc morbum proaenisse ex infectis. In dis quos tunc temporis Dominus Christophorus Colon transfretauerat ex insula Diui Dominici quæ apud occidentem sedem habet, ut eos conspectui Regis Ferdinandi offerret qui tunc temporis erat Neapoli. Cum autem nostrorum legiones rem haberent cum Indis foemini cōtagione infecti sunt quæ paulatim serpere cœpit non solum per nostrorum sed & Gallorum corpora, qui Neapolim obsidebant, ut refert Monardes in capit. de ligno sancto, libr. de facultatibus simplicium medicamentorum a nouo regno occidentali venientibus. A quorum opinione dissentio innitorque; autoritati, & experimento magni cuiusdam viri (qui Leonardus fiorauanti dicitur) medicam, & chirurgam artem Venetiæ exercētis: & pro eius vera cognitione sciendum est, quod Anno a virginco partu 1456. Ioannes filius Renati quondam Andegauic Ducis bellum gessit cum Alphonso Rege Neapolis, ob cuius diuturnitatē comatus defecere, annonæque inopia præ-

mebatur uterque exercitus eoque deuenit ut copia præberetur carniū conditoribus ac fartoribus, qui noctu fumebant humana corpora, ea condita per frustra clam, assata, & elixa siue aliter condita interdiu miseris vendēdi militibus. Ex quarum carniū frequenti vsu, tam nostrorum copię quàm Gallorum exercitus tali infecti sunt labe, ut pluriū numerus dolorum affectus, tumores, & alopeciā paterentur, quæ lue magis oppressi Galli receptui cecinere & in Galliam pedes vterunt asserentes morbum illum à Neapolitanis originem trahere Neapolitanique vocauerunt. Itali verò & Hispani ex opposita parte affirmabant ortum ducere à Gallis eumque morbum Gallicum appellare: quam nomen clarum adhuc apud omnes gentes retinet. Hoc præhabito cū dictus vir diligentissimus occultarum rerum scrutator Neapolim migrasset suaderetque indagatiōi memorabilem rerum, verba agens cum sene quodam, cui Paschalis Gibilothus nomen erat, seque affirmaret XC VII I. iam cōpleuisse annū, & apud ciues senior cæteris habere inter alia supra dicti belli progressum minutim recēdū & dixit se à patre suo quodam accepisse (qui carniū conditor tempore dicti belli erat) conditores ea tempestate ex corporibus humanis plura cōdimenta, & pulpamenta confecisse quæ militibus interdiu venalia exponebant, & hoc ita occultum fuisse, ut nunquam reuelatum fuerit. Cuius contagionis veram causam indagare volens dictus Leonardus, acceptam fuculam in cubili quodam ligauit, ciboque quo solita erat nutrirī admiscuit pinguedinem suis, unde fucula paucis inde diebus pustulis plena, & tumoribus setarum defluuiū passa est. Hoc exēplo minimē satisfactus aliud periculū facere voluit. Accepit ergo catulo ligauit in camera nec aliud quàm caninas

Duplex consideratio circa originem morbi Gallici.

Auctor addit et sententia experimento

Industria & historia Leonardus Fiori vniuersitatis danda circa perferuntur huius morbi.

canes

carnes ei duorum mēſium interſtitio in nutrimentum dedit eoſdemque affectus quos fucula manifeſtè ſubijt, & ita miſerè vlulabat, vt nihil triſtius. Hoc idem expertus eſt in miluo quē ex miluorū carni bus nutriuit, q̄ nec à relatis paſſiōibus ſe ſubtrahere poſuit. Ex q̄bus tam manifeſtiſſimis argumētis hāc deduxit concluſionē, nēpe, ſimile ex ſuo ſimili nutritū in ſummam deuenire corruptionē & ſu pra dicta accidētia ſubire, quod cōproba ri pōt In dorū aliquorū exēplo quos An tropophagos vocitāt eo qđ humana com edāt corpora, eaq; ſummū ſint eis deli tiū in conuiuijs quāobrē hoc morbo val de infeſtāt, & hāc morbi vulgo Gallici originē ſubdere volui qñquidē plures fru ſtra in eius indagatione laborauere.

C A P. III.

De Cauſis huius affectus.

Cauſe tam particula res quā vni uerſales hu ius affectus.



Nteaq; medendi rōnem huius morbi aggrediamur ipſius de nuo apparitionē præfato anno indagare ſiue ipſius cauſas aperire fas eſt: ſed quia cauſarū eius quædā vniuerſales, quædā particulares exiſtūt, ideo de ipſis ſigillatim diſſerendū eſt. Vniuerſales qui de cauſæ ſuere maxima cœli in caliditate & humiditate intēperies. Humiditate eo anno maximè exuberāt, nec non ma leuolus planetarū aſpectus cauſa inferio ri etiā adiuante, dixi humiditatem maxi mē eo anno redūdare, quæ quoties caliditatē ſuperat cauſam putrefactionis eſſe Philoſophus pleriq; in locis teſtatur qđ his carminibus lepidiſſimè atq; elegāter lib. citato indicat Leoniceuſus.

*Tempore Alexandri Sexti noniſque Decembris
Intemuit Tiber bis ſenas circiter vlnas
Inſula quæque domus facta eſt, mediſque repente
Circunducta viis aquabat cymba ſeneſtris*

*Deuocatione rix tantum tempore tellus
Diluvium paſſa eſt, latuit cum rota ſub undis.*

Particularis verò cauſæ maxima fuit præuia diſpoſitio corporum: ad im preſionē recipiendā, veluti cacochymia ex praua victus rōne, vt patuit ſupra, nec non ex bellica, laborioſa que vita, & inde humorū corruptela ex hepatis intempe ric, quibus præfata aeris impreſſio adiun cta homines magis infecit, & vt ſuprà di ximus concubitus cum foedis mulierib⁹ eo morbo infectis: interdum verò ſolo oſculo, modo hominum duntaxat com mercio interdum etiam veluti ægritudo hæreditaria euenire ſolet nempe à paren tum ſemine vitiato, modo verò citra has cauſas, ſed ſua ſponte praua dūtaxat qua litate, ac malo victus regimine, poſt habi ta in hoc vulgariū medicorum opinio ne aſſeuerantium hunc affectum ſola ho minum contagione aduentaffe. Nun quid primus hoc morbo affectus ab alio fuit infectus? non fanè. Quo circa ferina hæc lues varijs variſque modis ſecundū indiuiduorum varietatem eo anno inua dere pullulareque cœpit, ſupponendo ip ſum ægrotantem ſiue in calido ſiue in fri gido tali indui qualitate qualem tempe raturam in ipſo inueniebat: cū vniuer ſali agente, à particulari diſpoſitione, de terminato, aliter atque aliter effectus pro ducatur. Itaque ſi homini pituitofa attra bilioſave temperatura prædito inuade bat morbus, vt plurimum eandem ſor tiebatur qualitatem, quia frigidam: ſi verò bile flaua, calidam, vt plurimum in ipſo vincentem neglecta in hoc vul gari opinione falſo aſſeuerantium hunc ſemper affectum à frigido humore nul la adhibita diſtinctione exoriri. Quo euenit medicos tunc temporis eadem ſemper medicamenta in omni ſiue ca lido ſiue frigido morbo, atque tempe ratura non abſque ægrotantium iactu ra uſur-

*multoties ſua
ſponte ſunt in
dum euenire
ſponte ſua do
num conſatio.*

*Quod hic
morbus hu
minis corpo
ra ſecundū
eorum va
riam tempe
raturam in
uadere ſo
let.*

*Volgi opi
nio in hoc
ſperanda.*

De morbo Gallico.

173

Inuehit in ra vsurpare, quos veluti sutores eodē calopodio oēs calceantes Gal. 9. Meth. mendendi. c. 16. lepidissimē taxat. Cœpit igitur lues hæc non solū Italas oras verum Iberica, vel Hispanica regna vsque ad Indicas regiōes penetrare, & hæc de causis.

C A P. III.

De Notis huius morbi.

Notæ siue indicia hoc malum indicantia varia esse solent, vt pote menti, frontis, capitis ac totius vultus pustulæ: gutturis vlcuscula, excoiationesque, cibi & præsertim potus ob maiorē musculorū in de glutiedo cōpressionē, phibentia: priapi, vel vuluæ, ac testiu, sedisque interdū vlce- ra, interdum obscenę pustulæ, articularū dolores noctu ægro magis infestantes: ossium tubercula: quæ oīa comitari solet qñque pilorū casus siue allopécia: facies quoque ægrotantis discolor disformisque reddit. Quæ quidem signa interdū simul cumulata, interdū verò singularia ægros inuadunt: quibus apparentibus vulgare adagium vsurpare poterimus: Fœnum habet in cornu, longē fuge.

C A P. V.

De varijs huius morbi speciebus.

Descriptione igitur, causis, notisque huius affectus præostensis, licebit etiam nūc in suas species ipsum diuidere: non quidem logica diuisione aliās perquirēda, sed medica nēpe penes maiorē, minorēve eius in subiecto fixationē, quæ admodū in febre habituali fixa seu hectica febre. Est igitur prima eius species qñ ipsi ægrotanti pustulæ in pudēdo, vel sede, vel excoiatio in gutture apparere cœperint, vel itidem pustulę in frōte & capite pululare. Secūda verò

speciei hæ sunt notæ: articularum dolor, quē interdū tubercula comitant: interdū verò allopécia. Tertia aut species non solū pustulis atq; articularū doloribus, sed etiā vlcibus corpus afficit. Modo etiam cirrhosis tuberculis, mō dolorificis, modo dolore expertibus. Quarta verò species vltimā perniciē huius affectus dignoscet, qñ corpus nō solū vlcibus, alijsque affectionibus dictis affligit, sed etiā ossium corrosione & carie, atque febriculæ corpus extenuat. De quorū curatione Deo auspice seorsum differemus.

C A P. VI.

Quo indagatur, an in primæ speciei curatione huius affectus, de qua modo differetur, siue in alijs eius speciebus, postea differendis, sanguinis detractio à medicorum vulgo prorsus dānata competat: an non.

Nreque curationē primę speciei huius mali aggrediamur (qā in ea nō rarō sanguinē mitti necessum est: quæ quidē sanguinis missio à ple- risq; Medicis insipienter satis dānatur) vt hmōi quæstiois veritas magis elucescat, vtraq; ex pte in pñenti dislerei. Affeuerātiū igit sanguinis detractio nō cōuenire hæc sunt fulcimēta: primū qā vbi bilis atra (sanguini extrahēdo vtraq; qualitate nēpe actiua & passiua apposita) vt plurimū prædnatur, non vī sanguinis missio expedire: sed hmōi est in hoc morbo, vt ossiū tubercula, febris carētia, morbi diurnitas ostēdunt, igit. Secūdo, imbecillitas non est addēda imbecillitas, sed hoc morbo infecti vt plurimum sunt viribus enervati, ac debiles, & phlebotomia eos debiliores redderet, igit. Tertiō, apparētibz iā pustulis exterioribus huius morbi phlebotomia (nimirū retracta materia dē circun-

3. species.

4. species.

Refutatur, primo medicorū opinio sanguinis missio- nem in hoc morbo dam- nantium, & eorum sigil- latim funda- mentum.

Secūdo fun- damentum.

Tertiū fun- damentum.

Diuisio spe- cierum huius morbi.

1. species.

2. species.

Quartū ful-
cimentum.

Respon-
sio ad
obiecta.

Laodai Ni-
colai Leon-
ceni opinio.

Author satis-
facit rationi
bus & argu-
mentis con-
trariæ opi-
nionis.

per hunc
modum

et tunc
dicitur

circunferentijs ad centrum) naturæ opus prohiberet. Quartum, pustulatum exte-
riorum corrupta materies sanguinis de-
tractione via vacui alium sanguinem si-
bi commixtum magis inficeret, igitur.

Sed huius oppositum non solum ra-
tione, sed etiam experientia atque autho-
rum sententijs colligitur. Primò, quidem
constat manifestè. Quis nanque mentis
compos ambiget hunc effectum homi-
ni temperaturæ sanguineæ, atque sangui-
ne in ipso redundante inuadere posse? &
huius phlebotomia virtute ferente & æta-
te conuenire? Nullus sanè. Rursus expe-
rientijs confirmatur. Multos em̃ hoc morbo
laborantium doloribus ac pustulis cru-
ciatos, vidimus sanguinis missione inco-
lumes euasisse. Quare non conticendam

cenfeo auctoritatem Nicolai Leonice-
ni huic negotio satis accommodam, suo
libro de morbo Gallico hunc in modum
scribentis. Quare etiā vt aliqua ex parte
curandi viam ac rationem attingam, nil
aliud in hoc morbo expedire puto quàm
plenis venis multum sanguinis mittere:
sicuti vbi flaua bilis in corpore redunda-
uerit, hunc præcipuè humorem conue-
niente, ac proprio pharmaco euacuare.
Et sic similiter dicere possumus de bile
atra & pituita. Quibus disertis superest ar-
gumentis in contrarium allatis satisfacere.
Ad primum ex superiori suppositio-
ne in capit. 3. patet responsio, videlicet
ægritudinem talem sortiri qualitatem in
hoc morbo, qualem temperaturā & hu-
morum redundantia in ipso laborante in-
uenerit. Itaque plethora inuenta sangui-
nis missione præcipuè est opus: si vero ca-
cochymia alui solutione: si vtraque, am-
babus. Ad secundum verò rñdetur viriū
robore esse potissimum sanguinis mittere
discopum, quod si adsit fieri rectè pote-
rit, sin minus non est exercenda, vt in a-
lijs affectib⁹ fieri solet. Ad tertiū & quar-

tum dicendū, q̃ pustularū materies cūm
extra vasa sit, per phlebotomiam ad inte-
riora non vertitur, vt aliū sanguinē infice-
re, & opus naturæ prohibere possit. Rur-
sus si quod magis videtur inesse, inest: er-
go & id quod minus: sed in materia vene-
nosā morbilorū & variolarū post eorum
apparitionē in vehementi sanguinis re-
pletionē Auic. 1. 4. cap. proprio sanguinē
mitti iubet. Ergo à fortiori post appari-
tionem pustularū huius morbi competit
sanguinis missio, nō solum in principio,
sed in augmento & quocunq; tempore si
sanguinis redundantia adsit, dierū nume-
ro posthabito, vt ex Gale. sententia tum
libro. 6. de curandi ratione per sanguinis
missionem: tum etiam. 9. meth. capi. 5. &
Auic. 4. 1. cap. 20. colligitur.

C A P. VII.

De curatione primæ speciei mentagræ.



Ognita igitur ex notis iam præ-
cedentibus prima huius morbi
specie, tūc curationis scopus tri-
bus intentiōibus adimpletur. Prima, qui
dē optimo regimine in sex rebus non na-
turalib⁹ obseruādo. Secūda, corporis eua-
cuatione. Tertia topicis medicamentis.
Prima igitur cōpletur esu carniū pullorū
gallarum, caponum, perdicum, passula-
rum, amygdalarū & denique bonū chy-
lum generantiū. At verò si facultas non
sit, Arietina carne, vitulina atq; hædina,
ouisque recētibus, vescat: cœna sit leuior
prandio. Cæterū si æger iuuenis sit ca-
lida materia in morbo prædominante à
vino prorsus cauendum, præsertim ver-
no siue æstiuo tempore. Sed commu-
nis potus sit aqua decoctionis rubi Indici
vel ligni sancti. Secunda, verò intentio
circa materiei antecedentis euacuationē
versatur. Quæ quidem secundum varie-
tatem

Tribus sco-
pis curatio
adimplenda.

Prima inten-
tio.

Secunda in-
tentio.

De morbo Gallico.

173

tatem temperaturarū atque materierum in corpore redundātiū molitur. Si enim sanguinis predominantis signa apparuerint, audacter, ut dictum est mittatur. Si vero aliorum humorum, proprio pharmaco educetur: si utraque sit opus euacuatione cautē fiat, quorum pharmacorum postea singillatim fiet mentio. Facta igitur conuenienti corporis euacuatione, æger cunctis manē exercitio aliquo utatur, veluti deambulatione, pilæ ludos, aliarum ex euacuatione, seu quapiam alia exercitatione, ut inde sudor excitetur, & eo morbi materies discutiatur. Citato vero sudore æger lecto acquiescat. Verū si his morbis non finiatur Syrupi Sancti Ambrosij ad hoc mihi iam sepius experti cum optimo successu vnc. vi. manē & totidem sero per sex dies æger assumat. Constat autē ex millio excorticato. Post in libr. j. & sem. pluuias aquæ ad eius crepaturam optimē incocto, postea addita tertia parte vini albi veteris, ac deinde parum simul seruatis & per pannum excollatis post corporis euacuationem, ut diximus sumatur. Sed aduertito obsecro hūc syrupum seu portionem fortius multo sudorem acerrime, si ramentum cornu taurini simul cum millio benē incoquantur. Eidem etiam primæ speciei huius affectus opem fert sudorem quoque euocando sequēs destillatio per viginti dies manē in quantitate vnci. vi. bibita, cuius hæc est permixtio. Recip. Radicis brionie & henule campanæ florum roris marini fumarie recentiu. an. lib. sem. electæ theriacæ vnci. iij. omnibus comixtis atque contusis in massa farinæ frumenti farciatur, & in furno coquantur, postea minutatim frangat & instillatorio instilletur, & modo prædicto exhibeatur hæc instillatio. Solet perinde magnopere ad idem suuare puluis radicis brionie atque henule campanæ. dragm. j. si vino albo in fr-

gida temperaturā, atque materia frigidā bibatur, in calidā vero aqua papaueris rubri, vel scabiosarū. At vero si hoc malū ad hoc his non cesserit remedijs, & topicis medicamentis sit opus hæc sunt illi probata a leuionib⁹ orfas primo aqua aluminosa quæ ex plantagine, portulacæ, agrestis, alumine, quarum albuminibus parī portione comixtis atque contusis, instillatisque, vel aqua Canfracti nemini ignota quæ constat ex optimi vini albi veteris lib. j. aquæ rosarū & plantaginū an. vnci. vi. viridis aris aurī pigmenti, ana. dragm. iij. puluerizatis puluerizandis, & vino comixtis & vnica ebullitione seruatis fiat lauacrum, quo pustule bis, terve in die abluantur, postea, loco non exsiccatō. Ad idem quoque fortius opem fert aqua cinnabaris ex meo (ut aiunt Martem) quæ sic conficitur. Recip. vini albi antiqui lib. j. æruginis aurī pigmenti, aluminis an. dragm. iij. cinnabaris. dragm. v. sublimati drag. ij. redactis in pollinem, & vino comixtis, & seruatis fiat lauacrum. Quod non solum sedis pustulis hæc morbi totius vultus, sed etiam antiquæ tinea & ani obsecnis pustulis opem fert. At vero ne miretur quisq. si eadē medicamēta faciei pustulis, atq. ani pro futura esse dixērīm quāquidē Auic. lib. 3. ca. de labiorū fissuris idem facit, quibus fissuras labiorū vincti de suminis & ani curari. Vbi obiter notandū multos satis absurde in hoc decipi imaginātes. Auic. in hoc textu præcipere p. fissuris labiorū sumē & anū aliquo medicamēto illinienda esse, ut in superficie litera significare vult. Consensu em quoddā & colligātia (ut dicit) contēperato nimis rū humore ab illis partibus ad os usque ascendente, veluti remota causa, fissuræ labiorum auferantur. Sed quantum expositio hæc ridicula sit ne morationis compos ignorabit. Vera igitur textus interpretatio est, ut ratio loquatur atque etiam

oqro em
auicet em
anacrua

Topica me
dicamenta.

malacra
dihum
obsecnis

Aqua cinnabaris.
ad eodem hanc
to macta

non quā etiam
a se hanc per aua
possum sit

anacrua
ut loquatur
Ridicula
quoddā
expositio
text. Auic.

Exercitatio
ne uti vtilis
simum.

Confectio
syrupi Sancti
Ambrosij.

Instillatio
ad excitandū
sudore
proficua.

Vera expo-
sicio textus
Aucennae.

et alique
conueniunt

Animadu-
erit multi-
ne momēti.

aduersio in aquinum
morbo quā multum
aduersio

aduersio in aquinum
morbo quā multum
aduersio

Aduersione
Medici in
erratum in-
cidit.

aduersio in aquinum
morbo quā multum
aduersio

etiam Petrus de Argelata vir in chirur-
ga facultate non postrema notat libr. 3.
capit. de furis labiorum aperte sensit: vt
eadem medicamenta quae furis summa
& an opitulanti possent propter pari-
tatem rationis effusus labiorum etiā con-
ferre: quia in illis omnibus eadem cura-
tionis methodo indigemus. Verum si
pustula admodum ostracose vultui in-
haeserint, vltimum auxilium est factis vi-
uentibus euacuationibus aqua alchimi-
starum maningere: deinde altero die suffi-
tum ex decocto hordei foenu graeci & fe-
minis lini in vultu recipere. Vnum præ-
ter dicta in hoc morbo notandum aduer-
tito: scilicet abscessum in guinibus eueni-
re vlcere incolle præcedenti. Hunc igitur
si præcogiter aperiamus, & longa ma-
natione aperta, obseruamus ab inci-
pienti, vel futura allopecia huic morbo
peculiaris grotum obseruare compertū
est, pernicioso fortassis luceo. pilorum
defluxus causa, illic veluti reuulsione at-
tracto. Attrahitur autem in hunc locum
materies, suppuraturque tum potissimū
siccis cucurbitulis: tum emplastro quod
recipit radices brionie, coepae, corticum
radicum altea recentis, foliorum mala-
rum sicum siccarum, passullarum enu-
cleatarum piperis aquaticis, sing. P. j. co-
quantur optime atque pistentur, postea
addatur fermenti, axungiae suillae, insul-
sa, butyri vaccini sing. vnci. ij. Euphorbij
puluerizati dragm. j. fiat emplastrum. Rur-
sus preuium operæ erit hic advertere (ne-
quis forsitan decipiatur) ano, vel pudendo
laborantibus catarticum ex soluens sca-
monium recipiens non esse egrotis exhi-
bendum, ne supernarum partium recre-
menta ad partem inferiorem laborantem
ferantur, morbumque adaugeant. Quod
non solum ratio ipsa indicat, sed etiam
Galen. tum. 4. Meth. ca. 6. tum etiam. 13.
eiusdem cap. 6. atque alijs plerisque in lo-

eis. contravero euenit in affectibus mem-
brorum superiorum nanque soluens me-
dicamentum ac recrementa ad inferiora
trahit. Caterum si euacuatione fuerit o-
pus solam castam fistula, mannam, diaca-
tholiconem, vel syrupum rosarum persi-
carum nouem infusionum callosi medi-
ci exhibere consueuerunt, vel vomitum
ciere, quo materies & sursum reuellatur,
& a ventriculo vomitione rejiciatur. Cly-
steribus etiam deriuantibus vtuntur. At
verò hac Galeni sententia non obstante,
scilicet, dicere auisim etiam pharmacū
exoluens dictis inferioribus affectioni-
bus conuenire. Longè enim maius se-
queretur inuamentum in posterum di-
minutis membrorum superiorum recre-
mentis euacuatione remota nempe cau-
sa) quam nocumentum ex aliquantula
humorum ad eam partem attractione
per pharmacum.

Nota me-
cam quæm
ten. quæ
vendum
a. e. h. g.
um in veri

Nota
V. 13. ad
in. 13. ad
in. 13. ad
in. 13. ad
in. 13. ad

CAP. VIII.

Quo ante curationem secun-
dæ speciei huius morbi: de in-
uentione ligni indici, seu
sancti, eiusque tempe-
ratura differi-
tur.



QUIA secunda huius
mali species per quam
rarissime absque deco-
cto ligni huius curari
solet, sicuti tertia spe-
cies, & potissimū quar-
ta absque vnctione mercurij, vt experie-
tia docet, itaque in hoc capit. 2. De ligni
sancti inuentione, ac temperatura dis-
seramus: in sequentibus verò capitulis, de
mercurij temperatura & longa eius di-
spu-

tertia
in. 13. ad
in. 13. ad
in. 13. ad
in. 13. ad
in. 13. ad

sputatione, eiusq; in medicamentis tuta commixtione pro curatione præsertim tertie & quartæ speciei. Cum natura pro cax semper in nostris ostenderetur miseris parum erant homini tot morborum genera, cum supra trecentum numerum esset, (Plinio lib. 2. 6. cap. 1. asseuerante) nisi noua, atq; inuisa timerentur? sicuti hæc lues acerrima plaga Gallici, morbi post multa iam annorum curricula à cessatione, nostris temporibus denuo homines infestantis. Misertus tamen summus opifex turbæ dolentium ac lugentium quos condidit hoc lignum sanctum hominibus reuelauit, ab Indis, Guaiacam latinis verò, ut creditur, hebanum nuncupatum ut ex Auicennæ sententia. 2. canonis ac Dioscoridis lib. 1. capit. 110. aliquatenus colligi potest: cuius decoctionis haustu quam plurimam iam penè deplorati sanitati sunt restituti. Sed antequam methodum exhibendi decoctum huius ligni agrediamur, quod iam circa eius inuentio nem non parua solertia adeptus sum, in medium adferam. Olim igitur magnopere nobis queritantibus, vnde nam huius medendi ratio originem contraxisset, tandem indagatio non pigra à medicis Hispalensibus doctissimis (vbi immediatius ab Indicis oris hæc contagio peruenerat) certò scilicet Indos hoc malo acerrimè olim cruciatos quam plurima expertos fuisse, ut aliquid commodi tanto malo consequi valuissent: At verò nullo inde iuamento secuto, huius ligni decoctum tam in potu assumptum quam exterius admotum ad obscuras pustulas abluendū experti sunt foelicissimo inde successu adinuento. Neq; ab ipsis Indis Medici dicebāt hoc remedium primitus fuisse repertū, sed hoc mō contigisse, hōmine hoc morbo iam prope mortem nauiqua vehebatur laborante, ecce procella maxima super nauim secuta fuit, eo

vsq; ut fluctibus, vndis, aduersisq; ventis omnes vexati proximam iam mortem expectabant. Tunc igitur ægrotantem illum iam penè animam exhalantem secus litus ut interdum fieri assoler eieceret. Quo loco miserrimè derelictus paucotempore post imbecillus admodum serpens fonticulam iuxta arboris radicē scaturientem, deo duce, adinuenit, vbi tū morbo, tum fame fermè periens biscocti pannis buccellam, quam forte fortuna gesserat, vnda madefecit, comedit, bibitque, atq; eadem aqua pustulas, tubercula, vlceraq; abluuit, quibus vires aliquantisper recuperauit deinde affecta omnia corporis loca sæpius abluens biscocto pane, aquaq; duntaxat nutritus prosperam valetudinem Deo auspice fuit affectus. Coniectans igitur arboris virtute, & aquæ ab eo scaturientis sanitatem esse adeptum, frondes atque ligna ipsius arboris experiendi gratia secum tulit, in aliasq; Indicas se transferens oras & eadem methodo plures hoc morbo cruciatos liberauit: Deinde Indi ipsi eadem iam curatione vsi fuere maximo inde commodo affecto. Demum post aliquam temporis intercapedinem indies huiusmodi curatione in urbem Hispalensem (ut ita dixerim) transfretaui, vbi periti medici postea bonam victus rationem, atq; corporis euacuationem ante haustum decocti huius ligni, atque etiam post in curatione addidere, atque meliorem assumendi ordinem. Hinc igitur in totum Hispaniarum regnum atque in exterarum nationes vsque hodie diuagatur magniq; habetur & licet Doctor quidam alioqui certè doctissimus cum Plinio lib. 22. cap. 14. sæpius diceret mihi non placere remedijs tam longè nascentia: Sed quæso, Rhabarbarum, agaricus & alia quam plurima medicamenta longè admodum nascentia, quæ prædicta auctoritate possent etiā

M calum-

Perfcruta -
tio authoris
circa inuen
tionē ligni
Indici siue
ipsius deco
cti.

Historia li
gri Indici.

Reprehēso
in quōdam
doctissimū
virum.

calumniari, humanis corporibus ægro-
rantibus nonne præsidio sunt? Quibus
ostensis superest modo huius ligni tem-
peraturam eiusq; electionem explicare:
paucalicer de ipso apud priores medicos
reperiantur: Quidam enim calidam atq;
siccam ex elementis fortiri temperatu-
ram in secundo gradu: quidam verò pau-
lo supra asseuerauerunt, indicio quidem
sumpto à caliditate sensibili corpori hu-
mano ab eo citra læsionem inducta: quæ
quidem operatio à Galen. 5. de simplici
medicina asseuerante secundo gradui ad-
scribitur. Veram quia eius decoctum &
calidis & frigidis affectibus subuenire sæ-

Varia quo-
rundam pla-
cita circa te-
peraturam li-
gni Indici.

Authoris o-
pinio.

Declarator.

Aduersio.

pius solet, vt periculo constat, symme-
trium temperatura dici non inconueni-
ret, cuius quippe est & calfacta refrigera-
re, & refrigerata calfacere, vt de oleo ro-
sato Galen. 2. simplicium. cap. 27. & vlti-
mo asserit. At verò sicuti, de oleo rosato
ibidem dicitur plus membra calfacta refri-
gerare quam infrigidata calfacere, per
oppositum (vt ipsa experientia docet) hu-
ius ligni decoctum plus membra refrige-
rata calfacere, quam calfacta infrigere
habet. Poterimus tamen aliquantulum
eius caliditatem magis temperare, com-
mixtis in decocto, (vt sæpe facere con-
sueui, cum morbus postulat) aliquibus
simplicibus frigidis medicamentis, velu-
ti è diuerso calidis ad magis calfaciendū
(cum oportet) vt suo dicitur loco. Penes
etiam secundas atq; tertias medicinarum
operationes, quarum Auerr. 5. collectio-
num meminit, hoc lignum sanctum mi-
rifice operatur, quibus varijs naturis for-
sam opem fert. Verum fateor ex acciden-
ti symmetriam temperaturam hoc lignū
excedere posse, atq; finem caliditatis se-
cundi gradus prorsus attingere: adaucta
nempe in decoctione nimia ligni quan-
titate, & eo usq; incocti vt minor multo
decoctionis superfit quantitas. Per quan-

titatem nimirum continuam, vel discre-
tam gradu ipsius caloris adaucto. Quan-
titas enim licet intensiue non ad augeat
gradum extensiue tamen ipsum ad auge-
re potest: augetur etiam eius caliditas
sumpta vberiori decocti quantitate.

CAP. IX.

De curatione secundæ spe-
ciei huius morbi per hau-
stum decocti ligni san-
cti, deq; eius ele-
ctione.



Vando autem secun-
dam huius morbi spe-
ciem curandam susce-
peris, nempe pustulis
foedis non solum, sed in-
terdum nonnulla of-
fium inæqualitate, atq; allopecia præce-
dentibus, tunc potus decocti huius ligni
maximo est iuuamento. Sed licebit prius
commodiores huius ligni notas hinc de-
scribere, quas callosa iam experientia
nos docuit. Sunt igitur nouem. 1. vt li-
gnum sit solidum, crassumq;, vt maior in-
dem multitudo formæ, ac perinde maior
actiuitas in eo reperiatur. 2. recentius
quod haberi possit ne sua antiquitate vi-
res amittat. 3. lene nodositate expers, vt
in eo virtus æqualiter recondatur. 4. vt sit
cortice integra non cariosa, satisq; adhæ-
rente circumductum, quod, lignum ef-
se recens indicat, quadantenus odorife-
rum vt aliquam aromaticam virtutem
præferat. 5. vt cor siue medium eius sit
colore sub nigro præditum: circumferen-
tiæ verò eius inter albedinem & pallo-
rem. 6. q. lingnæ contactu in colorem
crocei mutetur, hoc nanq; magis recens
quam vetus lignum esse indicat. 7. vt
lingnæ etiam contactu aliqua percipia-
tur

Notæ ele-
ctionis.

De morbo Gallico.

179

tur amaritudo. Ex hoc nanq; aliqua sensibilibilis caliditas apta materiam per sensibilem distatam discutere censenda est. 8. ut ponderosum sit, quo enim ponderosius eo recentius indicatur, & si cum his tale lignum inueniretur, ut ab eo igni ad moto non nihil gummositatis efflueret, nil ad hanc rem vtilius.

Deuaria cibandi ratio ne sumetes decoctum ligni Indici.

Pro fumendo autem huius ligni sancti decocto (sic enim ob eius mirificas operationes ipsum nuncupauere) aliqua oportet præmittere fundamenta. Primū ut tempore verno, vel autumnio ex regulari cura assumatur. His nanq; temporibus nec calor nec frigus infestant. Secundum ut non eadem inedia omnibus iniungatur, sed secundum virtutis robur. Si enim vires sinant à principio tenuis sit, nempe ex passulis, amygdalis, biscoctoq; pane, ut postea latius dicitur: sin minus caro pulli as si eis non prohibeatur. Sed oportet tunc hos ægrorantes hunc potum longiori tempore assumere, verum qui à principio viribus constant, si forsan postea animo deficiant, pullorum etiam carne cibandi sunt: confortatisq; ipsis cibo ad solitam inediam redeundum est. Ediuerso verò viribus imbecillibus quibus à principio pullorum carnem concessimus, postea iam viribus recuperatis de nouo iniungenda tunc inedia eis est. Nanq; si nullo adhibito discrimine hæc curatio indifferenter in omnibus exercetur, hoc certe ligno vapulare quispiam

aut interfici, sicuti alio quopiam ligno possit. Vnde haud immerito apud auctores omnes veluti axioma dicitur, medicos dextro quidem oculo virtutem, sinistro vero egritudinem inspicere. Propterea ægritudinem inspicere debere. Quapropter Gal. 9. Meth. c. 16. vulgares medicos nullo discrimine in curatione ab eis obseruato curantes, futuri calciamenti eodē calapodio omnes calciare volentis recte sanē æquiparauit. Medica ergo

manu veluti habenis quibusdam firmanda inedia, vel virgenda est. Secundo, quod pro vlcerebus huius morbi hoc ligni decoctum exhibetur: oportere ea vlcera prius esse prorsus munda, ac pura, & os fa ab omni carie libera: secus enim bono caro non regeneraretur, sed sordida ut experimentū sepe nobis indicauit. Quarto, notandum q; si forsan æger capitis affectionibus laborauerit, vel paralytici

chadem atq; maioranam saluam, atq; rutam prædicto decocto esse commiscenda: oculis verò male affectis euphrasiam, chelodonium: artetica laborantibus camæpitim: in iecoris verò obstructione absynthium eupathorium: lyenosis verò splenium, caparis radicem: itomacho laboranti, mentā: renibus glyzyrrhizam. Ad quod præter experientiam cum optimo successu Gal. 13. meth. c. 14. visus est hallucinari. Nanq; ex huius morbi materia omnes morborum species atq; etiam hæcticam posse euenire periculo compertum habemus. Aduertendum rursus est, in fœminis hoc morbo laborantibus quibus menstrua defecerunt oportere in decocto ligni huius arthemisiā, ac choriandrum putei, vel capillum veneris, siue adianthos commisceri: quibus quidē euocandi menstrua virtus inest: quanuis periculo compertum habeam tempore quo hoc ligni decoctum ab eis assumitur, menstrua, vel minui, vel prorsus deficere, nempe sudore, atq; sicca inedia menstruorum materia consumpta. Quinto,

ut ante huius potus assumptionem vena si morbus, ut iam ostendimus, postulauerit fecetur, vel venter soluatur, vel vtrunque (si opus sit) fiat. Verum syrapi atque pharmaca pro qualibet materia digerenda atq; euacuanda in antidotario (Deo duce) explicabuntur. Sexto, non contricendum documentum est, interdum in hoc morbo euenire symptomata circiter vigesimum

Non esse exhibendū decoctum ligni Indici, ante integram vlcerū mundificationē.

Aduerte varias herbas commiscendas decocto ligni Indici secundum varias corporis affectiones.

Interdū secunda vena est.

Interdū ad aucta symptomata sic

miorē salu-
tis spem pol-
liceri.

Methodus su-
mendi deco-
ctum ligni
indici.

gesimum diem à decocti assumptione
graviora, quæ nempe ut sapissime exper-
tus sum firmiorem salutis spem pollicen-
tur, commotis nimirum tunc atrabilio-
sis materieb⁹ in hoc morbo prædominā-
tibus, posteaq; natura vitare euadente ut
in pugna aliorum morborū. Vnde non
abre Galen. 3. de crisibus cap. 2. & Ioan-
nes Alexandrinus, in commentarijs de
morbis vulgaribus: tempore status mor-
bi quando accidentia magis infestant ar-
tistam quidem medicū latari, idiotamq;
contristari asserunt. Idemq; Auice. 2. 4.
tract. 1. cap. 20. sensit apertè his verbis: &
scias quod signa mala cum aggregantur
& est dies creticus tunc spes est verior &
fortior quam si sit e contrario. Quibus o-
stenſis tempestiuum erit, methodum su-
mendi huius ligni decoctum docere. Su-
me igitur eius ramenti prædicto modo
electi lib. j. & in viginti libris aquæ pluuiā
lis intesta recenti per triduum infundito:
postea igne carbonum leui absque fumo
eo vsq; feruescat, vt ad lib. vj. redigatur,
cooperta olla inter coquendum recenti
operculo, deposita quæspuma cochleari
nouo ex eodem ligno Indico fabricato.
Hac igitur spuma tepida vlcera, vel tu-
bercula, seu dolorifica loca sunt illimen-
da siccis linamentis super impositis, om-
ni alio medicamento tunc posthabito,
vel abluantur decocto solius corticis hu-
ius ligni in vino albo veteri. Decocto igi-
tur modo dicto iam facto olla pannis ob-
seruetur cooperta vsq; in sequentem diē.
Tunc autem panno excolletur, exprima-
turq; atque in vitrea ampulla, vel quo-
piam alio mundo vase ad vsum referue-
tur: verum quod superſit post collatu-
ram ramentum in olla plena aqua adme-
dietatis consumptionem iterum ebul-
liat. Harum igitur decoctionum prima,
manēs sumenda, Quæ quidem medicina
lis syrupus nuncupatur. Secunda, verò in

prandio atque cœna, bibenda cōis potus
dicitur. Primæ igitur in solis ortu lib. se-
mis. bibendum dato repidæ. At verò si
vasculum quo ista aqua prima siue secun-
da propinatur, ex prædicto ligno fabrica-
tur, saluerrimum erit, vt experientia iā
diu me edocuit: sicuti lyenosis vase tama-
risci, & angina affectis vase hederæ bibe-
re summè prodesse compertum est, Aui-
cen. 2. canonis cap. proprio asseuerante.
Potione igitur iam assumpta æger pan-
nis siue stragulis inter sudandum coope-
riatur. Post quinque verò horas deposita su-
bucula panno lintheo à sudore absterga-
tur, & subucula alia induatur. Medici ve-
rò Flandriæ, vt certò sciuī, atque Itali in-
firmum prorsus nudum syndone tantum
inuolutum sudare iubēt: facilius enim, ac
citiùs multò dicunt syndonem quam su-
buculam posse remoueri. Cibus igitur
iuxta secundum documentum præpare-
tur, exhibeaturq; nempe debilibus,
assus pullus: virtute verò constantibus
passulæ, amygdalæ ana. vnci. j. biscocti
panis. vnci. j. semis, vel vnci. ij. Huiusmo-
di autem panis ex farina optimi frumen-
ti vino, saccaro, & aniso conficitur: à quī-
busdam verò vitelli ouorum adduntur,
licet interdum viderim pauperes plures
solo pane torrefacto loco biscocti optata
etiam sanitate frui. Potus verò prandij at-
que cœnæ sit aquæ secundæ: atque si
molestante quocunque tempore eam
concedimus. Transatis igitur quinque
horis à potu eadem quantitas primæ, de-
coctionis ligni tepida infirmo exhibea-
tur, atque totidem elapsis horis vt pran-
sus fuit, ita cœnandum, & ad nouem
vsque dies eadem inedia obseruetur. Car-
nis esu de cura regulari prohibito. Vnde
memini profecto iam diu quendam iu-
uenem, amicum atque affinem meum,
robustissimum sanè corrosiuis vlceri-
bus totius vultus atque vnius pedis labo-
rantem

Præcis medicis
italis, vñ
vñ in sube p
uo mbo.

aprand

rantem, salutis diu amissæ desyderantem me inuito eandem inedia tenuem per 25. dies obseruasse, & sic (Deo auspice) sanus euasit. Demum addendus, minuendus ve cibus est (vt iam suprà tetigimus) pro virtutis robore, vel imbecillitate: vbi robur est minuendo, vbi verò imbecillitas, vel animi deliquium (quocunq; tempore) addendo, ita vt virtus sola vtriusq; scopus sit. Prædictis igitur nouem diebus iam finitis ex regulari curatione pulli assimetatem pro prandio illis concedimus: pro cena verò assuetam inediā, duplicata tamen quantitate. Quæ quidem victus ratio post quindecim postea dies usurpanda est: quibus transactis noctu iam pullus assus cum biscocto pane pro cena concedatur: pro potu verò aqua secunda. At verò nutritis pullis fursure cum aqua huius ligni decocti confecto, prosperum certè euentum euenire vidi. Verùm interim memoria summo opere tenendum est, vt tribus elapsis diebus à potu vnus libræ primi decocti, altera libra in alijs viginti libris aquæ pluuiæ sicuti prius infundatur: vt sic anteaquam primæ libræ decoctum finiat, hæc secunda (vt ostēsum iam est) etiam per triduum infundi ac perinde concoqui possit, vt nullo intermittente die decoctum bibatur, & non secus, vsque ad triginta dies faciendum est. Sex quoque die libræ vnus decoctum ægris fumentibus, principio, medio, atque fine triginta dierum, aluo conuenienti pharmaco soluto, quorum pharmacorum in antidotario fiet mentio. Ceterum toto integro mense transacto atq; multo post: nullo modo valetudinarius manus neque faciem abluat, transacto verò mense, vel vino albo calido, vel ligni decocto tepido fieri poterit. Cura etiam maximè adhibita vt æger optima victus ratione vtatur, prohibitis ei viri-

dibus, falsis, acetosisque cibis, & non sibi, sed sensim ad solitam consuetudinem reducat, & per aliquam temporis intercapedinem aliquo catapotio corpus euacuetur, atque aquam secundam decocti ligni sit ei communis potus per aliquod tempus: secus enim morbus iam penè solutus forsitan denuò reciduiam faceret. Sed hic obiter notandum quosdam ægrotantium interdum reperiri nullo modo volentes, vel valentes legibus huius decocti ligni subijci. His igitur alterum duorum consulendum erit, aut si rupum decocti huius ligni in antidotario describendum per triginta dierum spatium maneat in quantitate vnci. ij. affluere cum bono regimine, & potu aquæ secundæ: aut si hoc facere renuat, licebit tunc per multum tempus decoctum huius ligni pro communi potu cum bono cibo penè solito assidue bibere, oī alio potu prætermisso, interposita interdum, si fieri possit aliqua corporis euacuatione. Hoc nanque modo multos certè vidi non solum ab egritudine, cuius causa potus decocti ligni illis propinabatur incolumes euadere: imo præter spem ab alijs antiquioribus affectibus, vt à surditate ac suffusione quod mirum est. Quod videns quidam valetudinarius alia omni potione deinde sprete per annum atque longius tempus hac duntaxat cum solito cibo fuit usus. Verùm quia hanc secundam speciem huius morbi allopecia sæpe consequi solet, nonnulla mihi experta medicamenta aduersus hanc luem in antidotario describentur. Neq; prætermittendum est breuiter agere de alia curandi via, quam hominum sollicitudo, solertia atque necessitas post ligni huius iuuentionem excogitauit, nempe quæ rubo Indico, vulgo, çarça parrilla, graminis specie vt quibusdam placet: alijs verò lupulorum, perficitur. Atque

alimena dormire
de laboribus
tmd.

Renuatibus
decoctū, li-
gnis legi-
bus sumere
quid expe-
diat.

de affectibus, qui sū-
nt sicuti curant, &
non solum in his de
dicam indicis fidei.

Modus quo similis
aspera aut radice
sine triduo, idem
est cum supradicto
modo de gynoindico

etiam eam curationem quæ radice chine molitur inuenere. Vtriusq; curatio à curatione potus ligni Indici paucis differt, nisi quodd sicuti lignum per libras: isthæc per vnc. iiii. vna quaq; vice cum minori aquæ quantitate, nempe in lib. xvj. decoquantur, & quia calidiora aliquantò sunt, breuiori tempore, tenuiori; victu exhibentur. In alijs verò eadem est propinandi methodus. At vero, siue hac sumpta portione, siue illa decocti ligni ad sudorem ciendum, si sudor ipse pigre moueretur, confert pedibus & alis vaccuias veficas semiplenas decoctione actu calida aneti, pulegij, roris marini, & similibus apponere. Sudor enim inde conflatur. Quidam verò decoctum ligni Indi in vino exhibet: quod non laudo nisi forsan senibus admodum pituitosis vel regionem frigidissimam incolentibus ac præsertim tempore hyemis vinoque valde assuetis.

CAP. X.

De curatione secundæ speciei huius morbi per topica medicamenta.



DIXIMVS AVTEM, admonuimusque præcedenti capite decoctum huius ligni eis qui vlcibus laborant, nullo modo absque curatione esse exhibendum. Cum enim carnis productio naturæ opus sit, sicuti subtractio artis auctore Galen. 3. meth. cap. 6. nisi vlcera prorsus munda ac pura sint vitiosa caro à natura in ipsis generaretur contra verò puritate in vlcere reperta

tunc facile natura carnem puram alit. Igitur vlcera si fordida sint: facta vniuersali corporis euacuatione non solum mûdificanda, sed abstergenda ab omni forde prius sunt, veluti vnguento apostolorum, vel si opus sit in maiori necessitate abstersionis AEgyptiaco vnguento: at verò adaucta magis in vlcere vitiosa caro, puluere Ioannis de Vigo dematur (dico autem Ioannis de Vigo iuxta vulgi opinionem) licet alij superiores eo medici hunc puluerem adinuenerint, nempe Nicolaus Mafa suo libro de morbo Gallico, ac perinde Leonardus de Vertapallia, sed longè fortius puluis ille operatur, vt sæpe expertus sum, si linamentum, vel torunda prius in aqua alchimistarû, deinde in prædicto puluere intingatur, vel potest quopiam alio potenciali corrupta caro prorsus absumi, sicuti eo quod ex vnguento populeone, opio & semine Iusquiami ana. drag. sem. & sublimato. drag. j. conficitur, puluerizatis nimirum puluerizandis, & cum vnguento commixtis. At verò si fortius adhuc id medicamentum fieri oporteat de sublimato addito: si mitius, minue. Aliud quoque ad idem facere consueui, ex frusto suillæ carnis, scilicet, pinguis perforatæ crebris foraminibus, ipsisq; sublimato puluere impletis. Hoc igitur verum figatur igneque, assetur, & quæ inter assandum effluat pinguedo in uasculo aqua rosata pleno recipiatur, & postea digitis subigatur, & proficuum potentiale habebis, ad interficiendos etiam mures id præstat. Aliud nonnunquam potentiale aliter conficio ex puluere sublimati cum candido oui cõmixti, atque exiccati & in pollinem redacti. Alio etiam vtor, nempe ex puluere sublimati dragm. ij. cū succi iusquiami vnc. j. commixti, & exiccati, & postea in pollinem redacti. Nec minus ex rasura panni lini veteris cum aqua alchimistarû commixta

Nota. Scilicet, ubi multum mediocris cur inueniatur.

Modus augendi vel minuendi cau si operatio nem.

Varia causa medicamenta.

Precautio-
nes & mo-
dus admo-
uendi cau-
stica medi-
camenta.

Longe secu-
riorem effi-
cūm actua-
lis quam
potentialis
cauterij: &
rō nī qū
rarissimē.

mixta & post exiccationem in pollinem reddito. Hæc sunt potentialia mihi experta. Admouenda tamen cautè sunt, secus enim multa adferunt interdum incōmoda. Modus verò admouendi est post corporis euacuationem cum inedia vergente ad frigiditatem & humiditatem, & post causticum admotum (secuta forsan notabili alteratione) secunda vena est: adaptandi verò modus fir talis. Pona tur pecia panni lini cum vnguento albo in medio secundum quantitatem vlcis perforata, ita ut totum vlcus pateat: postea ipsi tantum potentiale subtiliter applicetur, super impositis demum filis ficcis: deinde pecicula panni lini cum aliquo medicamento super imposito veluti est vnguentum, dimidiæ confectionis, seu pallidum, in circumambitu verò vlcis pannos oxirato, & succo plantaginis, vel folani madefactos, ut caliditas ex potentiali superueniens prohibeatur: qui bisteriæ in die immutentur: post eā vaccino butyro, vel medicamento ex oui vitello atq; rosato guttatim commixto vlcis crusta euellatur. Demum vlcera emundentur & carne impleantur cicatrice in posterum inducta medicamentis in antidotario describendis: At verò si ossis caries in vlcere reperiatur quod visu, vel specillo dignoscas (retinetur enim specillū in carie ossis) tunc, curatione sequenti capite, quo de tertia specie huius morbi agitur curāda chirurgia est. Sed in calce huius capituli aduertito obsecro superposita cauterij actualis, seu potentialis necessitate, fugiendum prorsus à potentiali esse, atque actuali utendum: nisi forsan, vel æger timidus admodū sit, vel syncope capi consuetus, vel necessum sit aliud, nempe à principi aliqua particula humorem molestantem reuellere, vel deriuare, seu interciperi, vel ad locum cauterizandum trahere tunc enim maiore

mora caustici operationis huiusmodi materies magis atrahitur. Caterum in alijs longè tutius est actuale cauterium ipso potentiali ut neminem lateret: vtriusque enim operatio, meo iudicio, sanguinis missione, & alui solutioni æquiparatur: illa enim digito cum voluerimus statim cohiberi poterit: hæc verò nullo modo. Sicuti sagitta è manui aculatoris semel iaculata, ut Gal. æquiparavit: sic igitur actuali cauterio in nostra potestate ac electione est, hanc, vel illam partem in summo, vel alto parum, vel multum adurere: in operatione vero potentialis nullo modo. Vnde Galen. de pernicio caustici. 2. de symptomate. causticis capite. 5. agens: Si causticum, inquit, medicamentum particula vlcera imponas, primò quidem dolent: postea rigent: mox febriunt &c. & Albucasis libro primo. capite primo. Scitote, inquit, fratres, quod ex secreto curationis per cauterium cum igne & bonitate eius, super medicina comburentis est, quoniam ignis est simplex, cuius actio non peruenit, nisi ad membrum quod cauterizatur, & non nocet membro coniuncto cum eo, nisi nocumento paruo: Medicinæ verò comburentis actio venit ad illud quod elongatur ex membris, & fortassis facit accidere in membro ægritudinem difficilis sanationis, & fortasse interficit: ignis verò propter subtilitatem, & bonitatem substantiæ non facit illud &c. Deniq; ut caustici perniciem summatim dicam audiat obsecro Guidonem tractatu. 4. capit. 8. de vlcibus coxarum, ubi inquit: caue de quantitate corrosiui, seu caustici, quia ex hoc pericula vidi à quibus nos liberet omnium liberator.

Authoris cō-
paratio in-
ter actuale
& potentia-
le cauteriū
cum venise-
ctione & a-
lui solutio-
ne.

Præsym-
ptomata &
vite disci-
mina inter-
dum eueni-
re ex caustici
applicatio-
ne.

CAP. XI.

De curatione tertiæ speciei
huius affectus.

Vando aut huius tertia mor-
bi iam species accedit (in qua
æger ultra ea incommoda,
quorum iam facta est men-
tio) ossium etiam carie et scyrrhosis eo-
rum tuberculis affligitur nunc opus est,
accuratius multo rem tractare, & licet di-
ctitata repetere sæpius videar, non tamē
in memoriam reuocare sinam oportere
semper corporis euacuationem medica-
menta topica præcedere. Quandoqui-
dem Galen. id nos passim docet. Hac igi-
tur peracta ubi vlcera carnem erodentia
ad sint (vt præcedenti capite dictum est)
curentur: auxilio etiam ab antidotario as-
sumptō. Verum si tubercula ossium scyr-
rhosa (quæ Auenzoar etiā libr. 2. Theisur
tractat. 6. cap. 5. ossis in grossationem præ-
ter naturam nūcupauit) innascentur, ip-
sa interdum mercurij vnctionibus & to-
pici medicamenti curatur, interdum
verò non sine chirurgia, vel manuali ope-
ratione. Medicamenti igitur his huius-
modi tubercula nonnunquam curari so-
lent, dummodo cariosa non sint, videli-
cet pharmaco solutiuo, in antidotario de-
scribendo, corpore prius euacuato, dein-
de Recip. aceti sambucini acerrimi vñ-
ci. ij. succi foliorum caulium rubeorum
vñci. vij. olei ligni Indici, olei cucumeris
agrestis ana vñci. ij. fellis vacini nume. j.
cum sufficienti quantitate pulueris ligni
Indici, & florum chamæmelli, & roris
marini floris ana. confice emplastrum.
Ad idem summe cinnabaris vñci. ij. cum
aceto schilitico & melle æquis portioni-
bus mixtis fiat omnium commixtio, quo
tuberculum ossis liniatur, apposita de su-

per lana succida, & hoc certè medicamē-
tum prodesse solet. Cinnabaris nanq; est
veluti argentum viuum potentia, con-
stat enim quæ arte factitia est ex argento
viuo atq; sulphure: cæterum quæ vera est
fossilis ex minera argenti viui veluti la-
pis ruber extrahitur, quem iam diu vidi.
Rursum cæratum illud Ioannis de Vigo
id quo argentum viuum, & viperæ axun-
gia, & oleum croci, & cætera ingrediun-
tur. Nec minus oleum ligni Indici in anti-
dotario describendum ad hoc prodest.
Aliud ad idē, vñge melle calido ossis tu-
berculū & superpagito puluerē chamæ-
melli & chamæpitis superimposita cefy-
pilana, deinde ligatura. Ad idem quoq;
præstat lixiuium ex cinere ligni Indici,
& roris marini & palmitum, commixto
pauco aceto sambucino, & sponsia no-
ua in eo infusa, atque expressa loco prius
melle illito vt sponsia melius adhæreat,
quæ quidē deligatura cōprimatur. Suffi-
ciens etiā lapidis piritidis igniti in aceto
acerrimo proiecti, vel loco eius lapidis
molendini pretium opere est. Sed oportet
vt docet Galen. 14. metho. cap. 4. non
vti aceto in hoc casu longo tempore, nec
internitiā. Sed morbo iam adducto, & nō
nisi cum præparata iam sub emolienti-
bus pars fuerit: quia aliter læderet: præfer-
tim in locis neruosis, lamina quoq; plum-
bi superimposita iuuamento esse solet.
Sed ne hinc inde lubricet, oportet super
aliquo emplastro applicari in panno li-
ni: cuius emplastri quantitas, super emi-
neat quantitati bractææ plumbi, vt ip-
sa ossis tuberculo melius adhæreat, ac
minimè diuagetur. Neque obstat plum-
bum frigidam temperaturam discussio-
ni oppositam fortiri, Galenus nanque
9. de simplicibus capite de mollibdos, id
est, plumbo asserit, discutiendi virtu-
tem habere, & scyrrhotos nodos per
halitum digerere, idemq; multi authorū
asserunt,

Duplex cin-
nabaris spe-
cies.

Varia medi-
camenta to-
pica ad os-
sium scyrrho-
sas durities.

Opportere
semper cor-
poris eua-
cuationē to-
pica medica-
menta præ-
cedere.

Plumbū quan-
vis frigidū,
virtutem ali-
quam discen-
tēdi sortiri.

asserunt, an quia inest plumbo comple-
xio debilis nexus: cuius meminit Aui-
cenna secundo canonis capit. primo. in
qua quidem complexione: partes mixti
non sunt firmæ, sed faciles ad disgregan-
dum. Et sic partes calidæ elemētales, par-
tim plumbum constituentes, possent di-
scutere ganglium, ac cirrhosās duricies.
Nulla enim medicina à Deo frigida est,
quin partes aliquot caliditatis obtineat,
& è contra: Et in hoc longa esset indaga-
tio phisica quam tractatu meo de ossium
fracturis longè reperiēs. Auerois quoq;
quinto collig. capit. de medicinis quæ ex
mineris sunt huius etiam causam aliter
docens, inquit, quod licet plumbum fri-
gidum sit, habet tamen virtutem dissolu-
tiuam, comparando ipsum carni homi-
nis. Vtrum autem ossa possint apostema-
ri dubia certè questio est, sed sub breui e-
pilogo hæc est eius resolutio, nempe du-
plicem esse apostematis generatiōis mo-
dum, scilicet, verè & propriè, sicuti mem-
bra raræ contexturæ apostemātur, in qui-
bus quidem, vt communiter dici solet,
prius replentur venæ magnæ, deinde par-
uæ, postea membri porositates Galeno li-
bro de tumoribus præter naturam capit.
secundo. quo quidem modo ossa verè
non possunt apostemari, tum sua duri-
cie: tum etiam quia prædictorum sunt ex-
pertia. Aliter verò non propriè & verè,
sed impropriè & similitudinariè: omne
enim membrum quod alimentum susci-
pit aptum est cum eo aliquid recremen-
ti recipere, quo præter naturam exten-
so intumescit, & idem suo modo ossibus
secundum eorum capacitatem, accidit
secundum partem super partem indurata, do-
nec quis tumor & extensio emineat, in-
grossata nimirum aliquatenus ossis caui-
tate. Vnde Galen. sexto metho. cap. quin-
to. planè intelligens ossa veluti mem-
bra reliqua verè ac certè apostemari non

posse, sed impropriè ac non verè, vt dixi-
mus, inquit. Nec sane mirer si phlegmo-
nes quidam simile etiam ipsis fractis ossi-
bus accidat. Quem Serapio imitatus in-
quit: si dentes viriditatem in toto suo re-
cipiant corpore, tunc non est mirandum
quod consequatur eos illud, quod simi-
le apostemati existit. At verò qui hanc
tractationē impensius videre capit Con-
ciliatorem differentia. 96. legat. Verum
si præfata ossium tubercula medicamen-
tis vniuersalibus, & particularibus non
cædant, chirurgia certè opus erit. Sæpius
enim carne ipsa penè illæsa, nulloque pu-
rè intus genito (quod mirum est) in hoc
morbo reperitur, quod pæssim videmus,
& mihi quidem non rarò contingit, hu-
iusmodi tubercula puris & interdum do-
loris expertia in capite aperire, ex tem-
ploque vtranque ossis caluarie tabellu-
lam, vsque ad duram cerebri membra-
nam prorsus vitiatam inuenisse: ægroto
postea (Deo auspice) euadente (mirabile
sanè dictu) cuius causam prius indaga-
bo deinde eius curam aggrediar. Cau-
sa igitur forsitan esse potest, aut quia at-
trabiliosa materies in his tuberculis, vt
plurimum peculiaris frigidæ, ac siccæ
temperaturæ cum sit, ossibus ipsis ea-
dem etiam temperatura præditis pro-
fus adhæreat, carne verò parum, vel ni-
hil vitiatæ: Aut quia huiusmodi attrabi-
liosus humor proprium ossium & mem-
brarum alimentum recremēta etiam
secum ferat. Quibus ad auctis ipsa ossa po-
tissimum vitientur, & aliquatenus præ-
ter naturam intumescant, caro autem
non itidem: A. ut fortassis, quia agentia
fortia in passio magis resistenti intensius
agūt, neglecto ab ipsis passio debiliore. Au-
tore em̃ Philosopho, non quodlibet agit
in quodlibet, sed determinatum in deter-
minatū. Et hac etiā ratione. 3. Meteororo-
rum capi. i. inquit, resistentia patiunt ali-

Sæpe carne
illecisa in hoc
morbo ossa
carie afficiū-
tur & ratio.

quid, quæ autem non nihil: unde fulmen hominem interfecit, vestimenta tamen eius non combusit. Atque ut inquit lanceæ æreæ infixæ in clypeo ligneo fuerunt liquefactæ, & lignum propter raritatem nihil fuit passum. Sic igitur humor ille at trabiliosus magnæ certæ impressiōis potius in os magis resistens quàm in carne nullius resistentiæ operatur. Sed reliquū

Lethalia si-
promata in
vulnerib⁹ ca-
pitis sæpè i
hoc morbo,
osis cor-
ruptis & me-
brana cere-
bri detecta
citra vitæ di-
scrimen eue-
nire.

haud minoris admirationis explicandum superest: nempe læthalia propè semper symptomata quæ capitis vulnera, præsertim cum oſis contractione comitari sæpè solita sunt, ut febres; inordinatosque rigores, ac vomitiones: in tuberculis tñ capitis ulceratis cum maxima oſis erosionē, etiam cerebri membrana detecta: vel prorsus deficere, vel ut plurimum citra mortis discrimen euenire. Quod experientia nobis sæpè indicauit. Interdum enim vidimus quosdam ægrotantium tuberculis capitis circiter medietatem anni laborantes; eisdemque symptomatibus cruciatis, facta apertione, & oſis rasure, & cerebri membranis mūdificatis (Deo auspice) incolumes euasisse. Interdū verò nullo prædictorū adueniente symptomate dicta methodo sanatos fuisse: cuius quidem euentus nonnullæ se nobis offerunt causæ. Prima, aut quia natura ipsa ne

Quare ali-
ter vitæ pe-
riculū à so-
luta conti-
nuitate ex-
terna alter
ab interna
eueniat pri-
ma causa.

scio quidnam sceleris nō solum cū hoc, sed etiam cum alijs plerisque morbis contraxerit, ita ut ipsa remissius multò à solutione continuitatis interna sensim euenienti offendatur, veluti sibi minùs extranea quàm ab externa subito inflicta: hac enim multò magis, & citius spiritibus exhalatis natura ipsa debilitat, quod patet. Nam licet Hipp. 6. Aph. 18. dixerit, solutam continuitatem vesicæ, cerebri, & cordis &c. esse lethalem, compertum tamen est: hoc debere intelligi solutione continuitatis à vulnere exteriori illata: non autem interna. Nanque inflammata, siue vl-

cerata vesicæ: in veterno quoque, siue lethargico cerebri abscessu, vel phrenitide solutio continuitatis interna reperitur ægrotis tamen sæpius euadentibus, ut Rasis tum primo, tum etiam. 10. continētis, & Auic. 1. 3. cap. 8. tum etiam. 19. 3. apertè asserunt. Corde etiam abscessu saltem frigido laboranti interdū æger seruatur, ut Auenzoar. 1. li. Theisir. tract. 12. ca. 7. & Auic. 1. 3. tract. 1. cap. 2. senfere, sed so-

Secūda cau-
sa.

lutione continui à vulnere exteriori eueniente nequaquam, nisi veluti miraculo vulnerati seruentur: aut forsan causa alia simul esse poterit, quia in vulnere capitis ad interiora penetranti sanguis, seu alia quæuis humiditas facillè ac subito superduram cerebri membranā irruit, ac prolabitur. Præterea inde adducens symptomata. Oſsa verò tuberculis huius morbi corpulentiora, atque aliquatenus tumentia cum sint: vitiosa humiditas attrabiliosa oſsibus tēperatura ad similes, in ipsis quadamtenus inflatis imbuta retinetur, cerebri membranis non lædens. Quibus obiter non absque ratione enucleatis, ad curationem redeamus. Aperto igitur, vel ra-

Tamē a-
perto os ca-
riosum radē-
dum.

torio, vel candenti ferramento oſis tuberculo: nudatoque vitiato oſse post corporis totius, ut dictitatum est, euacuationem, euulsaque postea crusta siue ignis scara, os purum atque ab omni carie mūdum reddere oportet, quod scalpris, siue rasorijs instrumentis perficitur eo usque ut os lubricū ac lene rasure prorsus euadat: deinde actuali cauterio os tangere oportet, ut vitiosa humiditas in eo, eiusque circumferentijs imbuta prorsus absumatur, ut auctoribus recentioribus placuit. Deinde oſis superficies tum rasure, & igne, tum etiam medicamentis, & aere ambiēte à natura alteratur, expelliturque: pura deinde carne ab ipsa subtus regenerata. Methodus verò recta adurēdi cariosa ossa iam scalpris rasa est, ut si tēpus tu-

Methodus
adurēdi of-
sa post raso-
nem.

lerit,

lerit, fructum virentis cucurbitæ in medio perforatæ secundum quantitatem ossis cauterizandi super membrum applicetur. Demum cauterium cautè admovento: forte nimirum in magna ossis corrosione, debile verò in parua. Cuius quidem viridis cucurbitæ applicatio primo sua actuali frigiditate ignis incendium ac exarsionem temperat, ac refrigerat, atque etiam humorum fluxionem cohibet. Prohibet etiam ut plusquam oporteat locus igne non tangatur. At verò si viridis cucurbitæ tempus non sit, triplicato panis in medio perforato, in aqua rosata infuso, id fieri poterit. Sed in hoc aduertito obsecro quod si fortis fiat cauterizatio, nempe cauterio moram super ipso osse contrahente, non opus esse ratione, ut iam longa experientia didici. Sic enim cariosum os totum, ignis incendio sensim à natura expellitur. Sed considerandum etiam est in osse capitis carioso nullo modo cauterizatione, ut in alijs cariosis ossibus esse utendum, ne, ut in alijs cariosis ossibus esse utendum periculum enim esset, ne cerebrum ignis incendio coagularetur. Mortis inde occasione oborta, ut experimento iam vidimus. Sed ratione tantum scalpris admota opus est, deinde aqua alchimistarum os rasum duntaxat tangere oportet. Huiusmodi enim ossa quantunvis cariosa prædicto modo cum tenuissima sint, à natura citra periculum expellerentur, maxime aeris extranei, & medicamentorum atque etiam puris contactu, ut innuit Hippo. lib. de vulnerib. capitis. Vtrum autem in cariosis alijs ossibus eadem methodo nempe detectione & aquæ alchimistarum contactu citra rationem, & visionem curatio fieri possit, & sic à natura expelli sicuti in capite: dubium non contemnendum est. Cui respondetur tripliciter ratione in alijs ossibus densioribus id fieri non posse, primo quidem quia capitis ossa tenuissima admodum sunt: tum etiam secundo

quia membrum admodum frigidum ei subest, Nempe cerebrum tertio, quia os capitis paucula carne vestitur, in alijs verò ossibus omnia contrario accidunt modo. Namque ossa crassiora & solidiora sunt: medulla verò, quæ ipsis subest, calida & humida secundo de partibus animalium cap. 7. caro etiam in ipsis corpulentior admodum est. Quibus contingit ea ossa capitis illæsa quantuncunq; à natura posse expelli: alia verò ossa non itidem ut probatum est.

Sed tempestivum iam videtur, ut ad curationem tertie speciei huius affectus perficiendam redeamus. Admota igitur (modo ostenso) ossis cauterizatione siue in ipso osse præter naturam adaucto, ac si mul carioso, siue carioso tantum, eleuataq; crusta, seu scara butyro vaccino, vel quoque alio humectante atq; calfaciente medicamento, tunc vlcus prorsus muni dari oportet, ad quæ nempe intentionem, (ut expertus sum) illud Avic. medicamentum. 4. 4. capi. de vlcere cum osse corrupto, maxime facit. Habet enim virtutem non solum ossium frustula extrahendi, sed etiam producendæ carnis. Quod recipit Aristolochiæ, Aloes, Myrrhæ corticis plantæ opoponacis, cambil adusti, corticis pini añ. aggregetur cum melle & est, ut inquit, mirabile faciens cadere ossium cortices & nasci desuper carnem bonam. Sed miror certè Avic. 2. canonis cap. de cambil, quid nam esset cambil asseuerantem, dixisse esse terram rubeam minutam sicut arenam, minoris rubedinis quam illa quæ in felle bobis reperitur. Hoc nanque sanè nil aliud videtur quam ignotum per ignotius interpretari. At verò licet quid sit cambil ignoremus, scimus tamen terram esse admodum siccam atq; calidam in tertio gradu, ut idè Avic. testatur. Quæ quidem membris siccoribus, nempe ossibus accommodatur. Sicciora enim secundum

Curatio tertie
speciei Suluus morbi

Proficuum
medicamen-
tum pro vl-
cere ossis
corrosione.

Quædam de
cambil tanquam
de Avic. 4. 4. capi.
2. 4. c. 11. +

Quid sit Ca-
bil cum igno-
retur loco ip-
sius calcini-
de vlti uten-
dum & r. 6.

naturam

2. 4. 4. capi.
2. 4. 4. capi.
2. 4. 4. capi.
2. 4. 4. capi.

Ossa capitis
cariosa ra-
denda & nul-
lo modo ut
alias caute-
rizanda.

Quævis ossa
cariosa capi-
tis detectio
post rationem
à natura ex-
pelli possent
non itidem
alia ossa, &
causæ.

naturam ficcioribus egent medicamentis, Galeno asseuerate lib. 3. artis medicæ capi. 43. Eadem itaque ratione loco cambil in hoc medicamento Auicennæ chalciti de vsta lota, exiccataque impollinem redacta vtor: easdem enim vires nempe calfaciendi, & exiccandi in tertio gradu sortitur. Cui nempe snix Serapio nec non Bertapaglia suffragari videntur. Facta igitur iam prorsus siue hoc, siue alio quopiam medicamēto vlceris mundificatione, natura suo munere vtens carnem alit, industa in vltimo cicatrice medicamentis in antidotario ad hoc paratis. At verò vt firmius caro ac cutis generentur sine reciduationis metu, tunc temporis siue in secunda siue in tertia specie huius morbi præsertim in nomis seu vlceribus corrosiuis opus est ad linimēta mercurij, id est argenti viui tanquā ad sacram anchoram recurrere. Sed anteaquā ad alia digrediamur, vnde nam Mercurium huic morbo prodesse à superioribus medicis inuentum sit, sequenti capite differemus. Deinde in duobus alijs proximioribus. Primo quidem an eius vsus sit tutus, tractabitur. Secundò verò de eius temperatura: præterea varia linimenti compositio secundum varias ægrotantium temperaturas describetur.

C A P. XII.

Quo indagatur quonam pacto antiquiores Medici argentum viuum huic morbo pro futurum esse inuenere.



VI A curatio huius aduersæ valetudinis, post multa annorum curricula denuo homines infestantis, medicos illius tēpestatis alioqui eruditissimos prorsus latebat, ita vt adhibitis debitis præfidijs, nullamq; opem eis adferentes per aliterius morbi sibi similis curationē huic

etiam satis rectè curare tentarunt: forsan huic Cornelij sententiæ lib. 1. cap. proœmiali innixi, sic scribentis. Si incidat genus mali aliquod ignotum non ideo tamen fore Medico de rebus cogitandum obscuris, sed eum protinus visurum cui morbo id proximum sit, tentaturumque remedia similia istis, quæ vicino malo sæpè succurrerunt, & pereius similitudinē opem reperturum. Inuenere itaque Medici hunc morbum lichenis, vel asaphati, vel prauæ foedæque scabiei, vel malo mortuo, vel elephantia quadantenus esse ad similem, pro quibus quidem curandis Auic. 7. 4. tract. 3. cap. de scabie, atque auctores alij medicamentis in quibus argentum viuum ingreditur, vtuntur. Nec sanè medicos illius temporis vnguentum sarracenicum Arnaldi de Villano-ua. 2. breuiarij cap. de foeda scabie curanda latuit, in cuius vnguenti constructione potissimum argentum viuum commiscetur: quippe, quod oris expurgatione, atque muscillagineæ materie longa expuitione foedæ scabiei, atque falsæ pituitæ, alijsque huiusmodi prauis affectionibus, vt ibidem dicit, & experientia docet, medetur. Hinc igitur sumpro indicio medicamentis cum ipso mercurio commixtis in hoc morbo vtī cœpere: atque inuenta ex hoc utilitate secundum laborantium temperaturam, & alia à circumspectis Medicis, tam in victus ratione quā corporis euacuatione aduertenda, argenti viui vsus in huiusmodi vnguentis in hunc vsque diem receptus fuit.

C A P. XIII.

Quo prima fronte probatur mercurij simplicis vsus, neque huic morbo, neque alijs conuenire. Demum extinctum atque modèramine commixtum esse proficuum.

Quid mor-
binatura i-
gnoraturcu
ratione alte-
rius sibi si-
milis proce-
dere media-
cus debet.



T distinctius huiusmodi quaestio-
nis veritas omnibus pa-
teat prima facie vñ nullo
modo argenti viui illinitio-
nem laborantibus hoc mor-
bo conuenire. Primo, quidem quia vene-
nosa eius materies quoad eius saltim con-
tagionem veneni naturam prae se fert. Er-
go argentum viuum, quod antenus apud
omnes venenosum minus ei opitulari pote-
rit. Confirmatur, quia ex regula topica,
tale additum tali facit ipsum furere. Ul-
tra hoc ipse etiam mercurij est dentibus,
visui, cerebro, neruisque ab eo propaga-
tis maxime nocere, paralyticumque inge-
rere Auic. 2. canonis. cap. de argēto viuo
asseuerante. Rursus argenti viui propriū
est materies à circumferentijs eo illitis ver-
sus centrū repellere. Igitur non confert.
Amplius, quod praecipuis mēbris inimi-
catur tantū ab eis, vt opem ferat, vt maxi-
mē noceat: sed huiusmodi est argentū viuū: er-
go. vnde Auic. 3. 4. tract. 3. ca. de cura sca-
biei inquit: Elonga illud vnguentum in
quo ingreditur argentū viuū à partibus
stomachi, & mēbrorū nobiliū, ergo, sed
huiusmodi oppositū periculo cōprobat: nāque
tam in sedandis doloribus, q̄ extirpandis
puistulis, medēdisque vlcēribus huiusmodi mor-
bi: argentū viuū cū hoc morbo fœdus, pa-
stūque cōtraxisse cōpertū est. Rursus sca-
moniū, eleborus, seu veratrū & eis similia
mēbris principibus infestissima, ac dete-
riora sunt q̄ argentū viuū, sed eisdē, vt o-

portet correctis iatus extraque corp⁹ assi-
dus vtimur, igitur, Insuper illiacz passio-
ni Paulus mercuriū exhibendū cōmēdat
lib. 7. ca. 3. & tandē Gal. lib. 9. de simplici
medicina cap. 3. 1. de hydrargiros, id est,
de argēto viuo fatei, nullū ipsius habuif-
se periculū, nec occideris ebibiti, neq; fo-
ris ad moti. Ego verò iā sepius vidi argen-
tū viuū exterius allitū, interiusque exhibi-
tū, non solū nocuētū nō attulisse, sed
etiā iuuamento esse: eorūque, vt puerulis
dent ipsum vetule: ipsis illas is euadētibus.
Ad argumēta verò ad primū dicēdū, sup-
posito argentū viuū aliquatenus esse ve-
nenosum: non tū esse incōueniēs vnū se-
pius venenū alteri commixtū eiusdē esse
remedium, vt Plinius lib. 27. capi. 2. lepi-
disimē refert. Nanque alterū alteri de-
struens æger præter spem seruatur, vt Ga-
len. lib. de Theriaca ad Pisonem narrat
de quodam laborante elephantia, seu le-
pra, qui aquam in qua suffocata fuerat
vipera bibit, & illas is euasit, atque de
alio eodem morbo correpto cū mes-
siores vinū exhibuissent, in quo itidem vi-
perā inuenerāt suffocatā interficiendi ip-
sum gŕa & pariter seruatus fuit. Quæ qui-
dē venenorū inter se se destructo non so-
lū sūt cōparatiōe vnus veneni ad morbū
venenosum infirmi, vt ostēdim⁹, sed etiā
vnus veneni cum altero, vt sequenti epi-
grammate de ipso argento viuo alteri ve-
neno commixto ægro felicissimē eua-
denti patebit.

non est
lib. 1. 1.

Ad primū.

Vnum sepe
venenum al-
teri destruc-
re & exē-
pla.

Satisfacit
obiectioni-
bus.

Toxica Zælotypo dedit vxor mœcha marito
Nec satis ad mortem credidit esse datum
Miscuit argenti lethalia pondera viui
Cogeret vt celerem geminata necem.
Diuidat hæc si quis, faciet discreta venena
Antidotum sumet, qui sociata bibat.
Ergo inter se, dum noxa pocula certant,

Cæsis

Cæsis lethalis noxa salutifera,
 Protinus & vacuos alui petiere recessus.
 Lubrica deiectis qua via nota cibis.
 Quàm pia cura Deum prodest crudelior vxor:
 Et cum fata volunt bina venena iuuant.

Ad secundum.

Ad secundum verò argumentum dicendum, aut illud de argento viuo in sua minera existente esse intelligendum, aut de eo quod exterius neque extinctum est, neque villo modo correctum, & quantitate adaucta administratur, aut iuuamenta ab eo correcto, & commixto esse longè vtiliora aliquantulo nocumēto postea remediabili. Ad tertium verò responderetur multum discriminis esse inter repercussionē aliam quæ frigidis medicamentis molitur, & hanc quæ linamētis calidis: in illa enim materies ad interiora repellitur, intusque retenta nocet:

Ad tertium.

in hac verò etiam si repellatur varijs quidem vijs nempe longa expuitione, vel alui pro fluuio, vel sudore eximio ab ipsa natura extra corpus propellitur, ut cuilibet in huius morbi curatione exercitato patebit.

Ad quartum verò dicendum eruditos **Ad quartum.** Medicos vnguentis in quibus argentum viuum ingreditur, super ipsa præcipua membra non admouere, sed extrema duntaxat corporis eis illiniunt, nempe brachia & crura à cubitis, & genubus infra, atque inter vngendum confortatis ipsis præcipuis membris.

CAPVT. XIII.

Quo longè tractatur de temperatura mercurij, siue hydrargyros, id est argenti viui, quo in linimentis pro huius morbi curatione vtimur, & de varijs in hoc auctorum sententijs, eorumque cōcordantijs.



Maxima me præsit cura iā diu in argēti viui temperatura indaganda. Quidā em̄ vt Constantinus. I. I. practicæ cap. de virtutibus metallorū. Platearius etiā circa instans cap. de argento viuo. Haliabas in regali dispositione. 2. pract. cap. de metallicis corporibus in. 4. gradu calidū esse censuere. Rasis quoque. 3. ad Almanforē eō vsque calidū censet, vt dicat: qñ extinguit ardens est, & sublimatum sicut ignis adurit. ¶ Quidā verò ē diuerso, vt Auic. 2. canonis cap. de argēto viuo, & Albertus magnus. 4. lib. de mineralib. capi. de natura

argēti viui. Guilielm. quoque; Placētinus 5. suæ chirurgiæ lib. ca. 10. frigidū, & humidū esse asserunt: In alijs quoque; auctorū libris frigidū in. 4. gradu esse reperit. Quorū auctorū quilibet in sua assertione probanda à qualitatibus moriuis, atque alteratiuis, siue effectibus indicia assumūt. Primo quidem ex magna ipsius argēti viui agilitate, motuque; hinc inde assiduo, atque celerrimo cursu à caliditate prouenientibus: ab alteratiuis verò siue effectibus, sudoris cōcitatio, qui ex cōuersione humoris in formam vaporis cum fiat, primò & per se ac propriè, non nisi à calido eue-

Primæ opinionis fundamenta.

Auctorum
 dissensio circa
 argēti viui naturam.

nire

nire solet. Nec minus indicium summæ caliditatis argenti viui dignoscitur ex vaporibus eius calidissimis, quibus gingivæ, atque os exulcerantur, & foetore afficiuntur. Etiam pedibus duntaxat infirmi illitis aliquo medicamēto in quo mercurium siue argētum viuum ingreditur. Idem perinde in vasis deaurandis ipso argento viuo interueniente, apertè cernitur: a fornace enim ubi metalla effunduntur argenti viui exhalationes sursum ascendunt: quibus in syndone aqua madefacta superimposita congelatis igne cessante, inde verum argentum viuum colligitur. Magnum etiā eius caliditatis indicium est maxima ipsius mercurij etiā, vsque ad interiora ossium penetratio, vt periculo compertum est, nimirum argento viuo reperto intra ossa capitū diu post mortem illorum, qui assiduo in argenti viui officinis laborauerant. His igitur nixi, quidam auctorum argentum viuum summè calidum temperatura esse recensuerunt.

Secundæ
opinioni
ratio.

Alterius verò factionis Medici argentum viuum frigida temperaturæ esse asseuerantes eius frigiditatis argumēta ex hoc probant, primo quia admodum ponderosum est, coloreq; albo, lucido, aquoso, saporeq; insipido præditum, instar grādinis. Quibus omnibus frigiditatem coarguentibus, frigidum esse affirmant. Eius etiam nomenclatura idem pandit: appellatur namq; secundum Dioscoridem hydrargyros, ab hydor Græcè quod est aqua, & argyros argentum, quasi aqua argenti. Aqua verò frigida est & humida. A qualitatibus præterea alterationis siue effectibus eius: ingens frigiditas apparet: tum ex maxima actuali frigiditate percepta ab his qui ipsum argentum viuum ex sua minera diu exhaustuerunt: ex motu quoque tremulo eis consecuto, nervis ingenti frigiditate læsis.

Quibus omnibus frigida temperaturæ esse non parum asseuerant. Sed quid de hoc auctorum dissidio sit dicendum, inferius apparebit.

C A P. XV.

Quo Conciliatoris, & quorundam aliorum sententia in medium adferuntur, confutanturque.

Rimò igitur in hac ancipiti questione Conciliatoris sententiam differētia. 1. 5. 1. merito forsan calumniandam adferamus. Ait enim ipsi mercurio duplicem elementalem naturam inesse, alteram terream sulphuream, qua ex parte calidam censendum esse inquit: alteram verò aqueam, vel vt eius materiam, & sic frigidum. Sed in hac quidem sententia nullo modo intellectus acquiescit. Non enim in abstracto, sed in concreto partes elementales alicuius mixti pro sua naturali temperatura sunt considerandæ. Si enim sic esset idem certè, quod de temperatura argenti viui dicit, de quolibet etiam mixto dici poterit, quod esset absurdum: imo nullum elementatum mixtum quantumvis calidum aliquantulæ frigiditatis erit expers, neque frigidum caliditatis, quanto colliget. Sed in calido quidem mixto partibus elementalibus calidis prorsus vincentibus, frigidisq; omnino refractis, & sub esse remisso manentibus, calidum totum euadit: & calidum absolute dicitur, atque è diuerso. Per omnem namq; motum ad formam nouā, vt asserit Philosophus. 2. de generatione, & corruptione corrupti tota forma præcedens, & acquirit noua quæ potest dici complexio

Conciliatoris
opinio
confutatur.

secun-

fecunda à qualitatibus primis pendēs ele-
mentorū. Non ergo videtur concilia-
torem per dilucidationem singularum
qualitatum elementorum argentum vi-
uum. Primo constituentium, ipsius tem-
peraturam secundam inde proueniētem
dilucidasse eo præferrim, quod ipsius tē-
peratura non est debilis nexus, vt partes
ipsius possint separari, quemadmodum
lactis in caseitatem, butyrositatem, & a-
quositatē, quarum quælibet suam adser-
uant variam temperaturam: imo firmi at-
que fortis nexus ita vt ipsius partes sic ne-
queant, separari. Quorum complexionū
fortis, vel debilis nexus Auicē. 2. cano-
nis cap. 1. meminit. Quidam verò hos au-
ctores in hac re dissentientes conciliare
nituntur, ita vt interdum argēti viui tem-
peraturam ad natiuam, atque essentia-
lem ab elementis fortitatem referant, mo-
do verò ad accidentalem. Quo pacto di-
cunt non esse inconueniēs argentum vi-
uum variæ temperaturæ à doctoribus re-
censeri. Sed hæc quidem expositio præ-
habitu dubium minimè diluit, quan-
doquidem medicinarum temperatura,
in caliditate, vel frigidityte anagogicè,
vel, penes essentialem & natiuam gra-
duari solet. Nam etsi gelida frigida, cum
sit ex accidenti caliditatis effectum inter-
dum operetur, nempe sudorem euocan-
do, qui propriè à calfacientibus concitari
affolet. 5. Aphorism. 22. non tamen ideo
calidæ temperaturæ est recensenda, &
non secus de mercurio dicendum.

Neque vllō modo conciliandi aucto-
res sunt, vt Platearius loco citato cona-
tur, nempe, vt qui frigidum esse tempe-
raturam argenti viuum, dixerint de a-
ctuali eius frigidityte intelligant. Qui ve-
rò calidum de virtuali: quippe cum Ga-
leno auctore. primo. De simplici medi-
cina capi. tertio. medicinæ penes earum
effectum primo, & de per se in corpus

humanum inductum, vel inducibilem &
penes earum actuales qualitates sunt in
temperatura graduandæ.

CAP. XVI.

Quo auctor conatur autho-
ritates, in hoc dissentientes
conciliare, atque veram
mercurij temperaturā
authoritatibus, &
rationibus o-
stendere.



R O his igitur conciliandis
authoribus prima fronte ap-
parentibus maximè discor-
dare. Supposita prius quadā

Magistri de Sanctes suo libro, de vene-
nis. Notandum quadrupliciter mercu-
rium siue argentum viuum apud autho-
res reperiri. Primo quidem purgatum,
ita videlicet repertum in sua minera na-
turali. Auicē. 2. canonis capit. proprio,
ac Dioscoride libr. 6. capit. 28. atque Pli-
nio libr. 33. cap. 6. asseuerantibus. Quod-
dam verò non purgatum, quod trifariam
ignis elaboratione conficitur. Primum
quidem factitium ex lapidibus mineræ
argenti viui purgati concrematis, qui ar-
gentum viuum potentia ac virtute possi-
dent. Aliud verò iuxta Dioscoridem lib.
5. de simplicib⁹ cap. 60. ex minio ac cyn-
nabari fossilibus, pro eodem cum prædi-
cto reputatis, fit. Vbi sic inquit: Mittitur
in cacabum testum, ac ferreo coopercu-
lo cooperitur, & minuitur argylla, & po-
nitur in foco, & post duas horas aperitur,
& quod cooperculo inhæserit, hoc collige,
quia hoc est argentum viuum. Hinc
quoque consimile est quod Plinius libr.
33. capit. 8. de hydrargiro confici præci-
pit,

Quatuor ar-
genti viui
species.

Modi confi-
ciendi argē-
tum viuum
factitium.

Has autho-
rum exposi-
tiones circa
supra dicta
non satisfacere.

pit, ex minio, vel fossile in aceto æreis mortarijs, pistellisq; trito, aut patinis fictilibus impositum ferrea concha, calice coopertum argylla superillita, &c. Alia verò species argenti viui factitij est sublimatum, quod corrupto vocabulo vulgo soliman dicitur: constat enim ex sale cōmuni, atq; salenitro, & calcantho, & argento viuo, quod non purgatum, sed factitium est. De quo intelligit Rasis vrere sicut ignis, atq; mures interficere: ac perinde Haliabas cum dicit, acutum, idest, sublimatum, adurit sicut ignis: nec non Auic. 2. canonis cap. de argento viuo cū dicit: sublimatum est interficiens propter vehementem inasionem, cum prius tamen eodem libro & capite dixerit, argētum viuum frigidum esse in. 2. gradu. His itaq; Magister de Sanctes satisdoctē conatur auctores in hac materia dissidentes conciliare, asseuerans purgatum argentum viuum à natura in suaq; minera repertum frigidum esse atq; humidum: non purgatum verò à natura, sed ignē, modis dictis factitium, calidum circiter Quartum gradum. At verò si aduersus hanc interpretationem dicatur cuiuslibet mixti naturalem temperaturam analogicē semper esse petendam, & idem de argento viuo purgato naturaliter in sua minera reperto, frigido, dicendum, non esse inconueniens vnum medicinæ genus plures species temperatura varias interdum possidere, vt patet ex cicuta, quæ licet ab authoribus frigida nuncupetur, quædam tamen eius species nempe orta in locis siccis terrestribus calidam sortitur temperaturam, vt ponitur à Cōciliatore differentia. 150. Vnde Mesues dictum in canonibus suis vniuersalibus non dissonum est huic sententiæ, cum inquit: Diuersitas autem loci has, vel illas incolumitat. Sed dubium circa argentum viuum calidum non purgatum, sed

factitium insurgit. Nam cum ex lapidibus frigidis minera argenti viui purgati fiat, & decisum sortiri debeat naturam illius à quo deciditur, videtur non calidū, sed frigidum inde euadere. Cui respondetur per acquisitionem nouæ formæ priorem permutari, vt patet de calce ex lapidibus frigidis igne concrematis genita: calida postea, atque exustiuā instar ignis euadente aut dicendum lapides illos minere argenti viui non frigidam vt alios lapides sed calidam & siccam temperaturam sortiri.

CAP. XVII.

Quocirca temperaturam frigidam mercurij purgati aucthores concilianur: quorum quidam frigidum in. 4. gradu: quidā verò in. 2. esse testantur.

RO hac igitur auctorum repugnantia, concilianda quædam Auic. seriem. 1. 1. c. de complexionibus, præmittere oportet, vbi in hunc inquit modum. Quandoque vna medicina calida, vel frigida comparatione corporis Petri magis quàm comparatione corporis Pauli existit: sic igitur argentum viuum respectu effectus in quibusdam corporibus ab ipso inducti frigidum in. 4. gradu auctores nonnulli esse recensere, respectu verò effectus in alijs corporibus in. 2. gradu alij frigidū & humidum esse dicunt: virtus namq; medicinarū scdm varietatē subiectorū in quibus agit, variā ac variū intro ducit effectum, licet medicina nō sit calidior, vel frigidior in uno quā in reliquo, vt peculiare est, & mille exemplis probabile. Graduandæ enim sunt medicinæ in

Intendi vel remitti posse vim medicamentorum secundū subiectorum varietatem.

N calidi-

les ex quibus
argenti viui
sublimatum an
est calid.

Varie authorum
opinionis concilia
tio.

Dubium.

caliditate, vel frigiditate penes effectum primo & deperse in humana corpora introductum, vel introducibilem authore Gal. 1. de simplicibus cap. 3. vel forsan dicendum argentum viuum purgatum in minori dosi interius adhibitum, vel exterius illitum posse remissius operari, & sic frigidum in. 2. gradu à Doctoribus dici, in dosi tamen excedenti quantitate in. 4. gradu. Quantitas enim cum sit de gremio materiei licet intensiue non augeat gradum, extensiue tamen ipsum adauge re potest, vt author est Arnaldus de Villa noua in suo de graduatione medicinarum tractatu.

C A P. XVIII.

In quo satis fit qualitatibus motiuis & alteratiuis inter se pugnātibz quarum quedam caliditatem quædam vero frigiditatem eiusdem argenti viui videbantur indicare.

Monciliatis iam igitur autorum autoritatibus, superest nunc diuersorum effectuum, atq; signorum ipsius mercurij contrarietati satisfacere cuiuslibet enim ipsius speciei, tam purgati quam non purgati sub forma liquida manentis, signa ac perinde effectus caliditatis ac frigiditatis in sunt utroq; modo à qualitatibus motiuis & alteratiuis sumpta indicatione vt in principio huius tractationis impensius dilucidauimus. Si ergo, argentum viuum purgatum frigida temperatura esset præditum signa quidem ac pariter effectus frigiditatis haberet: si autem non

purgatum calidum, caliditatis. Sed respōdetur q̄ in argento viuo purgato frigida atq; humidę temperaturę signa quęcunq; atque effectus frigiditatis erunt sibi propria primo & deperse: caliditatis vero ex accidenti. Si autem non purgatum calidum dummodo liquidę substantię sit è diuerso. Quod minimè inconuenire ostenditur, & 1. à qualitatibus motiuis nec colore, nec sapore semper ex necessitate summi: verum argumentum super veram ac naturalem temperaturam aliquius misti in comperto est: cui sententię Gal. 3. & 4. de simplicibus cap. vltimo & Auerr. 5. collig. & Auic. 2. canonis aperte suffragantur: indicantes quidem iudicium à talibus qualitatiuis accidentibus esse debile, ac sæpius iudiciū ignorantię, & primo, de grauitate vtriusque argenti viui frigiditatem coarguente bifariam respondetur, aut vtrunq; licet ponderosum, purgatum: tamen naturaliter frigidum: ipso non purgato calido esse ponderosius, vt iam periculo compertum est: aut dicendum grauitatem non semper super frigiditatem indicare, vt Galen. 2. de simplici medicina capi. 3. testatur: capphura enim frigida est, admodum tamē leuis. Vel aliter dicendum q̄ argento viuo purgato frigido & humido grauitas naturaliter, deperse veluti essentialiter frigido inest: non purgato verò calido per accidens, superante adhuc in ipso etiam post ignis elaborationem multa humiditate. Rursus: Multa calida grauitatem sortiuntur, veluti lapis piritis vulgo marcasita, ac perinde sal, & alia multa calida temperatura prædita vt patet. Ad agilitatem verò ipsius mercurij, atq; celerimum cursum supercaliditatem coarguentia respondetur, eius velocem cursum, motumq; assiduū, nū sibi à caliditate prouenire, cum alia eo longe calidiora minimè moueantur, nisi terreatate & aquei-

Quantitas aduocata vel minorā medicamentū mi nuce vel augere gradu ipsius posse.

Non semper ac colore vel sapore summi verum iudiciū qualitatis.

Qua ratione mercurio celerimus motus accidat.

De morbo Gallico.

965

aqueitate quadam, atque sphaerica figura in eo admixtis. Quo fit, ut tangenti tantum in puncto ipsum mercurium non adhaereat, fugiens facile ut praecipitata differentia. Conciliator recte inquit. Ad aliud vero de colore albo ipsius mercurij frigiditatem indicante, dicendum hanc indicationem esse debilem. Quippe cum color ipse superfaciei tantum colorati inhaereat. Auerroes. s. collecti. assentente. Quam obrem idem saepe color & rei calidae & frigidae inest: quae ad modum enim aqua, nix, grando, caphura, rosa alba & alia frigida albo induuntur colore: sic ad eundem modum multa calida ut patet de sale, capis, alijs, cholocynide, agarico veratro albo & similibus. Ad aliud quoque de sapore insipido frigiditatem indicante dicendum hoc non inconuenire. Videmus enim multa ex calidis gumis insipida. Ceterum ad effectus contrarietatem ipsius mercurij frigidi & humidi sudorem concitantis dicendum illud per accidens prouenire sicuti aqua frigida ut Hipp. 6. aphor. 21. & Gal. 2. ad Glau. & 3. de simplicibus testantur. Nempe frigiditate nimia natiuo calore ad interiora per antiparistam reuocato, postea fortior euadens sudorem acersit. Vel dicendum argentum viuum purgatum frigidum quod hisce linimentis pro curatione huius morbi commiscetur, non prorsus per se nec ex accidenti sudorem euocare, sed ratione medicinarum calidarum quae sibi in vnguentis commiscetur habentium virtutem ciendi sudorem. Ad corrosionem vero gingiviarum eo illitis eueniens dicendum, non esse inconueniens ab ipso argento viuo frigido quadantenus venenoso partes ipsi calidas sursum euaporare, atque partibus illis mollibus gingiviarum adherere easque corrosione afficere, adiuncta nimirum praua huius morbi materiei qualitate illitione argenti viui

commota. Ex quo etiam experimento aurifabrorum vasa deauratum argentum: mercurio interueniente, responso patet: exhalant enim actione ignis partes ipsius argenti viui calidae, congelanturque postea. Ad penetrationem vero ostium dicendum etiam id fieri partibus subtilioribus ipsius argenti viui sua nimia penetratione. Circa nunc etiam vero resolutionis seu paralyseos secute laborantibus in officinis argenti viui, vel in artibus in puteis ipsius dicendum, si ea nimia solum argentum viuum purgatum frigidam naturam contineri. Vbi ultra frigiditatem naturalem ipsius ex maxima etiam quae actualiter sentitur, nervis infestissima, resolutionem acere fire poterit iuxta Hippocratem. 5. aphor. 28.

C A P. XIX.

De modo illiniendi in 3. specie huius morbi illitione ei maxime propria: quo etiam ostenditur quomodo huic tertiae speciei morbo: linimento argenti viui succurritur.



VI. A. Atrox affectio hec homines interdum ira sensissimè inuadere solet, ut alijs omnibus medicamentis nullam vim afferentibus, prorsusque neglectis, ad mercurij linimenta tanquam ad vltimum auxilium recurrere necessum sit. Habet enim nescio quid foederis cum eo, licet non sine aliquo nocumenti vestigio, sed cum non possit vehementi malonisi, quae vehemens auxilium succurrere, ut Cornelius rectè sane inquit: ad huius linimenti usum praesertim pro curatione tertiae speciei huius morbi accedamus. Facta igitur prius prout decet corporis euacuatione tempore veris seu autumnalibus cubiculo pannis bene munito, & ab aere

tuto barba vnguibusq; manuum ac pedum abscissis, brachia & crura à cubitis & genibus infra abluantur sequenti lauacro. **Recip:** Florum roris marini, & chamæmeli, meliloti, foliorum lauri stachadis, labædulæ, ana. m. j. squinanti drag. iij. cinamomum vnci. semis. omnibus conquassatis bulliant in sufficienti quantitate aquæ cum tertia parte vini albi. Facta igitur ablotione, prædicto lauacro actu calido mador linteis exsicceatur: postea in nomine Patris & filij & Spiritus sancti prædictæ partes nempe à cubitis & genibus infra, linimento pro curatione, tertiae speciei in antidotario describendo illiniantur. Non autem ut deceptores faciunt ventriculus emunctoria & spinalis medulla, atque articuli illiniantur quod summo opere Auic. 2. canon. cap. proprio prohibet. Sed non oportet ut vnguërum igne liquefat. Sic enim mercurium ad fundum vasis prorsus descenderet, & sic nullius actiuitatis redderetur illinitio ut sum expertus. Namq; argentum viuum quarumvis extinctum atq; alijs medicinis optimè per diem integrum magna agitatione commixtum ita ut sensu visus non perciperetur: si post annum integrum voluisses ipsum ab alis medicinis prorsus separare facile fiet nempe eo in cacabo liquefacto, & præsertim pauco aceti commixto sic enim ad fundum vasis totum mercurium sua grauitate petit. Sed oportet vnguërum post duos aut tres menses antea esse confectum ut ipsius argenti viui malitia aliquatenus corrigatur, atq; obtundatur. Verùm inter vngendum, membra eo linimento fricentur, ut imbibit melius possit. Cibis sit pullorum, vel gallinarum caro, & si facultas de sit a-

Viçtus rō.

Illiniendi modus & semper.

rietina: illinitio verò bis die mane & sero molliatur per sex dies absq; interpolatio ne, nisi aliquo symptomate interueniente, tunc enim interpolatio præstat. Cœ-

na sit leuior prandio. Sed aduertito obsecro, qd si antequam ad sextum diem aut septimum illinitiois tempus peruentū sit: æger sufficienter, vel mediocriter exspuat, gingiueq; intumescant, statim à linitione sistendum erit, idemq; fieri oportet aliquò forsan denuo occurrenti symptomate, vel uti animi deliquio, vel alui profluuiio: tunc enim à linitione abstinere. Sed facta aliqua interpolatione, naturaq; confortata, ad linitionem redeundum est, eaq; modo dicto vtendum, donec æger expuere incipiat. Melior namq; euacuatio huius morbi spuitione perficitur. Sed hic non absq; magna utilitate: aduertito quosdam medicorum in huiusmodi curatione non rectè solitos esse diebus illinitiois iam fluxis ex templo catarticum solutiuum ægrotis exhibere: quod infestissimum censeo: Materies namq; huius morbi quæ oris expuitione præsertim euacuatur, ut experientia ipsa docet, pharmaco exhibitio ad interiora retrahuntur: quo duorum alterum, aut vtrunque euenire est necesse: aut naturæ opus duplici euacuatione contraria perturbari, impediriq; aut membrorum interiorum læsionem, materia intus, vel re tenta, vel delata per membra nobilia. Non ergo pharmaco exoluenti nisi post totalem ablationem sputi vtendum est nisi forsan contingat (quod rarò fit) oris, & buccarum ingens corrosio. Sed tunc experiri prius oportet crurium frictiones, deuinctionesque dolorificas, ac lauacra eadem, quibus ante illinitionem crura lauari præcepimus. Sed præstat à linitiois initio ad finem vsque expuitionis calamum, vel annulum auri, vel argenti ipsum ægrotum inter dentes retinere, ut nonnulli præcipiunt, & rectè sanè, nempe ut exhalationes argenti viui aliquatenus venenosæ intra os minimè retineantur, sed foras euadant. Transacta igitur iā prorsus

Animaduertitio factis proficua.

Non videtur pharmaco solutiuo do nec prius oris euacuatio finiat & ratio.

Animaduertitio.

De morbo Gallico.

197

Attaeda ef-
fe brachia &
crura post il-
linitione
mercurij eo-
de lauacro
quo antea.

Pro vlceri-
bus gutturis
etoris nō ef-
fe vtendum
illinitione
mercurij sed
potius hafu
decocti li-
gni Indici.

Non ftatim
gingiuis inta-
mefcere in-
cipientibus
& fputione
medicameu-
tis repercuti
fuis vtendū
& ratio.

Varia medi-
camēta pro
vlceribus o-
ris admoue-
da fecundū
variam eo-
rum difpo-
tionem.

Nota.

prorsus materierum per os expuitione,
post quinq; dies iterum oportet brachia
& crura eodem lauacro, quod à princi-
pio diximus etiam lauare, vt si aliqua pra-
ua qualitas mercurij vnguenti in eis su-
perfit rectificari valeat. Sed aliud quoq;
in his vnctionibus menti commendato,
siue in prima, siue in secunda siue alia hu-
ius morbi specie, nempe prætium opere
esse pro vlceribus gutturis, vel oris huius
affectus non esse vtendum his illinitioni-
bus mercurij. Cū enim hæc lues, prauo-
rum succorū oris expuitione præsertim
curetur, sua nempe acritudine & acutie
maiores certe corrosiones partibus o-
ris induceret, venenosa ferè materie ibi-
dem attracta. Cui quidem sententiæ Gal-
allucinari videtur. 13. meth. cap. 10. imò
illis partibus laborantibus decocto ligni
Indici multò tutius succurritur. Vnum tā-
dem in fine huius capituli notandum adfe-
ramus, nepe non protinus gingiuis tume-
fieri incipientibus vtendum esse intra os
& guttur lauacris, quæ malum arceant, sæ-
pius enim imò semper hoc maximū ad-
fert incommodum, nimirum sputo inde
retento intus. Sed oportet cū res vrget
à leuioribus, tutioribusq; medicamentis
repercussionis expertibus curationē au-
spicari, quæ abluendi, atq; mundandi os
virtutem duntaxat sortiantur, qualia sunt
aqua casei, modico rosati mellis in ea di-
luto. At vero si sordes maior sit vinum ad-
datur, & mel commune. Verū si vlcera
tē à parte interiori (vt fieri assolet) buccæ
ac gingiuarū sint, vnguento Aegyptiaco
vino albo diluto abluantur. Vnū hoc etiā
scito periculo me iam compertum habe-
re prodesse maximè ad corrigendam ar-
genti viui malitiam suffutū ex perdicū
pennis; & gummi iuniperi intra os rece-
ptū. Ad absterfionem vero vlcerum gut-
turis cum aliquantula confortatione atq;
reperie: deficiente iam sputo sequens laua-

crum maximè opē fert. Recip. Succij pla-
taginis, mellis optimi ana. vncij. j. alumi-
nis communis drag. iij. acetū schilitici vn-
ci. j. myrrhæ granæ finissimæ ana. drag. ij.
puluerizatis puluerizadis, & cum alijs co-
mixtis vsq; ad aliquantulam consistentiā
ebullitis confice vnguentū instar Aegy-
ptiaci vnguenti, quo os fricetur. Demum
abluatur vino decoctionis florum & fo-
liorum lauri, & florum rosis marini vlti-
mò oportet catapotijs fumarizæ, vel ali-
quo cathartico ex eis quæ in antidotario
continentur: concocta materie syrupis
etiam illic repertis pro qualibet materia
digerenda corpus purgare. Si verò vlce-
ra nondum sint completè munda medi-
camentorum copia tam ad ea mundan-
da quam carne implenda, atque cicatrice
inducenda, in antidotario reperies. Opor-
tet igitur postea per aliquam temporis
intercapedine bono vti regimine in sex
rebus non naturalibus, & abstinere præ-
sertim ab oleribus & acetosis atque aqua
frigida, sed vtatur ea decocta cū pauca ra-
sura ligni Indici: Manus quoq; ac faciem,
vel ea aqua, vel vino albo abluat: à venere
quoq; veluti infestissimo hoste in super-
caueat. Deniq; ad sanitatis consuetudinē
nō subitò sed sensim ac sensim reducat.

Regimen
post illini-
tionē argen-
ti viui vel
post hafu
decocti li-
gni Indici ob-
seruandum.

C A P. XX.

Quo docetur quibus reme-
dijs ischiadis, siue coxendii
cum dolori, & claudicationi
succurratur, tertiæ speciei hu-
ius morbi euenienti, & v-
trūm cauterizatio alicu-
bi aurium apud quos-
dam Medicos vsi-
tata iuuamen-
to sit.

N 3 In



In ischiadis, vel coxendi-
cum dolore in veterato
quando vniuersalia, ac pri-
uata remedia nil adferunt
commodi, antiqui omnes
neoterici artis medicæ præmissa bona
victus ratione, & præuacato corpore,
ad cauterium velut ad sacram anchoram
decurrunt. Quod crassum, lentum pitui-
tosumq; humorem in ima coxarum sede
concretum recluso fonte sensum maxi-
mè foras expellit, vnde dolor, idq; inter-
num vitium coërceatur. Sed variè qui-
dem ac variè hoc remedio autores vtun-
tur. Hipp. enim. 6. aphor. 60. & Gal. in cõ-
mien. ac Celsus lib. 4. cap. 22. Paulus lib. 6.
cap. 77. de coxarum morbis, Aetius sermo
4. ex ordine. 1. cap. 3. accipiendo mul-
titudine cauteris super ischiæ vertebra vrere
suadente idq; fieri assolet quincuspide fer-
ro, quo quinq; fonticula aperiantur: alij
verò circiter manus articulum: alij in
pede: nonnulli in poplite: quidam per in-
terualla quædam circa dolentia loca ipsi-
us cruris: alij denique in syluestri parte
sub genu affecti lateris cauterium admo-
ueri iubent vt consulenti citatos locos vi-
dere erit. Testis est etiam Rasis. 12. Con-
tinentis, Albucasis super chirurgis lib. 1.
prope initium, atq; Nicolaus Florentinus
serm. 7. tract. 2. cap. 14. ac penè innumeri
alij. Quod etiam celebres nòstrates in
praxi habere passim videmus, & idem
nos experti sumus. Sed illum vrendi mo-
dum inter reliquos dūtātæ probauit qui
super ischiæ vertebra admoet. Esti æ-
ger propter imbecillitatem non tulerit,
sub gena (vt dixi) in parte syluestri in mu-
sculorum discrimine. Sed licebit hic inda-
gare, vtrum auris combustio (tātòpere à
multis p̄ huius morbi remedio vsurpa-
ta) sit etiam interdum conueniens, & 1.
frontem non conuenire: nulla em̄ huius-
modi cauterizationis conspicuè autori

tas reperitur, nec ratio pariter subscribit. Nanque si aliquid commodi cauterium huic affectui afferre debuisset, potius in loco inferiori à parte dolenti quam in superiori, nempe aure esset admoendum: tum vt humor siue reuulsio, siue deriuatio aptius fieret: tum etiã quia pecularis humor huius inueterati morbi frigidus, pituitosus, ac lentus propè semper reperitur, cuius proprius est descendere inferius quam sursum ascendere. Igitur non videtur conuenire. Sed huius oppositum colligitur tum ratione tum etiam periculo quæ sunt duo maxima indicatoria, auctore Gal. 9. meth. cap. 6. ac plerisq; alijs in locis experimento quidem, nam multis ichiatrico morbo laborantibus huiusmodi cauterizationem magnum profectum attulisse compertum est quò Medici multi hac cauterizatione vtuntur. Ratio etiam huic auris cauterizationi subscribit. Quemadmodum enim factis venis radiceis auris prolificum semen ad testes loca longinquiora ischia: de scdere prohibetur, vnde homines steriles fiunt, vt longa historia ac narratione lib. de aere, aquis & locis apud Scythas Hippo. se vidisse refert nihil igitur mirandum erit si ad eundem prorsus modum auris cauterio longa eius emanatione excrementorum defluxum à cerebro & partibus sibi proximis ad ischiam descendere cohibeatur, sicuti etiam ad prohibendũ rheumatis à capite ad pectus defluxũ, vt in phthisi in coronaria sutura cauterium admoeri, monet antiquorum, ac iuniorum tradiderunt. Nec desunt præterea autoritates quæ huic sententiæ hallucinentur. Vnde Ioannes Alexandrinus super. 6. de morbis popularibus in cõmentis canonis: pruritus: in auribus retro venas incidere, eidem subscribit sententia, vocat enim ibi, pruritus vel laboriosas ægritudines, vel discussionem ar-

ticu-

Variis cau-
teriorum v-
fus in ischia
de.

1. **Learning Objectives:**
 2. **Learning Objectives:**
 3. **Learning Objectives:**
 4. **Learning Objectives:**
 5. **Learning Objectives:**
 6. **Learning Objectives:**
 7. **Learning Objectives:**
 8. **Learning Objectives:**
 9. **Learning Objectives:**
 10. **Learning Objectives:**
 11. **Learning Objectives:**
 12. **Learning Objectives:**
 13. **Learning Objectives:**
 14. **Learning Objectives:**
 15. **Learning Objectives:**
 16. **Learning Objectives:**
 17. **Learning Objectives:**
 18. **Learning Objectives:**
 19. **Learning Objectives:**
 20. **Learning Objectives:**
 21. **Learning Objectives:**
 22. **Learning Objectives:**
 23. **Learning Objectives:**
 24. **Learning Objectives:**
 25. **Learning Objectives:**
 26. **Learning Objectives:**
 27. **Learning Objectives:**
 28. **Learning Objectives:**
 29. **Learning Objectives:**
 30. **Learning Objectives:**
 31. **Learning Objectives:**
 32. **Learning Objectives:**
 33. **Learning Objectives:**
 34. **Learning Objectives:**
 35. **Learning Objectives:**
 36. **Learning Objectives:**
 37. **Learning Objectives:**
 38. **Learning Objectives:**
 39. **Learning Objectives:**
 40. **Learning Objectives:**
 41. **Learning Objectives:**
 42. **Learning Objectives:**
 43. **Learning Objectives:**
 44. **Learning Objectives:**
 45. **Learning Objectives:**
 46. **Learning Objectives:**
 47. **Learning Objectives:**
 48. **Learning Objectives:**
 49. **Learning Objectives:**
 50. **Learning Objectives:**
 51. **Learning Objectives:**
 52. **Learning Objectives:**
 53. **Learning Objectives:**
 54. **Learning Objectives:**
 55. **Learning Objectives:**
 56. **Learning Objectives:**
 57. **Learning Objectives:**
 58. **Learning Objectives:**
 59. **Learning Objectives:**
 60. **Learning Objectives:**
 61. **Learning Objectives:**
 62. **Learning Objectives:**
 63. **Learning Objectives:**
 64. **Learning Objectives:**
 65. **Learning Objectives:**
 66. **Learning Objectives:**
 67. **Learning Objectives:**
 68. **Learning Objectives:**
 69. **Learning Objectives:**
 70. **Learning Objectives:**
 71. **Learning Objectives:**
 72. **Learning Objectives:**
 73. **Learning Objectives:**
 74. **Learning Objectives:**
 75. **Learning Objectives:**
 76. **Learning Objectives:**
 77. **Learning Objectives:**
 78. **Learning Objectives:**
 79. **Learning Objectives:**
 80. **Learning Objectives:**
 81. **Learning Objectives:**
 82. **Learning Objectives:**
 83. **Learning Objectives:**
 84. **Learning Objectives:**
 85. **Learning Objectives:**
 86. **Learning Objectives:**
 87. **Learning Objectives:**
 88. **Learning Objectives:**
 89. **Learning Objectives:**
 90. **Learning Objectives:**
 91. **Learning Objectives:**
 92. **Learning Objectives:**
 93. **Learning Objectives:**
 94. **Learning Objectives:**
 95. **Learning Objectives:**
 96. **Learning Objectives:**
 97. **Learning Objectives:**
 98. **Learning Objectives:**
 99. **Learning Objectives:**
 100. **Learning Objectives:**

Dubium.

De morbo Gallico.

199

ticulorum, vel ischiam amplius Gal. lib. de sanguinis missione, & razes. 15. Continentis & Auic. 4. 1. cap. 20. asserunt, quendam passum fuisse vulnus in collo in quo quædam pulsatilis vena fuerat rupta qua curata sanus euasit de quodam antiquo vitio quod erat in ancha eius. Ergo rationis paritate poterit fonticula cauterij sua longa emanatione mediare, vel immediate humorum defluxum ad ischiâ prohibere. Ad argumentum verò dicendum, q̄ licet humores facilius versus inferiora quam superiora ferantur, ad superiora etiam membra nutrienda simul cū recrementis trahuntur: à iecore enim ad superiora etiam membra cum iuuatio alimentosoque succo recrementa etiam scendunt: quorum descensum ad ischiâ dolentem in posterum auris combustio sensum sua longa emanatione cohibet. Sæpius etiam crure laborante incubito venam secamus, aut dolorificas deuinctiones sibi admoquemus. Rursus catharticum medicamentum licet à partibus superioribus versus inferiores facilius attrahat, easdem tamen licet. difficilis à partibus inferioribus sursum versus violenter trahendo eradicat, & euacuat, vt Auic. 4. 1. cap. 3. rectè asserit. Ipsa itaque auris combustio, vt ex superioribus ratione, autoritate, atque etiam experimēto patet, dolori ischiatico iuuamento erit.

Responsum ad argumenta contraria.

Quæ auris comburenda & quæ parte.

Fonticulam in radice auris commodius fieri, & modò caute rizando.

men tenui cauterio ad unco punctuato ac breuivt me facere vidistis: postea euulsa ignis crustula vaccino butyro, pillâ cerea cum puluere turbith, hermodactylorum, agarici, & chamæpithis digitis subigata cauterij osculū apertū asseruetur.

C A P. XXI.

In quo differitur an malo mortuo (quod vocant) nempe ostracosis pustulis admodum foedis, antiquis, crura potissimum occupantibus elephantix aliquatenus similibus hirudines iuuamento sint, & ultra hoc de quibusdam medicamentis ad hanc affectionem expertis:

P R I M A fronte videtur hirudinum ad motionem non conuenire huic malo. Cū enim fuerit tenuior sanguis magis fluxilis, promptius ad exteriora trahatur, necessum est crassum, atrabilemque sanguinem huius mali materiem, intruscerineri, magis incrassari morbo inde deteriori redactio. Confirmatur, quia natura non impeditur, subtile supergræue semper ascendit igitur. Sed huius oppositum. Primo experientia docet, cū sæpe viderimus hirudinū affixione huiusmodi prauis pustulis maximam atrulidie opem idemq; Gal. lib. de hirsudinibus, &c. & Razis. 15. conti. & Auic. 4. 1. de sanguisugis innuere: qui atrabiliosus affectionibus eas commendant, maxime hirudines non venenosas, sed habentes capita parua, non degentes in aliquis ex notis, foetidis, rufas, rotundas

Argumenta quibus primò fronte apparet hirudinū ad motionem huic malo non conuenire.

Electio hirudinum & modus eas adaptandi.

Vnguentum
pro illinitio-
ne pustula-
rum.

Aduersio
magis mo-
menti.

electæ in aqua acetoſa, diluta ei propine-
tur optimè obſervato ſudore. Verùm ſe-
quenti, vel altero die puſtulæ hoc vnguẽ
to illiniant. Recip. radicis hennulæ cam-
panæ recentis minutatim ſciſſe. vnci. viij.
duabus aquæ partibus & vna aceti & mo-
dico vini albi optimè concoquant, dein-
de piſtetur, & per cribrum excollitur, &
addatur axungia ſuilla inſulſæ libr. ſem.
ſucci ebulli, & ſumaria. añ. vnci. j. mer-
curij ſaliua ſeiuni optimè extincti. vnci. j. &
ſem. cæruſæ, lithargirij. añ. vnci. ij. ſulphu-
ris viui. drag. iij. miſce & longa agitatiõe
per horam vnâ pulueribus ſenſim com-
mixtis fiat veluti linimētũ. Sed haud me-
diocri cura aduertito hunc morbũ iã diu
inſeſtantẽ tunc non tutò proruſ ſemper
eſſe ſanandũ, vt Guido cap. vniuerſali ini-
tio docet, quemadmodũ veteres hæmor-
rhoides niſi vna euacuatĩõis gratia dere-
liſta iuxta Hippo. ſnĩam. 6. Apho. 12. vbi
Gal. in cõm. exactè docet vitæ diſcrimen
quod retentio totalis veteris emanatiõis
adfert, atq; cauſam. Itaque cum hoc ma-
lum iam diu inſeſtauerit, ne ſcœculæta, ac
vicioſa, vel ſplenis, vel epatis materies ad
eas partes iam fluere conſueſta ad mēbra
mandãtia interiora reuertatur, & mortẽ
adferat, oportet in vtroque inguine, vbi
prope ſemper ſcyrrhoſum tuberculũ ma-
nere ſolet, fonticulũ candenti ferramēto
aperire, pilea cærea, atq; hederæ folio, vt
fieri ſolet ſuper impoſito, vel in vtroque
crure ſub genubſtribus digitis in parte
ſylueſtri, ſeu exteriori, in muſculorum di-
ſcrimine fonticulæ referentur, & diu (vt
aliàs iam diximus) aperta aſſeruentur.

C A P. XXII.

Quo oſtenditur ſinuofa, vel
caua vlcerapoffe, vt ſimplicia vulne-
ra nonnunquam prima intentio-
ne agglutinari.



E C conticendum eſſe cen-
ſeo, quod per multa annorũ
curricula longa praxi adin-
ueni, cum maxima ad laudẽ
Dei ægrotantium vtilitate, & mei ipſius
haud immodico honore, mirantibus cer-
tè medicis, & chirurgis: in ſinuofis vlceri-
bus breuis ſanationis proſperum euen-
tum. Primò igit ſuppoſitis canonicè ſup-
ponendis tam in victus ratione q̃ corpo-
ris euacuatione, vlcereque iam proruſ
abſterſo, ac puro per iniectionem lauacri
intus abſtergentis ſyphone immiſſi opor-
tet tunc (omnibus linamentis ab vlcere
proruſ ſe motis) ſanguinẽ à parte inter-
na vlceris panno exaſperante, vel ſcalpel-
lo ciere, iuxta Hipp. doſtrinam lib. de vl-
ceribus. Atque extemplo vlceris oras ma-
nibus toto conamine coniungere, dein-
de conglutinatoriũ aliquod medicamen-
tum velut vnguentum gummi iuniperi,
(quod de ſandaracha vocant) atq; ſplenia
in vino ſtiptico madefacta radici ſinus &
deligaturam longã firmam ſuper impo-
nere. Cura adhibita, vt os vlceris à lin-
theo deligaturæ non tangat, imò pateat,
vt medicamēto in pãno in medio incifo,
& bindelo ſuperimpoſito alternis dieb?
facile requiratur, lenis ſpongię fruſtulo ad-
hærenti, vitta tñ altera longa nõ niſi poſt
multos dies (niſi dolore vrgente) aut alio
ſymptomate ſoluatur. Præſtiterit etiã eam
totã vitã tenaci aliquo medicamēto an-
teaquã admouetur illiniri, veluti præfa-
to vnguento de ſandaracha, vel terebin-
thina cum puluere rubro, nempe ex thu-
re, maſtiche, ſanguine draconis om-
nibus commixtis: quo in caſu pretium
operæ erit, hanc vittam eſſe duorum
initiorum, xijm enim futuræ continet.
Huic certæ medendirationi Hipp. lib. de
vlceribus, & Gale. 2. ad Glauc. capi. de ſi-
nu, atque Aibucaſis libr. ſuo de operatio-
ne manuali capi. de chuze. & Guido tra-

CAP. XXIII.

De quarta huius morbi specie.

Quando autē hoc morbi genus ad tantā peruenerit perniciē, ut non solū corporis superficies uarijs in locis pustule, vlcerebusq; scateat, & nonnullis articularū dolorib⁹, ut dictū est, afficiat, sed etiā tuberculis magnis cū magna ossiū carie, teredine, seu corrosione, præsertim cū febre, quarta huius affectus species rectē connumerat. Eo igitur tpe suppositis, ut dictatum est canonicē supponēdis, nepe victus ratiōe, & corporis euacuatione, ut morbi, & humoris rō ex postulauerint, reliquū est (Deo auspice) medicamēta, p̄ficiūa sēpius nobis experta aduersus hanc luem hic asserre. Optimē igit corpore prius put decet euacuato ossiū carie, prius auferre, atq; deinde carnē mundā, ac purā generare oportet. Tertiō ut mercurij vnctionibus, suffitibus, & vomitionib⁹ (nepe in vlcereb⁹ partiū inferiorū) antecedētē hui⁹ affect⁹ pessimā materiē oris spuitione ciere, atq; expellere valeat, vtaris. Sine hac, em̄ casta atq; irrita prorsus esset hui⁹ morbi, præsertim tertie speciei, curatio. Quoad primū igit oportet facta totius corporis prius euacuatione, vlcera candenti ferramento adurere: est em̄ multo præstantius potētiali, vt creberrimē iam dixi, pluribusque rationibus iā probaui, quo locus cariosi ossis vndique prius pateat, ita ut sine carnis cōtactu os ipm̄ scalp̄is, & radi, & postea adurimeli⁹ possit iuxta methodū quā cap. de 3. sp̄e hui⁹ affectus iā impēse docuim⁹ ad qd̄ recurrere oportet, verum si vlcus figuræ rotundæ sit (quia difficillimā consolidationis est, propterea, quod per omnes linēas distat, quæ capacior inter omnes figuras à geometris censetur, & etiam quia talia vlcera rotunda principij à quocicatrix sit auspicanda expertia sint) eo-

Ulcereb⁹ cū
eisis certē o
portere cau
teriū adua
leadmoue:
quod longe
utili⁹ est po
tentiali.

Antiqua vl
cera interdū
veluti sim
plicia vulne
ra interdū
agglutinari
& method⁹.

Aduertenda
prædictæ cu
radi metho
do requirū.

sta. 4. cap. de vlcere cauernoso alludunt, & certē Galen. loco citato, & Auice. 4. 4. cap. vniuersali de vlcerebus: similia antiqua vlcera iam prorsus munda, cruenta-que veluti simplicia vulnera consuere iubent, sapiētiq; ipsa agglutinari asseuerant: quod nonnunq; ad laudem Dei optimo successu expertus sum. Interdū etiā non rarō per quindecim dies membrum non dissoluens vlcus maximē sinuosum prædicta methodo agglutinatum inueni, medicis non parū mirantibus. Deniq; eam ferē curandi rationē his sinuosis vlcerebus interdum ad moueo, qualem fracturæ ossis cū vulnere ad mouere soleo; nonnunq; etiā quod magis est, tabellulas stupis, pannisque munitas ab vlcere ore separatas impono, ut in ossis contractione cum vulnere fieri assolet, non absque magna ipsius laborantis utilitate. Sed ne error in hac curandi via committat, non nulla licebit præmittere in ea obseruanda. Primū qd̄ in tali vlcere ossis sum nō sit. Secundū, ut post vltimatā, integramque vlcere mundificationem & abstersionem moliat. Tertium, qd̄ prius sanguis purus in eo concitet. Quartum, qd̄ sit vlcus in membro solido, ut brachijs, vel cruribus quibus firma, vel expultrix, vel agglutinatrix deligatio rectē ad mōneri possit. Quintum, qd̄ dolor nimis non infestet. Sextum, qd̄ inflammatio non adsit. His denique deficientibus intrepidē hac curandi methodo vtaris. Hactamen lege, ut si quando symptoma aliquod ex dictis agglutinationem impediens denuō superuenerit iuxta commune verbū, scilicet, sapientis est mutare consiliū, ipsum mutabis. Et tunc communem vlcere curationem aggredi poteris, & certē nonnullos chirurgorum vidi huius medendi rationis signaros miserimos infirmos frustra trucidasse totam cavitatē maximā strage secantes, miserabile visu.

De morbo Gallico.

203

usque retardatur cicatrix, vt induretur, qua in circūambitu vlceris indurata non potest cutis vltra procedere. Quamobrē Hippo. libr. de vlceribus: & auctores alij iubent huiusmodi figuram rotundam vlceris, candenti ferramento rectificari, ita vt ex rotūda longa, vel triangularis reddatur, dicunt etiā Auic. 4. 4. atque Guid. huiusmodi vlcera interficere infantes nēpe ob longum tempus: resolutis eorū corporibus cū sint cito resolubilia. Euulsa igit scara, vel crusta ignis, vel butyro vaccino vel alio quopiam emollienti medicamēto locus abstergetur, atque mundificetur vnguento de chambil, cuius præfatio capite de curatione tertiz speciei huius morbi iam meminimus. Demum caro sarcoticiis, & vltimō epuloticis, seu cutem inducentibus medicamentis vtaris, quorū copia in antidotario inuenietur. Verū quia ferina hæc lues difficilē succurritur oportet in eius curatione ad fortius linimentum quod plus argenti viui continet peruenire, quæ distincta linimenta pro qualibet huius morbi speciei illic etiā inuenies. Illiniendi autem methodum cap. de curatiōe tertiz speciei iam docuimus ad quod recurre. Sed vltima medicamenta huic quartæ speciei morbi suffitus atque vomitio sunt. Conficitur quidē vomitorium sic. Recip. cataputiz minoris, drag. j. pulueris Ioānis de Vigo. gran. iij. formetur pillula, atque in aurora assumatur. Aliud ad idem. Recip. cataputiz drag. j. veratri nigri, agarici añ. scrup. j. calcinati Ioannis de Vigo gran. iij. puluerizatis puluerizandis, & cum melle rosato mixtis fiat pillula & noctu sumatur, & antea per 8. horas & totidem post ieiunet, nisi vomitus ingens, vel magna alui solutio vel anxietates eum infestauerint, tunc enim cibo assumpto symptomata acquiescunt, vt sum expertus. Subij quoque id est antimonij electi nempe Itali opti-

mē præparati gran. iij. deuorata vomitionem & alui sciendo miro modo prodest, sed hoc præsidio non nisi in robustis habitudinib⁹, vel attrabiliōsa, pituitosa & temperatura præditis vtaris.

De suffitu quo sudor atque ingens expuitio per os, & gingiuarum tumor, & oris scoriatio contingat veluti si æger linimento mercurij vngeretur.

Verū suffitus sic cōficitur. Recip. cinnabaris. vnc. j. lapidis piritidis. vnc. sem. præcipitati. drag. iij. omnibus grosso modo puluerizatis & guttulis storacis liquida mixtis, formentur trocisci, quorum vnus super prunas in vase fictili ponatur, & ægetalari veste pedibus rebus coopertus capite tantū detecto ne lædatur: suffitū recipiat postea lecto succumbat, atque sudorem afferat, idemq; per sex dies semel in die fiat, & bonis cibis nutriatur. Verū si chironica vlcerarebellia, sanataque difficillima sint, hoc vnguento vtaris. Recip. olei rosati completi vnc. iij. pulueris Ioānis de Vigo, lythargirij. añ. vnc. sem. cere quod sufficiat fiat vnguentum. Ad idem aliud. Recip. olei rosati. vnc. iij. pulueris veratri nigri, pulueris de Vigo añ. drag. iij. cere alba quod sit satis confice vnguentum.

At verō si vlcerare ad modum antiqua sint, præsertim crurium, vel brachiorum, timor est ne ipsis iam prius clausis, emanatione cessante, affuerit humor non sine vitæ discrimine ad membra præcipua interiora cōuertatur, quapropter ne hoc accadat fonticula referenda est à tribus digitis sub genu parisi sylulstis siue externæ in musculorum discrimine. At verō si in parte domestica cruris vlcerare antiqua infederint, licebit tunc in parte interna sub genu (vt dictum est) fonticulam aperire, vt euacuationi antiquæ affuerit seruata

Vomitio,
& suffitus.

Vlcerib⁹ ex
diuturno tē
pore manan
tibus in clau
sis oportere
fonticulam
quam in par
te ignobili
ori referari,
& ratio.

Nota.

seruata cantexi æquiualeere melius posset licet in cessui aliquod impedimētum esset: in parte vero externa non itidem.

Omnes affectionum species huic morbo commplicari solent

Cæterum quia febricula, cum membrorum extenuatione hanc quartā morbi speciem comitari etiam solet, interdum ad torridam marasimum, & hecticam perueniens (non enim inconuenit alias etiam morborum species (vt experiētia docet) huic affectui conuenire) tunc curatione hecticæ febris curetur. ¶ Verum quia omnibus huius morbi speciebus alopecia siue capillorum defluuium barbæ & superciliarum euenire cōsuevit: nonnulla topica medicamenta aduersus hanc luem mihi sapius experta commiscere volui: quorum quædam à Galeno tum lib. 1. de comp. med. secundū locos ca. 1. tum etiā lib. de Theriaca ad Pisonem, necnon. 14. meth. cap. 18. & Araf. 25. conti. cap. vlti.

Qualiter vitio humoris alopecia efficitur dignoscatur: & curationis discrimen.

Sed prius cognoscere oportet quis, nam color illi parti ubi pili defluunt, sit. Nam si albidior q̄ pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem adhibebis: sin pallidior eiusmodi bilis purgatione non secus q̄ si nigrior conspiciatur, quæ nigrā detrahant bilem offeres. Eadem etiā anī maduerfione victus rationē ægrotis impones, contrariam ei qui abundat humori, vt ex. 14. Meth. ca. 18. colliges. Topica verò medicamenta capiti, barbæ, supercilijsq; postea imponenda sunt: prius frictio ne crebra panno facta exasperante: illitio illico ex murium stercore cum aceto triro. Rursus murium capita cōcremata, & melle illita iuuamēto esto. Ad idē quoq;

Topica medicamenta aduersus alopeciam.

expertū habeo decoctū ex Abrotano, sumaria, cauda equina lapathio acuto ana. m. j. in coctis i lib. iij. vini albi veteris optimi ad medietatis consumptionem, & caput prius pertusum: præfacto lauacro actu calido cum spongia noua in eo infusa abluatur, & exiccato madore pannis calidis: illitio fiat aliquo dictorum vnguentorum

cum aliquantula frictione: manē verò illitæ partes prædicto decocto abluantur, & sic alternatim his medicamentis erit vtendum, vel vnguento sequenti modo dicto. Recip. muscarum exsiccatarū, stercoreis muris, lapidis lazuli, abrotani. añ. drag. j. puluerizatis puluerizandis, & cum duabus vnc. de oleo antiquissimo, ac paucula cæra vnguentum confice. Quibus remedijs & interim euacuatione per interualla vtaris. Sed vnū intelligas velim ea omnia medicamenta in capillorum defluuiio (quod hecticā febrem comitari solet) nullum allatura iuuamentū: hoc nanque symptoma inter indicia lethalia in febre fixa habituali, vel hectica præsertim cum tibiæ inflatione, & pediculorum multitudine à Doctoribus connumeratur, summam nanque virtutis imbecillitatem præ se fert. Verum alijs alopeciar speciebus ex vitioso humore tantum radices capillorum erodente prædicta medicamenta maximo iuuamēto sunt. Vnū tandem in calce huius capituli aduertito nepe me experimēto vidisse, laboratibus alopetia, canitiē, licet raro euenire: post sanitatem vero, capillos in priorē nigritiam redire, quod etiam Rasis. 25. conti. cap. vlti. afferit. Experientia quoque inueni, q̄ aperire tuberculū inguinis præcoci ter, id est, ante integram maturitatem, & retinere ipsum reclusum per multū tempus præseruat ab alopetia.

Capillorum defluuiū in ethica febre præsertim cū alijs malis indicijs esse si gnat lethale.

C A P. XXIII.

Quo seorsum agitur de vlceribus gutturis huius morbi modo columellam, modo verò tonsillas, & palatum corruptipentibus, & perforantibus.

PRÆ-

PRAEcedētibz capitulis ad notauimus, auctoritatibzq; & rationibz, impense probauimus in gutturis vlceribus mercurij, linimētis turō non esse vtēdam. Nam cum potissimum huius morbi materies mercurij causa ore expurgetur, no cumento noxā additō, vlcera admodum irritarentur. His igitur simili vlcere laborantibus decoctum ligni indici vel suffitus, quorum narratio præcessit turius accommodatur. Ea igitur vlcera si summam oris & gutturis partes duntaxat occupauerint facta prius corporis euacuatiōe, & caput purgijz per nares ex mellicrato, vel succo siclae, cū oleo amygdalarum amaranū receptis: sat erit ea loca sequenti lauacro lauare. Recip. hordei mundati, lentium excorticatarū, saturegiae, rosarū, caudē equinae, plantaginis singul. p. sem. fiat decoctum secundū artem in lib. iij. aquae pluuialis ad medietatis cōsumptionē, postea excolletur, adde mellis rosati collati vnci. v. myrrhē electae in polinem redactae drag. iij. fiat lauacrum. Verū si maiori absterfione sit opus parum vnguenti Aegyptiaci ei cōmiscemus, & cum mundificari iam coeperint addatur parum liscij, & sirupi myrthini, & cornu ceruini vsti, & tunc ipsum decoctum cum quatuor partibus vini albi, & vna aquae ex pyra fabri ferrarij fiat. At vero si collumela, vel tonsilae corrosiuo vlcere afficiant, opus est panno in cuspide specilli inuoluto sequenti medicamento madefacto ea vlcera intrepidē subtiliter tangere. Recip. aquae alchimistarum, vnguenti Aegyptiaci ana. vnci. sem. pulueris cucurbitae cōbustae drag. j. luteorū ouorū. nu. j. fiat mixtio, vel tangantur ipsa sola aqua alchimistarū cum modico pulueris sandalorū rubeorū cōmixti, sed oportet aliquod mite decoctum esse paratum vt si æger medicamento vi exarsit,

& incendio maximo afficiatur, eo in ore & gutture retento mitescant. & sic conficitur. Recip. hordei mundi contracti, scorogræci, seminis cythoniorū, & maluarū ana. p. sem. fiat decoctū in lib. ij. aquae ad medietatis consumptionem, & excolletur. Aqua quoq; cynnabaris pretium optatæ his vlceribus est, quam sic conficite. Recip. vini albi lib. ij. viridis æris, auri pigmenti, aluminis ana. drag. iij. sublimati drag. ij. cinna. baris. drag. iij. & sem. pulueris puluarizandis & vino mixtis bulliant duabus ebullitiōibus. Verū interdū contingit tonsilarū carunculas easque intumescere, vt non solum deglutitiōem, sed adhuc anhelitū prohibeant. Quocirca alijs non conferētibz interdū coacti fui eas vncino manu sinistra sursum eleuatas forcipede dextra sensim incidere, deinde alchimistarū aqua paucopulueresandali rubri commixto intingere deinde decocto immediatē exposito guttur abluere. Quod si ex incisione tonsillarum forte sanguis irruet: eo restricto postea cucurbitula in occipitio cum scarificatione affigatur. Et ad sanguinis profluuium, oxicato, & succo plantaginis colluatur, illito à parte exteriori gutture sequenti vnguento. Recip. olei violati, & amygdalarum dulcium, olei rosati, & chamæmelli, axungiae gallinae ana. dragm. sem. cum pauco ceræ albæ confice vnguentum. Tonsillas verò sedato dolore tali miscella mollipanno in cuspide specilli circumuoluto illinies. Recip. sirupi myrthini, & rosati, ex rosis ficis, mellis rosati collati, vini albi, decoctionis rosarum, balostiarum granorum, myrthi ana. vnci. j. pulueris foliorum myrthi, aluminis vsti, & stercoris canis ana. dragm. j. misce & vtere, vt dixi. Insufflare etiam per calatam puluerem stercoris canis, vel perse, vel cum allumine vsto, secundum exigentiam

Interdū coacti fui eas vncino manu sinistra sursum eleuatas forcipede dextra sensim incidere, deinde alchimistarū aqua paucopulueresandali rubri commixto intingere deinde decocto immediatē exposito guttur abluere.

Interdū coacti fui eas vncino manu sinistra sursum eleuatas forcipede dextra sensim incidere, deinde alchimistarū aqua paucopulueresandali rubri commixto intingere deinde decocto immediatē exposito guttur abluere.

Cucurbitula in occipitio affixam hanc morbo acris sanguinis profluuium superuenientem producit.

maxi-

Medicamentum ad abluendum vlceris & oris.

maximè prodest. Ad idem quoq; pulvis cornu cerui vsti & corali albi præstat; quã tam autè vim habeat stercus caninũ; atq; humanũ aduersus anginam & vlcera oris sciet ille qui legerit Gale. 10. de simplici medicina. c. de stercore humano. Si verò in palatò vlcus infederit, materiam ad nares loca proxima derivari licebit, quẽ admodũ e diuerso si in naribus affectio esset per palatum derivari eius materiam liceret, vt Gale. 13. Meth. cap. 11. & pleriq; alijs in locis docet. Verũ q̃a in hac parte os tenuissimũ est, & humiditatibus ce rebri admodum obnoxii, corruptioni q; inde aptissimũ, atque intus locus sit vacuus, danda proximis opera est, vt à cor rosiõe tueatur. Si enim ab ea parte os extrahatur, nã solum voci, sed loquelæ (tur pe quidem nocumẽtum) superest, vt passim experientia docet. Cum enim articu latio vocis, nec locutionis extracto osse: foramineque ibi relicto formari possit. Nanque vt Philosophũs. 4. de hist. natu. cap. 9. testatur os lingua palatum duo la bia & quinque dentes prædictæ actioni re quirantur. Nonnulla igitur carie forsan ibi apparẽte subtiliter os radatur, locusq; cruentetur, statimque ad mundificantiã, & sarcotica properandum est, nullo ibi li namento relicto, ne caro magis disgrege tur. Sed si forsan res ipsa medici voto, vt fieri assolet, non correspondeat, & frustu lum aliquod ossis sua sponte decidat, tũc difficile admodum, ac penè impossibile est, tale orificium agglutinari, tum propter internam vacuitatem qua basis, seu fundamentum producendæ carnis defi cit (nulla enim pars solida cui innitatur existit) tum etiam ob eius figuram sphe ricam ubique difficillimã quidem con solidationis, & præcipuè in hac parte pro pter causam iam dictam: tum etiam pro pter humiditates ad eam partem assidue confluentes. Memini tamen quondam

puellam cui os paruulum ex simili vlee re deciderat, morosa curatione curasse, nulla ex prædictis noxa ad laudem Dei manente. Methodus verò curationis fuit omni die sanguinem incircum ambitu vlc eris ne cicatrice ipsum induceretur cie re, & vino stiptico, & melle centauræ commixtis locum sæpius abluere, exci careque panno exasperanti, deinde mel le etiam centauræ locum linire, & pe ciculam panni rotundi, cum vnguento hernicis, seu de sandaraca superimponere, & quoties à salua perfundatur toties adaptetur. Quando verò os, quod exci dit, vel magnum est, vel ferius quàm o porte bat medicus fuit acersit vlcere iam in fistulam mutato, quo tempore de vlc eris agglutinatione diffidendum est. Tũc expertus sum ad turpem loquelam auferendam, ac naturali similem reddendam: lichinum ex mastyce, ac cera simul commixtis, capite lychni vlceri pau cilo superante, imponere, quo æger velu ti sanus loquebatur, semoto verò lychni o turpiter admodum. Verũ colum mella, siue vula exulcerata solet interdum in hoc morbo faciliè corrumpi. Est enim carneæ spongiformis penè substan tiæ ac pendens, faciliè inde corruptionem recipiens. Qua corrupta ac prorsus sepa rata vltra id quod turpem aliquatenus lo quelam, ac vocem reddit, vitæ etiam di scrimen adfert. Inter eius nanque vsus il le potissimus est, vt Galeno lib. de voce & 11. de vsu part. testatur, vt aereni vitæ necessarium ad pulmonem refrigeran di cordis gratia ingredientem contem peret, ac præparet. Si enim crudus absque præparatione ingrederetur, maximo ef fet nocumẽto, & vltra hoc eius prorsus incisio tertio Prognosticorum, periculo sa admodum censetur, idemque Auen zoar quarto Theisr testatur, sed præ fertim quando æqualiter tumet deglutio nem,

Curationis
methodus si
qua est.

Methodus
quæ loquela
& vox ad tẽ
pus refarcia
tur.

Nocumẽta
quæ ex abla
tione colu
mellæ con
sequuntur.

Vlcereb* pa
latum occu
pantibus o
portere ma
teriam deri
uare per na
res, & econ
tra.

Foramen vl
ceris palati
osse ablato
difficile ad
modum ag
glutinari &
ratio.

nem, & aeris attractionem prohibens, solet enim ingens sanguinis profluuium ex eius incisione prouenire: Conandum igitur pro viribus est ne ad tantam corruptionem perueniat, vt eius incisione sit opus. Fiat ergo primo sanguinis misio, signis dominij sanguinis apparentibus, deinde cucurbitula cum scarificatione in occipitio affigatur, & solutiuū aliquod non expectata humorū concoctione patienti coactē exhibebis, vt Hipp. 2. Aph. 22. præcepit cūm dicit: concocta medicari oportet &c. Et. 4. Aphor. 10. Medicari in valde acutis si materia turget eadem die &c. Topica igitur remedia prius sint, gutturis ex posca ablutio, sandalis rubris ei commixtis, deinde dianucum, vel diamoroni confectione etiam commixta. Ad idem quoque, vt sæpe expertus sum primas tenet malum punicum acidum recens cum cortice mansum, constringit enim facile tumentem columellam. At si tempus non sit, in aceto & aqua rosata ipsum infundito, deinde contundito, exprimaturque, & cocleari paruulo nostrui succum illum columellæ adaptabis: ita, vt intra coclear quantum possibile sit retineatur: deinde per calamum puluerem crissocholæ, & boli Armenici, & trociscorum de charabe, & salis armoniaci ac gallarum balustiarum añā. commistorum insufflabis, vel cum succo cithonorum admoueabis. At verò si columella ipsa non solum tumore atque relaxatione, verum etiam corrosiuo vlcere, vt in hoc affectu fieri solet, afficiatur, tunc aqua cinnabaris (cuius supra meminimus) tangatur, & si fortiori medicamentum vtiliceat, aqua alchimistarum. Si verò

to per calamum immisso & eam scindūt ac simul adurant, nempe perforato ipso calamo prope eius extremitatē, per superiorem partē, quo foramine columellā intromittito, & (vt dictum est) secato, atq; adurito: deinde eodem decocto ad intra atque vnguento ab extra vtaris, quæ hoc eodem capite in abscissione tonsillarum posuimus. Hoc vno animaduerso, vt corrosione permittēte, radicitus ipsa columella non scindatur, sed partim, vt nō nihil in suo munere obeundo prodesse possit, vt Auic. Fen. 13. 3. tract. 1. capi. 15. consultit. Deinde lauacris exiccātibus curabis. Sed vnum penē monstruosum casum, quem vidi olim in fine huius capituli vobis narrabo, nempe hominem duplicē columellam à natiuitate (ipso in scio) habentem, & quæ præter naturā erat sæpius inflammatione atque anginae symptomatis corripiebatur. Quocirca medicus huius rei ignarus creberrimè ipsi ægrotanti venam secabat, donec ipsum ad maximam perduxit imbecillitatē. Ego verò fortē fortuna semel illic adfui & ad solem exposito, oreque aperto suppressa specillo lingua guttur illi in speci, & certē in admirationem incidi duplicem columellam aspiciēs. Tandem illius & omnium qui aderant consensu eam quæ magis præter naturam mihi videbatur abscidi, deinde curatione vlcera communia ipsum curavi, ac postea nunquā angina suspecta laborauit. Postea mecum voluens non magis hoc miratus fui quā sextū digitū cuius euentus sæpe accidit.

Monstruosus casus & curatio.

CAP. XXV.

De vlcerebus pennis & corruptione præputij in hoc sæpè morbo euenientibus.

QVIA

Medicamentum proscium.

Modus incidendi corruptam columellā alijs medicamentis non proficientibus.



QUIA (vt iam antea diximus) obscœnæ pudendorum partes ultra id, quod ex cōcubitu hoc morbo infectæ mulieris inficiuntur, calida e-

tiam atque humida natura sint præditæ

necnon quia, vt inquit Galen. 5. Metho.

cap. 4. excrementorum sunt canales, faci-

le putrescunt. Itaque fatis ad rem erit hîc

de ipsis seorsum caput edere, & prius iu-

uenibus quibus hæc sæpè contagio ex ve-

nere concitari affolet, admonere, volo, vt

ab ipsa præseruari valeant, vt statim à mu-

liere suspecta discedentibus aqua & ace-

to rosatis torum pudendū sæpius abluât,

aqua videlicet rosata in duplo acetum su-

perante, nam hoc certè consilio multi ab

hoc malo præseruari sunt. Si igitur pustula,

vel vlcera summā tantum pennis par-

tem occupauerint, tunc sat erit allumino-

sa aqua, quæ à Galeno. 1. de simplici me-

dicina cap. de aqua potestate inscribitur,

vel quæ à Guidone tract. 6. capi. de gutta

rosata instillatione paratur eluere, siccis

tantum linamentis superimpositis, & to-

tum deinde pudendum panno vnguenti

albi cooperies. At verò si exarsio, vel in-

cendium sentiatur pannis succo arno gio-

sa, & aqua rosata, ac modico aceto made-

factis superadmotis sæpè mutatis, cura-

bis, & sanguine ex talo mittito, & tuber-

culum inguinis huiusmodi vlceribus pe-

culiare anodyno aliquo medicamento il-

linito, veluti factu ex asungia gallinacea,

oleo irino, chamæmelino æquis portio-

nibus cum cera coagulatis. Vnde in hoc

vulgaris opinio sicut in multis alijs pa-

lām decipitur. Crēdunt enim inguinis tu-

bercula, vel subalis, post aurese vlcera,

vel scabiem in partibus ei corresponden-

tibus ac proximis genuisse, cum multò se-

cus cōtingat: vlcera nanque illa, vel sca-

bies, quæ libere percussio, siue in crure,

vel pede sit, vel in penne, quia dolorem

accescit, materies præcepto naturæ ad do-

lorificum locum maximè in corpore vel

plethora, aut cacochymia laborante in-

fluit, & cum glandosa, seu adenosa emun-

ctoriorum caro rara, atque spongi for-

mis, via ac transitus fluentis humoris ad

ea loca sit, hoc humore in ea raritate su-

scepto, atque imbuto tuberculū fit, quod

vulgo seca nuncupare solet. Et idem sub-

inde contingit, si in manu vulnusculum

aliquod appareat, quia subalis tuberculū

accescit, & in collo similiter si in capite.

Quod optimè à Galeno. 13. Metho. cap.

5. declaratur. Verum si pustula iam vlce-

rosæ altius penetrauerint, non solum cu-

tem, sed etiam carnem iam corrodescentes,

tunc maximopere quidem circumspec-

re oportet, an locus pellis, siue præputij

liuefcat, vel nigricat, aut non, si non vn-

guentum apostolorum sat erit: si verò vl-

cus altius (vt dixim⁹) penetrauerit, & ma-

iore absterfione sit opus, AEgyptiacovn-

guento vtaris, vel perse, vel luteo oui vel

pauculo vnguenti albi commixto, vel

pulvere Ioannis de vigo superperso, siue

vnguento commixto, vt morbi ratio

expostulauerit, quæ in linamentis admo-

ueantur, de super verò in panno totum fe-

rè pennem cooperiente vnguentum al-

bum, vel pompholigis imposito, postea

vlcus, vel vnguento mundificatio com-

muni ex apio (quod vocant) vel alio con-

simili mulcebris mundificetur. Quod re-

cipit succi apij. vncij. mellis rosati colla-

ti. vncij. & sem. farinæ hordei quod suffi-

cit, confice vnguentum, data vnica ebulli-

tione: quod vlcere iam prorsus mundo

farcoticū simul fieri etiā potest, nempe

additis myrrha, mumia & farcocolla, ha-

bita temperaturæ ratione, & in posterū

vlcus cicatrice inducatur, sequenti pulue-

re. Recip. foliorum oliuæ, lithargirij, tu-

tiæ præparatæ faccari candidi, alioes. añ-

dragm.

Aduersio p-
ficua ne iu-
uenes hoc
morbo affi-
ciantur.

Inlcere pu-
dendi tuber-
culum in in-
guine super
uenae pecu-
liare est, &
ratio.

Varia medi-
camenta to-
pica.

drag. sem. misce, & in pollinē reddito, & ficcis linamētis super impositis curetur curbita etiam in furno exiccata, in polli- nemq; redacta, & charta combusta mi- rum in modum à Gale. 5. meth. cap. vlti- mō in calce laudatur. Pulvis quoq; ster- coris canis, & cornu cerni vsti, & foliorū myrthi ad idem operatur. Cæterum si vl- cera cacoetica ac prorsus erodentia nigri- cantia, ac mollia sint, gangrenæ via ten- dentia, cum sensu, vel hebetate, vel nullo, quæ fœtor vehemens comitatur, tunc se- cta prius ex talo, si virtus tolerauerit, ve- na, alta scarpellatio summa, vel medio- cris, vt res ex postulauerit, fiat, & sangui- ne nigro toto inde expresso, acetoque sa- lito abluto, aqua chimistarum vlcera in- tingito: demum vaccino butyro crustula eleuetur, loco semper in circumambitu vnguento de bolo Armeno, vel alijs re- frigerantibus illito. At verò si gangrena totum præputium altius iam occupaue- rit, totum ipsum amputato, atque can- denti ferramento in circumambitu adu-

Secunda ex-
talo.

Quando o-
portet haic
malo caute
rio actuali
succurrere.

rito. Demum crusta mollicante aliquo medicamento vt modo etiam diximus euellatur. Postea vnguento ex apij suc- co, & alijs quæ diximus vlcus curabis. Sed quoniam interdum euenit pellem ipsius præputij in parte tantum superiori glandis corrumpi, atque ob id per orifi- cium corruptionis glandem foras egre- di, reliqua præputij parte sub ipso puden- do instar pilæ aggregata, turpissimum quidem atque veneri, & proli impedi- mento. Itaque cum hoc contigerit opor- tet totum illud funiculo alligari, atque constringi, demum præcidi, & candenti ferro orbiculatim subtiliter tangi vt inter- dum etiam post integram vlceris cicatri- zationem feci.

Verum nonnunquam contingit (vt sæ- pe vidi) aliud turpe huic membro eueni- re, vt iam sæpe periculo compertum ha-

beo, nempe egrotum ipsum pudendi glā- dem ad aliqua vlcera, vel, ex coriatioem in ipsa curanda, pellem ipsius præputij sursum versus detegere ac eleuare, & sic imprudenter per aliquod tempus reli- cto, cutis eousque inflari, vt postea non solum in suum reduci nequeat, verum etiam inflammatione, & interdum gan- grena tentetur. Itaque quo pacto hoc ma- lum à principio non magnè negotio pro- hiberi possit, Deo auspice, docebo in pre- senti. Cum igitur hoc contigerit, propter ipsius valetudinarij vel forsan medici in- scitiam oportet statim medicum, vel vn- guibus quatuor digitorum manus sinix- træ præter pollicem, vel panno ex aspera- te totum simul præputium versus par- tem inferiorē vt glandem cooperiat vio- lenter trahere: impellente nimirum si- mul pollice eiusdem ipsam glandem ver- sus partem interiorem, interim manu dextra pudendū firmiter tenente, & sic glans, præputio attracto, contegetur. At verò anteaquam cutis in suum natura- lem locum reducat, si forsan aliquate- nus iam induruerit, sume corticum radi- cum altheæ recentis, scœnugræci, feminis lini, sing. P. j. feruescant optimè simul & per pannum excollentur, & in eo sepi vaccini liquefacti, vnci. ij. commiscebis, & totum pudendum in hoc lauacro cali- do sommergito, & ibi lana succida frica- bis, & postea panno in eo madefacto cir- cunuoluito, & altero die (vt docuimus) præputium reducto vt sæpius feci.

Sed restat nunc vltimò cuiusdam non leuis mali hic meminisse, quod interdum euenire vidi, eidemque subuenire. Vlce- ribus igitur exedentibus hoc membrum nonnunquam euenit, fistulam internam vrinariam aliquatenus abrumpi, lotio fa- tis turpiter inde egredienti, oportet er- go, tunc temporis foramine vlceris iam- satis mundicato cauam plumbeam ten-

Aduerte in-
gens malum
quod eleua-
to præputio
& sic impru-
denter dimis-
so euenire so-
let.

Modus re-
ducendi præ-
putium.

tam tenuem pervrinarium meatum subtiliter intromitti, & inde per aliquot dies vrinam excerni, ne vulceris osculum in transitu ab ea tangatur, licet enim virtute & potentia exiccans sit, substantia tamen est humens, quo & etiam sua acrimonia agglutinationem prohibet. Verum si omnibus his contingat interius orificium meatus vrinarij adhuc agglutinari non posse, oportet tunc altero duorum remedio uti: nempe aut inter fistulam vrinariam, & pellem pudendi summa obliquaque incisione, excoarationeue, vt sic cutis per deligaturam ac medicamentum emplastricum versus partem anteriorem extensa, orificium, quo lotium egrediebatur, cooperiri agglutinarique possit: aut facto vulnere exteriorius in toto circumambitu pennis retrorsum & hinc inde cute disgregata impleatur vulnus linamentis, sic enim totum, quod in vulnere cutis porus occupavit elongari versus partem anteriorem poterit: & sic orificium, quo lotium à parte interna egrediebatur, operies: & pro viribus, sarcoticis carnem alere, & cutem epuloticis super inducere magnopere curabis. Sed hoc maxime cauendum tibi consulo, vt in pelle secanda, vt diximus, nimis caute & subtiliter sectionem exerceas, eatenus vt fistulam internam vrinariam minimè tangas, nam maius nocumentum inde sequeretur, & nempe duobus orificijs inde secutis per quæ lotium egredietur, cuius exitum per vnum tantum ne egrederetur antea conabamur. Cui quidem medendi rationi allucinatur Cornelius Celsus libro septimo, capite vigesimo quarto. Sed caue (vt dicit) ne interius altius incisione penetres. Interdum præterea præputij pelle per partem superiorem disrupta glans per orificium egreditur pli-

cata desuptus ipsa pelle atque tumente, turpissimum admodum atque vneri & proli impedimentum. Quare tunc secanda cutis illa prorsus est & candenti ferramento tangenda.

CAP. XXVI.

Quo nonnulla dubia circa hunc affectum Gallicum proponuntur, diluunturq;.



INTER MVLTa certè dubia scitu admodum digna in hac Gallica affectione, tria in præfenti potissimum se offerunt. Primum

quidem cur tubercula magna, vt strumæ, scyrrhus, ædemata doloris sint expertia vt Galen. tùm. 14. methodi. capite secundo. & 3. & 2. ad Glauc. capit. de ædemate, & de scyrrho asserit, cum omnes quidem doloris causæ nempe intemperies, atque soluta continuitas secundum eundem Galenum. 12. methodi. capite. 7. & Auicenna. 4. 4. capite. 30. in ipsis abscessibus reperiuntur, sine quibus quidem apostima (vt eius definitio pandit) fieri non potest, constar, enim vt neminem latet ex intemperie ac soluta continuitate, & compositione deprauata. Secundum dubium cum solutio continuitatis inter obiecta sensus tactus cui dolor adscribitur non ingrediatur, quæ secundum Philosophũ. 2. de anima sunt octo nempe calidum, frigidum, humidum, siccum, asperum, lenè, durum, molle, non igitur appareret ipsam solutam continuitatem dolorem posse inferre. Tertium, quid nam in causa

Cur huius morbi tubercula doloris sint expertia.

Secundũ dubium.

Tertium dubium.

Methodus duplex curandi pudendi vlcus corrupto meatu vrinario & inde lotio egrediente.

Adverte si macram diligenter.

De morbo Gallico.

211

C A P. XXVII.

De antidotario in quo varia medicamēta admodum huic morbo vtilia atque experta inscribuntur, & primo de varijs syrupis, & pharmacis pro diuersis temperaturis, atq;

etiam de quodam syrupo loco decocti ligni

Indici non cū mī-

nōri iuuamen-

to exhiben-

do.



N hoc quidem antidotarij capite plurima nobis experta medicamenta adferemus. Primo quidem syrupos pro qualibet tempera-

tura exhibendos, non solum concoctioni euacuandæ materiei huius morbi, sed etiam integræ ipsius curationi Deo auspice pro futuros, præmissa videlicet corporis euacuatione, eademque habita victus ratione, quæ in decocto ligni Indici obseruari assolet: cuius quidem syrupi. vnci. iij. per triginta dies mane & sero eger delingat. Prius igitur pro biliosis temperatura. Recip. limaturæ ligni Indici electi (vt supra docuimus) per quadratum infusæ in. x. lib. aquæ pluuiæ, deinde lento igne vsque ad duarum partium consumptionem feruescat: postea verò excollatur, & igni exponatur, cui excollaturæ adde florum borraginis, buglossæ, rosarum, violarum, singulorum. p. j. & postquam secundum artem ebull-

O 2 licint

in causa sit vt vlcereb⁹ siue pustulis exterioribus huius morbi laborantes, minori multò dolore excrucientur quam alij valerudinarij, quibus ista in eodem morbo deficiunt. Pro enodatione huius primi dubij, dicendum iuxta præfatorum auctorum atque aliorum omnium sententiam, illam solutam continuitatem, ac pariter in temperiem ex materia calida, per viam defluxus, vel deriuationis subito in membrum irruentes, atque inuadentes: duntaxat dolorem afferre, cum natura subita inuasionem patiatur, nulloq; modo in frigidis omnino materiis, ex quibus abscessus doloris expertes per paulatinam congestionem serius multò ac sensim gignuntur, quo fit vt non itidem natura offendatur, ac rursus materies sua etiam frigiditate membri sensum hebetat, quibus apostima dolore priuatur, etiam si suppuretur, licet contra Hippocratis sententiam. 2. aphorismor. 47. aperte hoc pugnet, cum dicit: dum pus conficitur &c. Solum enim in inflammationibus ex calidis materiis verificatur, vt assidue docet experientia.

Ad secundum dicendum ipsam solutam continuitatem alicui dictorum obiectorum nempe partium asperitati elevationem inductæ referri. Sic igitur soluta continuitas, nisi modo dicto impediantur est causa doloris. Ad tertium dico cum Nicolao Leonicensi libr. suo de morbo Gallico, vbi inquit, quod humor nanque noxijs quem natura imbecillior tentauit quidem, non tamen potuit ad exteriora propellere, tandem in articulorum neruis in sedens, ibi prohibita transpiratione dolorem ingentem concitabit: apparentibus verò pustulis, vel vlcereb⁹ in partibus corporis exterioribus, perniciosus humor exterius euaporans remissius multò offendit ægrum.

Solutio primi dubij.

Solutio secundæ dubij.

Solutio tertie dubij.

Syrup⁹ morbo Gallico correptis, temperaturæ biliosis.

lierint iterum excoletur, & cum saccharo albo, quod sufficiat, syrupum conficito: & in ligatura in ipso infundatur pulvis trium sandalorum drag. ij. & (vt diximus) assumatur, sudore, quantum fieri possit, obseruato: & eodem modo de sequentibus syrupis intelligas.

Syrupi pro atrabiliosis temperaturis.

Syrupus pro
temperatu-
ra atrabilio-
sis.

S Vneramenti eiusdem ligni Indici lib. j. omnium specierum mirabolanorum cuiusque dragma. iij. hermodactylorum drag. iij. fisticatorum, tamarindorum singulorum vnc. j. folij Indi. p. j. falis amoniaci drag. iij. epythymi, senæ, polypodij ana. p. semis, prunorum damascenorum. p. iij. infusa rasura ligni Indici in eadem aqua pluuialis quantitate per quatrimum: postea usque ad consumptionem duarum partium incoquatur, & tandem excolletur, & alijs simplicibus secundum artem mistis, & incoctis cum melle optimo atque saccharo æquis portionibus fiat syrupus: pro diuitibus verò addatur musci, ambre ana. gran. iij.

Pro pituitosis temperaturis.

R ECIP. Ramenti ligni Indici, rubi Indici, vulgo çarçaparrilla, minutim incisi, singulorum. libra. semis. prunorum Damascenorum. p. iij. turbith, hermodactylorum ana. vnc. semis. fumarie viridis. p. ij. iuncianæ, Aristolochiæ ana. vnc. semis. omnibus conquassatis dimittantur per quatrimum in decem lib. aquæ, postea ebulliant modo supra dicto: deinde excolletur, & cum optimo melle fiat syrupus secundum artem. Sed aduertito huiusmodi syrupi vnc. ij. vel

per se, vel cum decocto eiusdem ligni Indici per triginta dies (vt diximus) esse sumendas. Cæterum quando syrupus exhibetur solum pro euacuanda materie concoctione sufficit quatuor quinqueve diebus ipsum delingere, & postea phar-macum conueniens, secundum materiei diuersitatem, exhibeatur.

De varijs vnctionibus mercurij, pro curatione morbi

Gallici confirmati.

P Rimo in huiusmodi vnctionibus aduertendum est, non omnibus hoc morbo laborantibus, eadem linimenta æqualiter conuenire, nulla adhibita distinctione, vt apud vulgus vsurpatur, instar mali futoris omnes eodem calapodio calceare, laborantis vt Galen. 9. methodi. capite decimosexto. inquit. Sed cuiuslibet temperaturæ atque ætati variæ medendi methodus est adhibenda; & sic varias vnctiones pro diuersis temperaturis & ætatibus conficere oportet: quarum varietas circa maiorem, minoremve mercurij quantitatem discriminatur. In atrabiliosis nanque ac temperatura robustis mercurij quantitas augenda est: in pituitosis verò aliquatenus minuenda: cæterum sanguineis & biliosis temperaturis, vel quocunq; modo debilibus, minor quam in omnibus alijs mercurij portio commiscenda est. Quibus ostensis.

Recip. assungæ suillæ salis expertis vnc. xvj. mercurij optimè purgati & diu extincti cum salua ieiuni, vel cum oleo ipericonis, in fortibus, vel temperatura atrabiliosis, atque vlcerosis. vnc. v. pituitosis verò vnc. iij. sanguineis, vel biliosis, & pariter debilibus vnc. iij. olei laurini. vnc. j. theriacæ. vnc. semis. cerusæ. vnc. j.

Syrupi duplex.

Quatuor

Vnctiones easdem non omnibus conuenire: Sed variæ pro ætatibus, & temperaturis.

Quantitas mercurij quæ augenda quæ dove minuetur.

Vnctiones pro varijs temperaturis, & ætatibus commiscenda.

De morbo Gallico.

213

vnci. j. lithargirij. vnci. ij. euphorbij, oliba-
ni singulorum. dragm. iij. assungia per se
prius minutissime scissa atque in mor-
tario cum argento viuo guttatim, sen-
simque commixta; atque diu eousque
agitata vt nullo modo argentum viuum
visu percipiat. Demum alia simplicia
optimè secundum artem misceantur. In
fine adde storacis liquidi modicum.

Aliud linimentum ad idem.

RECIP. Axungia porcina infusa
vnci. xvj. olei chamæ mellini, ane-
thini, & laurini, & spica ana. vnci. semis.
Resina, therebinthina cuiusque. vnci. j.
euphorbij. vnci. semis. liquefactis lique-
faciendis cum sufficiente quantitate cæ-
ræ, postea argentum viuum secundum
prædictam proportionem sensim com-
misceantur, & vltimò addatur storacis li-
quidi vnci. j. & vnguentum conficito.

Ad idem linimentum aliud.

RECIP. Axungia porcina sine fa-
le libra. j. radicum recentium ebulli-
& hennula campana conuassatarum,
stachadis ana. p. j. olei anethi, & chamæ-
meli, & laurini, & irini singulorum. vnci.
semis. squinanti. drag. iij. euphorbij, ceru-
fa ana. drag. iij. therebinthina, resina,
cuiusque vnci. j. thuris, mastycis ana.
dragm. iij. vini albi veteris libra. j. semis.
sic conficito prius axungia cum vino, &
radicibus dictis atque stachade, & squi-
nanto ferè vsque ad vini consumptio-
nem ebulliant, postea forti expressione
excellentur, deinde therebinthina, atque
resina cum sufficiente quantitate cæ-
ræ simul cum prædicta excollatura lique-

fiant, & in mortario ponantur, deinde
puluerizatis puluerizandis, ac simul sen-
sim commixtis cum ipso argento viuo,
& morosa agitatione pistatis vnguen-
tum conficito.

Linimentum pro formidan- tibus illiniri argen- to viuo.

QUIA nonnulli hoc morbo labo-
rantium eo vsque mercurij illini-
tionem timent, vt à medico
expostulent, vt coram seipsis vnguen-
tum prædictum absque argenti viui ad-
mitione conficiatur: itaque in præsen-
tia medicamentum adferam in quo li-
cet mercurium actu percipi non possit,
potentia tamen ipsum ingrediatur, eo-
demque modo operetur. Hoc igitur fa-
cies si duplum cinnabaris loco mercu-
rij vnguento commisceas, & maximè si
cinnabaris ipsa fossilis sit, quam Auicen.
2. cano. cap. proprio de argento viuo vzi-
fur nuncupauit, nempe intra mineram
ipsius argenti viui inuentam: quæ si ha-
beri non possit factitiam commisceto,
quæ ex sulphure & argento viuo constat,
Auic. citato loco asseuerante. Sed in hu-
iusmodi vnguentis argento viuo com-
miscendis duo potissimum aduertito.
Primum quidem pro iuuenibus bilio-
sisq; temperatura inungendis, argentum
viuum purgatum minerale frigidum, si
possibile sit, fore eligendum: senibus ve-
rò, pituitosisve ediuerso, videlicet non
purgatum, calidum, factitiumque. Dixi
autem (si possibile sit) non enim semper
hoc ad votum eligi poterit, nisi forsan
aut ægrotante ipso vicino mineræ argen-
ti viui, aut eo vsque diuite vt in regio-
nem illam vbi vtriusque argentum vi-
uum venditur mittere possit. Secundum

Linimentum
argenti viui
formidanti-
bus, quibus
remedijs v-
tendum.

Aduersio.

operæ pretium esse adulterinas deceptio-
nes, quæ à venundantibus ipsum argen-
tum viuum committi solent, in præsentem
pandere, quas ab aurificibus ipso argen-
to viuo in deaurandis vasis vtentibus, di-
dici. Solent enim (vt ipsi aiunt) quartam
partem, vel quintam plumbi ipsi argen-
to viuo commiscere. Hoc experieris &
nocumentum auertes. Primum quia sta-
tera qua ipsum argentum viuum pondera-
tur quadantenus plumbeo colore infici-
tur. Secundum prohibebis plumbi no-
cumentum, ab argentoq; viuo illud sepa-
rabis, si aluta corij ipsam excollaueris for-
tissimeq; per ipsam expresseris: sic enim,
(vt sæpe expertum est) si quid plumbi mer-
curio commixtum erat, alutæ post colla-
turam & expressionem veluti plumbea
infectio adhærebit.

Animaduersion.

SED mihi nunc in mentem venit pro-
ficuum aliud notabile, non coticen-
dum, pluribus enim ad laudem Dei ma-
ximum attulit iuuamentum (illis videli-
cet, qui tuberculis huius morbi in capite
laborabant) nempe inter vngedum ipso
argento viuo, vel inter sumendum aqua
ligni Indi, capitiprius pertuso pileum ca-
pitibus herbis in pollinem reda-
ctis ei commixtis admouere: cuiusmodi
sunt stæchas, maiorana, chamæmelum,
melilotum, flos roris marini, & huiusmo-
di alia. Hoc nanq; experimento plures sa-
nitati restitutos ad laudem Dei vidi.

C A P. XXVIII.

De pharmacis simplicibus at-
que cõpositis pro morbi Gal-
lici materia euacuanda & pri-
mo de ijs quæ biliosistem-
peraturis sunt a com-
moda.



MEDICAMENTVM Medicamē-
colagogum, id est, est bilis-
flauæ solutiuum, quemad-
modum flegmagogum pi-
tuitæ. Sed huius potestatis da.

quædam sunt simplicia, quædam sunt
composita, veluti manna, cassia fistula,
violarumq; species quædam, prunorum
Damascenorum caro, Rhabarbarum, sca-
monium, siue diagredium. Composita,
vt confectio diaprunis simplicis, hoc est
sine scamonio: & compositi, scilicet cū
ipso scamonio. Electuarium de succo ro-
sarum. Electuarium rosatum Mesue, &
electuarium de Pillio. Pillulæ ad febres
colericas. Flegmagogum medicamen-
tum est simplex, mirabolanus albus, er-
modactylus, turbit, agaricum, aloes.
Composita sunt diaturbith, mel rosatum
Alexandrinum, pillulæ aureæ, aggregati-
uæ, Indæ, foetidæ. Diacarthamū, electua-
rium elefscoph, vel sequens electuarium
satis expertum. Recip. Turbith. vncij. se-
mi. ermodactylorum dragma. iij. diagre-
dij dragm. semis. epithimi Zedoarie sin-
gularum scrup. j. zinziberis. dragm. j. ga-
lange, gariofilorum, masticis singulo-
rum. drag. viij. feminis millij solis, anisi,
fæniculi agarici, singularum scrup. j. sac-
cari albi quod sufficiat misce, & cum a-
qua scabiosæ confice electuarium in ta-
bellulis. Cuius vncij. in gallinaceo iure
mane patienti exhibeatur. Syrupus quo-
que solutiuus supra inter syrupos cogno-
minatus, flegma educit. Cæterum soluti-
ua bilis atræ medicamēta simplicia, sunt,
nigri mirabolani, senæ, polipodij, lapis la-
zuli, epitymus, serum lactis caprini, &
similia. Composita, confectio dialenæ
confectio Hamec, decoctio epithymi
Mesue, quæ in hac materia atrabiliosa e-
ducenda primas tenet, pilulæ fumariz &
de lapide lazuli, hiera logodionis, quo-
rum certus vsus, quantitasque vt Galen.
multis

Argenti vi-
ui adultera-
ri diagnoscē-
di method⁹.

Pileum ca-
pitibus tuber-
culis capitis
laborantib⁹
qualiter, &
quando im-
ponendum.

De morbo Gallico.

215

multis in locis adfert, nec lingua proferri, nec calamo scribi possent sed ingenio medici, industria & mentis indagazione acquiritur. Materia igitur prius aliquo ex supra commemoratis syrups iam cōcocta, aluoq; secundum prædictam distinctionem soluta, nec non vlceribus, si qua sint, puris, ac mundis, tunc ad ligni sancti decoctum, vel linimentum mercurij recurrendum est, hoc vno menti commendato, nempe vlceribus forsan pedes, vel crura occupantibus, vomitum potius quam pharmacum conuenire: contra vero in his quæ supra sunt, quibusalui solutio iuuamento est, cuius causam aliàs indagauimus, atque authorum sententijs probauimus.

Causticum medicamentum, seu potentiale vltra ea quæ superius ostendimus proficuum.

Medicamentum causticum proficuum.

R Ecip. Medullæ fermenti. vnci. iij. sublimati. drag. x. minij vnci. semis. puluerizatis puluerizandis, & cum fermento & aqua plantaginis mistis fiat massula, cui in furno exsiccatæ puluerizataq; puluis amilij & cerusæ ana. drag. iij. & succi aphrodilorum. dragm. x. & aceti albi. dragm. v. misceantur, & vsque ad succi & aceti consumptionem in coquantur, & iterum exsiccentur, & in pollinem reddantur, atq; pauculo vnguento basali conis commiscebis, & confice vnguentum. Quod si solidius facere velis plus pulueris, sin minus plus vnguenti addito. Ad idem accommodantur troscisci ex succo aphrodylorum vnci. vj. & calce viuæ, & auro pigmento ana. vnci. semis. mistis, & exsiccat in vmbra.

Medicamentum in circumambitu vlceris admouendum, quando huiusmodi

causticis medicamentis vtimur ad fluxionem & calidam in tempetiem coerendam.

R Ecip. Olei rosati, omphacitidis, & myrthini, succi plantaginis, vel solani, aceti rosati ana. vnci. ij. ferueant simul ferè vsque ad succi & aceti consumptionem, postea adde cæra, quod coagulationi sit satis, & liquescant simul, postea in mortario plumbi imponitò. Deinde sequens puluis sensim commisceatur, & plurimum agitentur. Recip. cerusæ lotæ & exsiccatæ, sandalorum rubeorum, boli Armenici puluerizatorum ana. drag. v. fiat vnguentum. Aduertito ad abstergenda vlcera praua: caustico medicamento nondum indigentia, pretium opere esse vt melle rosato excollato: commixto si bi puluere rubro Ioannes de Vigo, videlicet cum vnci. j. mellis. drag. j. pulueris.

Medicamentum pro cicumambitu vlceris, cui causticū admouetur.

Lauacra ad abluenda brachia & crura linimento mercurij vngenda.

R Ecip. Florum roris marini, & chamæmeli, foliorum lauri, berbasci, papaueris rubri, squinanti, cinnamomi, lauendulæ, stæchadis ana. p. semis. omnibus conuassatis, & aqua & vino albo incoctis fiat lauacrum quo ante illinitionem mercurij & post calido, brachia & crura abluantur, & pannis calidis exsiccentur.

Quibus medicamentis brachia, atque crura ante illinitionem medicamenti mercurij sint abluenda.

Medicamenta pro vlceribus huius morbi iam mundis.

R Ecip. Emplastri gratiæ Dei, emplastri chalcitidis, vnguenti pōpholis ana. vnci. j. cum guttulis olei ligni Indici confice vnguentum. Ad idem quoq; summe confert fel porcinum vnguento basilicone commixtum.

Sarcoticavilceribus iam puris applicanda.

Medicamenta pro vlceribus
huius morbi post decoctum
gni sancti iam assumptum,
vel illinitionem mercu-
rij susceptam.

IAM superius (vt opinor) admonui-
mus, non oportere vlcerosos ægrota-
tes haustum ligni Indici sumere, neq; li-
nimētum argenti viui recipere, nisi ipsis
vlceribus iam prorsus mūdis. Secus enim
caro potius sordida quam pura in ipsis ge-
neraretur, vt docet Hipp. lib. de vlceribus
& Auic. eum sequens. 4. 4. c. vniuersali de
vlceribus, atq; etiā experientia ipsa. Tunc
igitur quæ sequuntur medicamenta iam
diu vtilissima adinueni. Primum Recip.
Linimenti mercurij, vnguenti Apostolo-
rum & pōpholis, emplastri gratiæ Dei,
& de calcitide cuiusq; ꝑ vnc. sem. cerusæ,
lithargirij, minij, aluminis, pulueris ossis
caluariæ canis singulorum. dragm. ij. fiat
vnguentum secundū artem, & si solidius
debito euadat guttulas olei mastychini
commiscebis.

De Sarcoticis.

AB vlceribus crusta iam separata,
hoc vnguento vtimini. Recip. Suc-
ci apij, therebinthinæ candidissimæ ana-
vnci. ij. mellis optimi. vnci. ij. semis. luteo-
rum ouorum nu. ij. farinæ hordei. q. s. fiat
vnguentum. Quod carnis emundandæ
vim habet, natura postea carnem produ-
cente. Sed vlcere iam aliquatenus mūdo,
sequens vnguentum quod mundifi-
cat & simul carnē alit vsurpetur. Recip.
mellis rosati collati vnci. iij. therebinthy-
næ cum aqua vitæ lotæ vnci. j. semis. succi
absinthij & apij sing. vnci. ij. myrrhæ ele-
ctæ, thuris minuti cuiusq; drag. j. farinæ fa-
baceæ, & hordei sing. q. s. confice vnguē-
tum. Mundificat quoq; praua vlcera hu-
ius morbi quod ex oleo rosato, & pulue-

re Ioannis de Vigo, & cera alba, ac etiam
ad idem præstat medicamentum ex oleo
rosaceo, & elleboro nigro cum cera al-
ba, æquis portionibus mistis. Valet etiam
mirum in modum vnguentum Aposto-
lorum cum prædicto puluere commistū.
Ad idem cum maiori mundificatione &
exiccatione. Recip. Succis matris syluæ,
& verbasci, & apij, succi paucedinis, & i-
reos sing. vnci. j. mellis virginei vnci. iij.
therebynthinæ ex beto vnci. j. aquæ vitæ
vnci. j. sarcocollæ, myrrhæ in pollinem re-
dactarū. vnci. semis. farinæ fabaceæ. q. s.
confice vnguentum. ¶ Aliud mirabilis
operationis, quod in vlceribus fraudulen-
tibus sponteq; dilatantibus cacoeticis cū
vtilitate & non pauca sum expertus. Re-
cip. succorum apij & arnoglosæ, & aceto-
sæ, scabiosæ, taplij barbasij ana. vnci. j. mel-
lis rosati collati vnci. iij. therebynthinæ
electæ vnci. ij. semis. myrrhæ sarcocollæ,
corticis thuris, aloes singul. drag. iij. anti-
momij drag. iij. farinæ hordei vnci. j. pul-
uerizatis puluerizandis omnibusq; com-
mistis, & parum feruefactis fiat vnguen-
tum. Verum si herbæ quarum succi sunt
extrahendi virentes non reperiuntur,
tunc earum puluis loco succi vsurpetur.

Aliud medicamentum ex- pertum.

Recip. Galbani, amoniaci, bedelij,
singulorum. vnci. ij. oppoponacis
dragm. x. infundantur per diem in aceto,
deinde excolantur, & secundum artem
coquantur, postea sume olei mastycini.
vnci. viij. argenti spumæ. vnci. vj. masty-
cis vnci. iij. olibanij, myrrhæ, cuiusque vn-
ci. j. vtriusque aristolochiæ, viridis aris-
singulorum. vnci. sem. lapidis magnetis
dragm. ij. panum auri num. x. ex omni-
bus secundum artem vnguentum con-
ficito.

Medi-

Sarcoticav-
ceribus, nisi
iam prorsus
mundis, mi-
nime admo-
uenda.

Medicamen-
ta quæ vim
habent tum
emundandi
tum etiā car-
nis producē-
dæ.

¶ Medicamentum aliud.

R Ecip. sapi hircini, vitulini, & arietini, lumbricorum terrenorum aqua vitæ lotorum picis naualis, rasina pini singul. vnc. sem. olei rosati, & mastycini singul. vnc. iij. sem. succi absynthij, & matris syluæ sing. vnc. j. & sem. omnibus simul vsque ad consumptionē ebullitis, & excolatis addat pulueris minij drag. x. lythargirij vnc. ij. itidem agitentur assidue vsque ad nigredinem, deinde adde therebinthinæ vnc. j. masticis impollinem redacti. dragm. x. cæræ quod sufficit fiat vnguentum solidum. Aliud ad magna vlcera iam munda cū aliqua calida intemperie. Recip. olei rosati, & myrthini singul. vnc. ij. rasina vnc. ij. sem. succi plātaginis, & folani, vini albi, decoctionis hypericonis, & rosarum & myrthi sing. vnc. j. sem. omnibus ferē vsq; ad vini & succorum consumptionem incoctis, deinde sequens puluis addatur. Recip. cerusæ plūbi vsti abluti, lythargirij, antimomij, corticum mirabolānorū, citrinorum, boli armenici, sandalorū rubeorū, spodij, corticum thuris, & buxi, & osium dactylorū combustorū, aluminis vsti, rasuræ panni lini veteris subtiliter trite, scoriz argenti, coralorū rubeorū, stercoris canis, capitū piscium salitorum sing. drag. j. cæræ albæ, quod sufficit, confice vnguentum. Ad idem aliud paratu facilius medicamentū sic conficito. Recip. emplastrum gratiæ Dei, diachylonis cōmunis, emplastri de chalcytide, ana. vnc. j. thuris, cerusæ puluerizatorum, ana. vnc. sem. picis Græcæ, vnc. j. cæræ albæ, quod sufficit vnguentū secundum artem cōficito, Addendo olei rosati, vel masticini, & in fine addat pulueris ossis cranei canis vsti, dragm. iij. & plurimum agitur. Aduertito tamen quod si ex emplastro nigro Galeni quod ex lythargyrio, oleo & aceto componitur in panno lini ad modum sparadrati

vulgo dicti conficiatur vlceribus mundis sanitatem præstat. Idemque operatur & efficacius (vt expertus sum) sparadratū (vt ita dixerim) ex emplastro mercurij confectum, quo Ioannes de Vigo loco linimenti mercurij vitur. Aqua etiam argenti viui per instillatorium extracta his vlceribus mundis miro modo auxiliatur.

Aliud medicamentum proficuum pro vlceribus huius morbi iam mundis.

R Ecip. sagapeni, oppoponacis singul. vnc. sem. floris aris, rubæ tinctorum cuiusque dragm. j. aristolochiæ rotundæ. drag. iij. tritaturis tritandis, & gummis in aqua vitæ exolutis & vna parti succi radice lilij albi, & duabus mellis optimi commixtis vnguentum conficita in filamentis vlceri adaptandum. Supra verò quodvis ex commemoratis imponito, vel sequens. Recip. emplastri de cholchotar, id est, diapalmæ, vnguenti pallidi, vnguenti aurei singul. vnc. sem. cærusæ, lythargirij pulueris foliorum oliuæ, myrthi, & matris syluæ, aluminis singul. dragm. j. sem. misce, & additis guttulis olei mastycini confice vnguentum.

Emplastrum ex gummis pro duricie scyrrhosa, huius morbi mollificāda, & pariter discutienda.

R Ecip. amoniaci, galbani, opoponacis, serapinij singulorū. vnc. j. dissoluantur in oximellite, & aceto squillico, & secundum artem fiat emplastrum, quod duriciæ admovento p aliquot dies mollificatione præcedenti, nec non suffitu lapidis pyritidis igniti in aceto acer-

rimo proiecti. Ad idem. Recip. cal-
cis viuz in oleo sisamino extinctæ, & cu
iussibet prædictorum gummorū vnci. j.
in aqua vitæ ex aceto extracta dissoluto-
rum misce, & fiat ad modum emplastri,
sed oportet prius plures lapides pyriti-
des igne excandescere cum prædicta
aqua vitæ ex aceto extracta extinguere,
& suffitum recipere.

Vnguentum de muscillagini
bus valens mirum in modum
ad duricies remouendas,
tum mollificādo, tum
etiam simul discu-
tiendo.

R Ecip. oleorum seminis lini chamæ-
melli, & irini, & de croco, vnguen-
ti dialtheæ, hyssopi humidæ, butyri vac-
cini, axungie gallinæ, & anseris, & ana-
tis, medullæ cruris cerui, vel loco eius vi-
tuli, axungie anguis, ana. vnci. sem. mu-
scillaginis altheæ, foenu græci, & seminis
lini, & seminis maluarum omnium vnci.
iiij. armoniaci, galbani, opponacis, be-
delij dissolutorum in aceto squilytico, &
oximelite, ana. vnci. semis, serapini drag.
iiij. marcasitæ præparatæ. vncias sem. fiat
vnguentum secundum artem, & coagu-
letur loco cæræ cum diachylone com-
muni, addendo in fine croci puluerizati.
scrupul. j. & guttulæ aceti sambucini sen-
sim commisceantur.

Vnguentū deligno Indo pro
scyrrhoſis tuberculis huius
morbi emolliendis, discu-
tiendisq̃ue.

R Ecip. ramenti ligni Indici libr. sem.
olei antiquissimi, olei sessamini, ana.
lib. sem. vini albi antiqui libra. j. fumarie,
berbasci, cucumeris agrestis recentium,
ana. m. iij. omnibus simul cōmixtis, con-

quassatis, per triduumq̃ue simul dimissis
coquantur vsque ad vini consumptionē,
cuius collaturæ & expressioni addito vn-
guenti dialtheæ vnguenti Agripæ, vn-
guenti Aragonis, añ. vnci. sem. coagule-
tur loco cæræ emplastro diachylonis cō-
munis.

Acetum ligni Indici, quo in
hoc morbo toties vtendū
erit, quoties aceto com-
muni fuerit opus.

R Ecip. ramenti ligni Indici, vel corti-
cis ipsius libr. sem. foliorum sambu-
ci, & ebuli, & fumarie virentium añ. p. iij.
aceti sambucini libr. iij. omnibus simul
contusis, & soli per triginta dies exposi-
tis, posteaq̃ue excollatis, parumq̃ue fer-
uefactis vtilissimū acetum conficies, sed
oportet, vt arte clarificetur.

Olei ligni Indici descriptio,
quod doloribus articulorū
huius morbi præsertim à
causa frigida atq; etiam du-
riciebus maximè auxiliat̃.

R Ecip. rasuræ prædicti ligni lib. sem.
radicis chinæ rasæ, & conquassatæ
vnci. ij. brionie, hennulæ campanæ, cucu-
meris agrestis, fumarie, chamæmelli recē-
tium añ. p. ij. omnibus simul scissis, con-
tusisque misceantur cum libris. iij. olei a-
nethini, & tribus optimi vini albiveteris,
& sic per septem dies dimittantur, postea
ebulliant vsque ad vini consumptionem,
deinde excellentur, & exprimantur, & in
vitri ampulla soli per triginta dies expo-
natur & vsui adseruetur.

Suffitus in ore post linitionē
mercurij calamo recipien-
dus, quo nocumento ab ar-
gento viuo ori & gutturi de-
relictō,

De morbo Gallico.

219

relieto, & laxitati, ac dolori
gingiuarum succurritur.

R Ecip. florum roris marini, bafyli-
conis, foliorum lauri, trifolij, pen-
narum perdicum, gummi iuniperi, cyn-
namomi, squinanti singulorum. p. semis.
omnibus conquaffatis mittantur in te-
stam nouam plenam optimo vino albo
veteri, & massa farinæ frumenti coope-
riatur, & bulliant simul per dimidiæ ho-
ræ spatium: postea cooperculum in me-
dio perforetur, vbi calamum cannæ in-
tromittito quo suffitus ore infirmi susci-
piatur: maximum nanque contra prædi-
cta incommoda adfert iuuamentum. Ad
idem confert. Recip. panem calidum
ex templo à furno extractum, & crebris
foraminibus ipsum perforabis, deinde
proijce simul florum roris marini. p. iij.
myrrhæ electæ impollinem redactæ, vnci.
j. & simul commiscebis, agita bisque
cum optimo vino albo, donec panis sit fa-
tis imbutus, & sic per diem integram ser-
uetur: deinde in stillatorio instillabis, qua
instillatione os & guttur abluantur.

Vnguentum pro scabiæ hu-
ius morbi,

R Ecip. butyri vaccini vnci. vj. there-
binthinæ vnci. iij. sublimati. drag. ij.
cerusæ vnci. sem. ouorum numero. ij. suc-
ci limonum vnci. vj. sensim in mortario
lapideo cōmiscebis, addito modico sto-
racis liquidi.

Medicamentum sarcoticum
vulneribus iam prorsus mun-
dis post linitionem mer-
curij adaptan-
dum.

R Ecip. olei omphacitidis, mastichi-
ni, & myrrhi, ana. vnci. ij. succi ma-
tris syluæ, vini stiptici in decocto ligni In-
dici feruēfacti vnci. iij. terebinthinæ, gū-
mi henemi, masticis ana. dragm. vj. lithar-
giri, minij, antimomij, ana. dragm. cæræ
albæ quo sufficit, confice vnguentum se-
cundum artem.

De epuloticis, seu cutem in-
ducentibus medica-
mentis.

Cicatricē vlcēribus induci nil aliud
est quàm cutē ipsam indurare, vt
Guido ex sua non solum sententia tract.
7. capi. de medicinis cicatrizantibus, sed
etiam ex Auicennæ sentētia testatur. Sed
hec quidem inducendā cicatrix, in mem-
bris temperatura siccis, siccioribus qui-
dem indigebit medicamentis, vt natu-
ra partis adseruetur, & quæ præter na-
turam humiditas est absumatur, vt Gale-
num. 3. artis Medicæ testatur. Rursus in
vulneribus vultus vbi turpes cicatrices dē-
mitti non licet, alijs medicinis maioriq;
circūspēctiōe (pulchritudinis gratia) est
opus. A medicamentis igitur pulchram
cicatricem vlcēribus vultus inducētib;
initio sumpto hæc sunt. Recip. corali v-
triusque, margaritarum albarum, cornu
cerui vsti, spodij, capitum rosarū lythar-
giri singul. scrup. j. fiat puluis cui panum
vnum auri addito: at verò si quid spongi-
formis caruncule innascatur, tunc eidem
pulueri parum aluminis vsti commisce-
bis, vt cicatrix æqualis euadat. Cæterum
vulneribus aliorum membrorum cicatri-
zandis hoc medicamentum satis exper-
tum habeo. Recip. ossis capitis canis vsti,
cucurbitæ veteris exiccatæ, cornu cerui
vsti, foliorum oliuæ, & myrrhi, sacchari cā-
di, aluminis vsti spumæ argenti, sterco-
ris canis, ostracorū seu cōchilarū quæ por-
tantur

tantur à D. Iacobo infirmo exiccatoſū, ana dragm. iij. omnium fiat puluis. Et ad uertito quolibet etiam iſtorum ſimplicium per ſe virtutem etiam habere vlcera munda ad cicatricem inducendi. Ad idem quoque vlceribus præſertim carcinofis vel cacoeticis prodeſt puluis ex cācris fluuiialibus uſtis, ac pompholige, paribus portionibus commixtis, ex Gale-
no quarto. de compoſitione medicamen-
torum per genera.

**Emplaſtrum pro ſutura cor-
naria, quod miro modo phi-
bet omne rheuma à cerebro
in ſthrumas colli, ac perinde
in ſubiectas partes deſcende-
re: etiāque ſuſuſionibus ma-
ximè proficuum. & aduer-
ſus antiquos dolores
capitis.**

R Ecip. corticum citri, coriandri præ-
parati, behen albi & rubri, vtriuſq;
corali, pulueris granæ ſiniſſimæ, vel lo-
co eius alchermes, cinnamomi, capul-
lorum ſerici, granorum myrthi, maſti-
cis, gummi iuniperi, margaritarum non
perforatarum ſtachadis, maioranæ cu-
iuſque dragm. ſemis. omnibus impolli-
nem redactis, & cum labdano depurato
quod ſufficit, & guttulis therebinthinæ
ex beto lento igne cōmixtis ſecūdum ar-
tem emplaſtrum conficito in ſine adden-
do muſci ambra, ana. gran. ij. Super om-
nia conſert alijs non proficientibus poſt
corporis euacuationem, futuræ corona-
triæ fonticulum aperire candenti ferra-
mento ſubtili. Capite prius abraſo, & af-
fixa poſtea cucurbitula ſicca, vt cutis fur-
ſum trahatur, & admoto ferramento pla-
no frigido in medio perforato: per quod

foramen: candens cauteriſm intro mitra-
tur, nulla poſtea contracta mora, vt me-
facere vidiftis.

**Medicamenta ad cicatrices
vulcerum faciei auferēdas,
ſeu multum minuen-
das.**

R Ecip. radicum enulæ campanæ, &
yrcos valde coquaffatarum ana. vn-
ci. j. & cum albumine oui & pauculo cin-
nabaris plurimum agitentur, & fiat lini-
mentum quo noctu facies liniatur: ma-
ne verò decocto palearum ordeï, & fu-
maria facies ſuffigatur, & molli panno
ſudor abſtergatur. Ad idem, ſumme vn-
guentici citrini quod in pomo citri confi-
citur, vnguenti pompholigis, mercurij
extincti ſaliua ieiuni ſingulorum. drag-
iij. ſimul mixtis vnguentum conficito, &
noctu etiam, eo faciem illinito: mane ve-
rò ſequenti decocto abluito. Recip. nu-
cum pinearum mundatarum, palmula-
rum, amigdalarum dulcium, fumaria,
ſurfuris ana. P. j. omnibus minutim ſciſis
in pannoque lini inuolutis, & in olla ple-
na aqua feruefactis, excolatis, expreſſiſ-
que, faciem (vt diximus) colluito. Ad
idem, quoque ſequens medicamentum
opem fert. Sume, myrrhæ electæ. vn-
ci. iij. & cum totidem vncijs olei amygdā-
larum dulcium eam contundito, & poſt-
ea in ſacculo panni lini inuoluto, per tor-
cular exprimito recepto in eo prius aque
feruentis vapore. Hac igitur expreſſione
cicatrices vultus noctu liniendæ ſunt.
Ad idem quoque oleum florum roris ma-
rini recentiu operat. Fit igitur iſpis flori-
bus recētibus in vitreā ampullā immiſſis,
ea poſtea bene obturata, & in alta fouea
ſtercoris equorū ſepeliatur, & poſt trigin-
ta dies extrahito, & hoc oleo cicatrices
inungi-

De morbo Gallico.

221

inungito. Sed aduertito si quando contingat (quod Deus aueritat, vt saepe vidi) huiusmodi vultus vlcera post indutam cicatrice referari, oportere tunc fetonem retro collum admoueri.

Lexiuum quo super tumores cirrhosos, & aedematosos huius morbi saepe vtili, cet spongijs in eo madefactis.

R Ecip. foliorum lauri, & tamarisci, foliorum ficulneae, & oleastri, famentorum, ramorum ilicis, rosis marini, ana omnibus combustis cinerem colligito ex quo lexiuum cum vino, aqua, & pauco aceto commixtis extrahito, & vttere, vt diximus. Nec minus ad idem praestat, praesertim in articulis tumentibus eos melle calido linire, sparso desuper puluere croci, & camepithis, & ermodactylorum. Et aduertito spongiam (nisi noua sit) non profuturam: habet enim salis marinae vim maiorem. Si tamen penuria eius sit licebit loco eius Elychnio vti, id est, medulla iunci magni marini, qui etiam papyrus nominatur, & est spongiae substitutum. 14. Methodi capite tertio. docente Galeno, & apertius tertio. per locos vbi aduersus sanguinis fluxum à naribus lichinium ex spongia, vel Elychnio immitti iubet.

Ad tumores, & vlcera tibia-
rum huius morbi me-
dicamenta.

S i tibiae tumeant, factis vniuersalibus euacuationibus, sume succi ebulli, & caulium, ana lib. j. olei camameli, mel-
lis communis, cuiusque vnci. iij. ster-

coris capiti, & tibiae affundantur, & super eo-
rum, fursuris torrefacti, singulorum. P. ij.
ad ignem emplastrum confice, & tume-
factis tibijs, solidum impone, & cepto
prius fomento ex decocto aphrodisi, &
camamelli, foliorum sambuci, & tamar-
isci, atque tringi, & spongia in hoc de-
cocto madefacta, tibiae foueantur: sed o-
portet ipsis tumentibus vlceribus tibijs
deligaturam arcuatam postea admo-
ueri, quae à Guidone tracta tertio. capite de-
ligaturis docetur magni sane iuuamen-
ti, & expertus sum in illo videlicet. §. H-
go autem talem bindam, in membrisin
aequalibus, velut sunt tibiae, adapto, & c.
Quam equidem deligationem iam diu
vos docuimus, eiusque mirandum opus
experimento nouissis, quae sic fit. Scifa
vitta de palmo in palum, ab vna par-
te, videlicet, vsque ad medietatem per
transuersum, deinde incisiones illae una
super altera optime consuantur, manen-
te vitta sic consuta veluti arcuata. Et lin-
gendo, pars incisa consuta, curua par-
ti inferiori graciliori, quae ipsius tibiae ad-
mouetur: pars vero laxior non incisa,
parti ipsius superiori & crassiori, vt me
facere saepius vidistis. Vocat autem Gui-
do ibidem partem dorsalem deligatu-
rae laxam, eam quae versus partem supe-
riorem admouetur. Aut quia versus dor-
sum tendat: aut quia vitta dorsalis figurae
aliquatenus formam referat.

Medicamentum solutiuum
quod per viginti dies sum-
ptu huic morbo Gallico, ab-
sque linimento mercurij &
absque decocto ligni Indi,
subuenire solet: si ynciae dug-
illius quolibet mane assuma-
tur, vel per se, vel cum aqua
fumarie

fumariæ cuius hæc est compositio.

R Ecip. hermodactylorum, mirabolanorum Indorum, & citrinorum cuiusq; dragm. xv. elebori nigri, dragm. iij. squinanti. dragm. vj. prunorum damascenorum num. xv. passularum enucleatarum, tamarindorum, medullæ cassie fistulæ singulorum vnc. sem. capillorum veneris, radicum buglossæ, & borraginis, polypodij, florum buglossæ, borraginis, singulorum. P. j. folliculorum senne. vncias. j. Camædreos, Camepitheos, sthæcadis, singulorum. dragm. iij. semis. fumariæ. vnc. semis. eupatorij. dragm. iij. succi pomorum redolentium succi lupulorum singulorum. vnc. vj. infundenda infundantur per diem integram in libris. iij. aquæ decoctionis ragmenti ligni Indici, postea secundum artem usque ad consumptionem medietatis ebulliant, deinde excoletur, in qua colatura vna cum succis clarificatis, & duabus libris sacchari albi iterum coquantur, & fiat sirupus, & inter coquendum ponantur diagredi in panno ligati. dragm. iij. & usui seruetur. Qui à circumspecto medico moderari debet adaucta videlicet, vel minuta quantitate, & tempore, vel mutatis quibusdam (si oportuerit) mutandis, nam ut antea iam diximus hæc omnia sicuti multa alia periti medici industria indagatiōneque omittuntur. Vnde Hippocrates lib. de lege, non sine magna ratione de medico circumspecto agens inquit. Natura repugnante nil medicina proficit quibus verbis, ut falso quidam opinantur, non agit de natura virtute regitiua humani corporis, sed de medici ingenij natura qua repugnante scientia medicinæ in ipso nihil prodest. Conferret enim ad idem sumere per decem dies mane. dragm. j. pulueris rubi Indici

cum dragm. semis. senne impollinem redactæ in vino albo dillutis.

Ad hemicraneam huius morbi suffitus facta corporis euacuatione.

R Ecip. conferuæ sthæcadis, & rosarum cuiusque vnc. semis ligni aloes, masticis, copulorum, serici, singulorum. scrupul. ij. puluerizatis puluerizandis misceantur & fiant troisci. Quibus mane æger ieiunus per nares suffigatur.

Ad dealbandos, firmandosq; dentes, atque gingiuas ex præterita mercurij illinitione dolentes & imbecillas.

S Olet prope semper post illinitionem vnguentorum (quorum basis est argentum viuum) molles gingiuas & vacillantes dentes dolentesque manere, ac nigrities affici, cui malo his subuenitur, & primo. Ad gingiuas constringendas, hæc sunt experta. Recip. corali rubri, granæ finissimæ sanguinis draconis ex gutta, lapidis ematidis, masticis, gummi iuniperi, margaritarum non perforatarum, Acacie, licij, balauftiarum, cuiusque. dragm. ij. alluminis. dragm. iij. mellis rosati excolati. vnc. iij. aceti squillitici. vnc. ij. succi plantaginis. vnc. j. & semis. confice secundum artem vnguentum instar vnguenti AEgyptiaci addendo in fine musci, Ambræ ana grana. ij. quod in peticula panni lini, gingiuas noctu admo uebis, mane verò sequenti decocto os abluatur. Recip. aquæ capitum rosarū & plantaginis, vini stiprici singulorū. vnc. iij. aquæ

iiij. aquæ pilæ fabri ferrarij libra. j. semis, gummi vermicis, masticis, semis granæ, thuris, limaturæ cornu cerui, ana. dragm. iiij. alluminis dragma. iij. radices vtriufque consolidæ, rois, foliorum, & granorum myrthi, rasuræ ligni Indici, floris roris marini ana. P. semis. omnibus conquassatis, & ad medietatis vsque consumptionem feruefactis excolatisque, & in ampulla vitri obseruatis, vtire. Cui si adderes grana duo musci & Ambre placidiorem gustum redderent. Fieri etiam solet veluti tela panni lini cerata confecta ex cera alba liquefacta cui prædictus puluis commisceatur, & gingiuis prius ab humiditate fricatis admoueto, mane vero eodem decocto os colluatur. Collutio etiam oris aqua vitæ maxime prodest. Rursus si candido oui prædictus puluis ad mellis grasciciem admisceatur, & gingiuis modo dicto applicetur, pretium opere est. Cæterum interdum euenit gingiuarum carunculam au geri eo vsque, vt medicamentis non cedat: tunc summum præsidium erit actuali cauterio auri eam tangere, vt Cornelius Celsus libr. septimo. capit. 12. atque & experientia ipsa docet.

Ad tollendum foetorem oris, qui post linitionem mercurij manere solet.

Summito panem extemplo à forno extractum, & crebris foraminibus perforato, & libras duas vini albi optimi veteris in eo imbibito, & simul postea cum floribus recentibus roris marini, & lauri cuiusque. P. iij. & melle virginæ vnci. vj. & myrrha. vnci. j. contundito & per infillatorium instilletur, & ad oris collutionem, in ampulla vitri adseruatur.

Ad dealbandos dentes, post vnctionem argenti viui, vel quouis alio modo nigrificantes, medicamenta.

Summito succi limonum vnci. iij. & in vitrea ampulla ponatur; cui addæ alluminis vsti dragm. iij. & panno exasperante in hoc succo madefacto dentes fricentur. Ad idem quoque valet dentifricium ex melle communi, atque sale æquis portionibus, vsque ad soliditatem feruefactis impollinemque redactis, quo puluere dentes fricentur panno digito inuoluto. Postea vel aqua vitæ vel decocto aliquo ex supra commemoratis, vel vino tantum os abluatur.

Aliud dentifricium ad dealbandos dentes confortandasque gingiuas.

Summe radices magnas simphiti recentis, & earum extremitates leuiter contundito, & per septem dies in aceto macerentur, in quo gummi iuniperi, dragaganti, boli Armenici, thuris, masticis, sanguinis draconis, corali rubri, ana. dragm. ij. prius ferbuerint, postea radices extrahantur, atque siccentur, & vna illarum omni die dentes fricentur. Idem fieri etiam potest cum magnis radicibus maluarum. Pro pauperibus vero facile parabilia sunt medicaméta quæ fiunt ex lapide pumicis marini, & ossis sepie impollinem redactis quo dentes fricentur. Ad idem rursus fieri possunt velut lichini instar coralli paruuli ex puluere lateris antiqui & albumine oui, & pauca mucillagine dragaganti confectis, exiccatis, atque (vt diximus) formatis, quibus dentes fricentur, & vino vel aqua vitæ postea colluantur.

Aqua

224 Liber Quintus, De morbo Gallico.

Aqua mirabilis cuius opus sum expertus ad dealbandos dentes sine aliquo gingiviarum nocumento.

REcip. Aristolochie viridis, succi limonum ana. vnc. iij. aquæ vitæ. vnc. iij. aceti fortissimi, mellis virginei ana. vnc. iij. prasi viridis. vnc. j. sem. pumicis maris, corallirubri, pulpe ossis sepie, ana. dragm. ij. pulverizatis pulverizadis cum reliquis pistentur & sic in alembico vitri distillantur. Sed advertito aquositatem

prius exeuntem esse inutilem, secundam verò mirabilem vsuique magnopere servandam. Est igitur eius vsus, ut absterfis dentibus panno lini fricentur: postea frustulo ligni pini, prædicta infillatione infuso deinde iterum exasperante panno dentes fricentur.

Et sic explicat Liber Quintus, De morbo Gallico, ad laudem Dei omnipotentis, eiusq; beatissimæ matris virginis Mariæ quorum nomina per infinita seculorum secula benedicantur. Amen.

Finis libri Quinti.

✠ ANDREAE ALCAZARIS
Medici, ac Chirurgi.

Liber Sextus, quo agitur de pestilenti constitutione, & curatione bubonum, siue venenosarum inflammationum tempore pestis euenientium.

CAPVT PRIMVM.



I P A R V I S A F-
fectionibus Medicus
quantumuis doctus ab
sq; summi opificis auxi-
lio subuenire nequeat

(quid ergo in pestilen-
ti morbo omnium in festissimo (de quo
in praesentia disserturi sumus) chirurgo
rum minimus facere vel scribere posset?
nihil profecto. Diuini igitur numinis ac
beatissimae virginis & matris eius Mariae
praesidio primitus inuocato: ea quae aduer-
sus hanc pestis deuoratricem belluam, ac
praesertim veneficos bubones pestilenti
tempore pullulantes, longo periculo pro
futura inuenimus, hic impense bifariam
explicabimus. Primo quidem de praeser-
uatione. Secundò vero de curatione no-
bis agentibus. Primum igitur bona victus
ratione (quae apud praefatos auctores pro
optimo usu sex rerum non naturalium
vsurpatur) completur: & haec totidem
etiam regulis. Prima circa pestilentis ae-
ris rectificationem versatur. Secunda ve-
rò cibum, potumque qualitate, & quan-
titate, atque tempore recte summanda
edocet. Tertiò exercitationes, & quos-
cunque corporeos motus pestilenti tem-
pore vsurpanda. Quarta Methodum mi-
nuendi prauos succos humana corpora

infectantes. Quinta circa somnum, atque
vigiliam versatur. Sexta animi acciden-
tia nempe gaudium, moestitiam, iram, ti-
morem, & animam rerum contemplatio-
nem: & huiusmodi alia modificat.

C A P. II.

De causis.



Luribus circa causam pesti-
lantis constitutionis in praesentia post habitis: tum quia
longa, atque morosa esset
eius medica, atque philosophica indaga-
tio: tum etiam, ut ad bubonum veneno-
forum curationem (quod est nostrum pri-
cipale intentum) citius accedamus. Sub
breuiori, qua potero, oratione antiquo-
rum & iuniorum autorum in hoc senten-
tiam sequutus, duplicem ipsius pestis cau-
sam afferamus, superiorem, nempe in flu-
xum coelestem, signorum, & planetarum.
Quae nos ut plurimum latet, licet apud
Astronomos interdum alluscinetur: atque
diuinam permissionem, ut in sacra pagi-
na passim legitur, & inter alia plurima lo-
ca colligitur, ex. 2. Reg. 24. cap. Inferiorem
verò multifariam, aut ab aere, quauis sim-
plici ex se, ac incorruptibili, ut aqua, cot-

Pestis du-
plex causa,
superior, &
inferior.

Pestis supe-
rior causa
duplex.

Pestis infe-
rior causa
multiplex.

P rupto

Victus ratio
apud vete-
res pro opti-
mo regimi-
ne vsurpat,
ne pestis re-
rum non na-
turalium, qua-
rum usus to-
tidem regu-
lis docetur.

rupto tamen ex accidenti, nempe vaporibus malis, atq; corruptis exhalationibus sibi commistis. Et hoc varijs quidē modis, aut ex foetidis paludibus, & aquis retētis putridis, aut corporibus bello occisis, & non sepultis, aut animalculis per vi cos, atq; angiporibus insipienter omisis, aut ex putrefactione in cauernis terræ, ci bos, atq; etiam potus, & aërem ipsum (cuius attractiōe viuimus) atq; inde spiritus & humores nostros corrumpente. Communatur etiam pestis multitudine hominum, qui habent in seipsis proprietatem præparationis. Agens enim solum operatur in patiente præparato, Auic. 2. 4. tract. 4. ca. primo asseuerate. Quo euenit temperatura sanguineos, atq; biliosos in peste citius infici: pituitosos vero rarius: sed atrabiliosos multo serius, vel forsitan nunquam: habent enim poros compactiores; vltra hoc quod vtraq; eorum qualitate, nempe actiua, & passiua putrefactioni resistunt.

C A P. III.

Designis huius atrocis morbi, atque differentia inter annum morbiferum, & pestilentem.



Alterum de signis pestilentis constitutionis, tam futuram, quam infestam iam pestem indicantibus: tanta tanq; varia & diffusa antiqui, ac iuniores medici nobis inscripta reliquere, vt iure oprimo licebit in præsentī percrutatione nos parum demorari. Igitur, vt breuiter in hac tractatione procedatur, iusta prædictorū authorū sententiam, aduertito, quasdam esse notas, futuram pestem ominantes, quasdam verò ipsam iam actu nocentē, apertē dilucidantes. Primæ ergo notæ, quæ pestem præcedere solent (vt autho-

res penē omnes asserunt) sunt igneæ frequentes in cælo apparitiones, dies eadem interdum lucida, interdum nubilosa, assiduus præter solitum auster, frequens color regionis aeris, morbi regij colorem referens. Adhæc imbrium crebra signa adsunt, quæ citra pluuiam euanescent: arborum flores præcoces; præ exiguo frigore postea interemptæ: aer sæpius turbidine perfans: & denique aer non serenus: ranarum paruorum exitus multo, vt Philosophus. 2. 2. probl. 1. probl. atq; Conciliator in eius cōm. etenim, docet: multitudo item piscium mortuorum super aquas apparentium. Et certe non falax periculum est, (vt multi experimentatorum asserunt,) ad discernendum an læuior aliqua occasio, singularisq;, an aer ipse vndiq; tabificus pestilentiam efficiat, si ros super herbas, vel arbores ante Solis ortum collectus sitienti cani bibendum tribuerit: si eo è potu canis interierit, aerem nocentem in causa esse coniectantur. Cæterum peste iam tactos acerrima febris anxietates magnæ, atq; vomitiones subito infestare solent: eo vsq; vt venenum sumpsisse appareat. Sub alis, vel colo, vel linguibus trium principū membrorum emunctorijs, inflammatione nonnunquam oborta. Quæ vehemens dolor, atq; summa molestia, & angustia interdū cōmittantur ac fitis vehemens. Carbunculi etiam atq; antraces pululare solent. Quandoq; ipsa sola pestilenti febre absq; bubonibus emunctorialibus valitudine laborant: & cum vrina bona, & pulsu bono è vita discedunt. Cum enim natura sagax præferat se contra veneficum morbum præualere non posse, pugnam fugiens, ad alia eius opera exercenda, conuertitur, nempe ad vrinæ cōstitutionem, & alia. Verum enimvero, quia morbiferos annos medicorum vulgus pestilentes esse opinatur, extranea remedia pro

Peste citius corripit sanguineos, atque biliosos.

Pestis iam infestantis signa.

Pestis futurae notæ & quales.

& de venenosis bubonibus.

227

pro curatione infirmorum exhibētes pretium operæ mihi videtur inter vtrunque anni constitutionem discrimen ex Gal. snia. super principio lib. 1. Hipp. de morbis vulg. in presentia afferre. Morbi (inquit) partim sunt à victu, partim ab spiritu cuius attractiōe viuimus. Vtrosq; hoc modo distingues, vbi multi vno morbo homines corripuntur, eadem tempestate, causam illi: attribuere debemus (quod est maximè commune) & quo præcipue omnes vtuntur hoc autem est, quod respirando attrahimus. Tunc enim victum cuiusq; nostrū nequaquam in causa esse manifestum constat: ergo non fuit victus ratio in causa, cum homines quoque victu vtentes in eundem incidunt morbum. Et subdit postea, At vbi diuersis eodem tempore morbis homines afficiuntur suis cuiq; victus sine controuersia causa est. Itaq; à rectificando, resistendo ve pestilēti aere initio assumpto procedamus.

C A P. IIII.

De varia methodo venenosi aeris rectificandi, resistendique.



Via impossibile est, humanā vitam absq; aeris ad cordis refrigerium assidua attractione asseruari, vnde Gale. loco supra citato. Morbi (inquit) partim sunt à victu partimq; ab spiritu, cuius attractione viuimus &c. Vnde Rasus. 2. Cōtin. c. 17. iniungendum (dicit) hominibus est, quod non mutant regimen sed aerē, quia non accidit eis distemperantia à regimine sed ab aere. Oportet igitur summo pere pestem formidantes aerem versus temperiē declinē, atq; oppositum illi parti, à qua infectus aer perflat, abitare. Oportet rursus ad ipsius pestilentis aeris rectificationē vrbū, & opidorum re-

tores in exhauriendis lacunarum putridis aquis cœnossis, male olentibus operam dare: adq; in expellendis procul quibusq; animalculis mortuis in rubrum angiportis sapius repertis: ac denique in omni immundiciæ abstergenda. In plateis quoq; odoriferæ herbæ atq; arborū rami rectificandi aerem virtutem possidentium sunt comburendi, veluti labendula, ruta, ros marinus tamarici, iuniperi, atq; lauri rami, cupressi, adq; sabinæ: quorum quippe flāma ac fumo aeris venefica, & putrefactiua humiditas assumitur, pestilētis aeris noxa inde prohibita. Hoc namq; duntaxat modo Hipp. (vt testatur Gal. lib. De teriaca ad pif.) memoriæ prodidit pestilentem luem ab Ethiopia Græcos inuadentem & nō aliter curasse. Oportet perinde circa solis ortum aceto & aqua mixtis ad aeris rectificationem cubiculum ac domum totam irrigare: & si (facultas tulerit) aqua sit rosata: & nullo modo in meridie: caliditas namq; maior, atq; putris humiditas augerentur: vt plantis in æstu meridiē in cautē irrigatis accidere solet Phil. 2. probl. probl. 5. asseuerāre. Quam ob rem periti agricolæ ante ortum & post occasum Solis plantas irrigare soliti sunt. Pannū quoq; in aceto, & aqua ros. cū puluere boli Armen. & sandalorum rubrorū infusum intra pilam ligni iuniperi crebris foraminibus fabricatā homines portare oportet. Eius quoque odorē creberrime naribus attrahere.

Quantā autem vim aduersus omne venenum acetum sortiatur nouerit ille qui inter reliquos authores Plin. 23. lib. naturalis Hist. c. 1. nu. 40. de aceto legerit. Vbi inter alia enarrat quendā hominem vtrē aceto plenū forsā baiulantem aspidem venenosam calcasse: qui, deposito vtre, dolore acerrimo cruciabatur, recepto vero, dolore prorsus carebat. ¶ Domus præterea, atque cubicularia cellula manē se-

in mundicie
bos lōge ab
opidis ei cū
da.

Arbores odoriferas, atque herbas tempore pestis vicat in comburendas.

Pestilētiā per domos irrigandas aceto, & aqua ante ortum, & post occasum Solis.

Pestis tempore odoranda.

Acetum maximam vim habere aduersus omne venenū.

Pestilentem annū à morbis differre, & qualiter.

Pestilentem aere mutari salubrius est, quam cibum.

Cadavera, si mulcū alijs

228 Liber.6.de pestilēti cōstitutiōe

quenti pastyllos suffigetur, eoq; tabificum aerem synceriores efficere elaborandum est. Qui recipit nimpheæ, id est, nenupharis seminis acetosæ & citriolibani gummi iuniperi rosarum, sandalorum rubrorum ligni aloes cuiusq; drag. ij. caphuræ. scrup. j. omnibus in pollinem redactis cum sacaro rosato pastili conficiantur.

Ad hæc pretium operæ est domibus di-
lium spargere (vt Alexandri medici verbo utar) stramentum quale infesto. B. Ioā-
nis Baptiste spargi passim solet: de frondi-
bus videlicet, herbis floribusq;. Ad rem
etiam facit salicis, atq; iuniperi, quercus,
& lauri, lentisci, folia, atq; vitis vvas albas
ferentis. Eandem etiam opem ferunt: li-
monum ac pirorum rami cum suis fructi-
bus appendetibus (si fieri possit) & regio
& tempus, facultasque rulerint. Pomum
quoque colo suspensum, cuius hæc est
per mixtio mirifice prodest. Recip. Lab-
dani electi ac puri vaci. j. thuris ligni a-
loes heben albi & robri, sandalorum ru-
brorum seminis granæ & acetosæ, macis
calami aromatici, gariophylorum rosa-
rum zeroariæ cuiusq; drag. semis. gra-
norum iuniperi drag. j. caphuræ scrup. j.
musci ambræ anagran. v. omnibus in pol-
linem redactis cum muscilagine draga-
ganti extracta in aqua rosar. pomum con-
ficio. Apud quosdam verò Italos medi-
cos (vt certo scio) gestatio arsenici subli-
mati vsurpatur: ferūt enim summum ef-
se præsidium altero nempe veneno alte-
ri aduersante. Manus etiam atque facies
aqua rosar. pauculo etiam aceto rosar. cō-
mixta abluere, idemque naribus suggere,
eoque os colluere conuenientissimum
est. Pretiosi quoque lapides veluti esme-
ragdorum hyacinthorū granatorum vel
similium mirifica sua specifica virtute
huic pestis affectui iuuantur sunt. Con-
uenit rursus hunc morbum formidantes
à locis paludosis vbi putridæ, limosæ, pe-

simique odoris aquæ sunt congregatæ,
fugere: potissimum quibus linum & spal-
tum immorantur vt Auic. 1. 4. assert. Hu-
iusmodi enim infectionis vapor (vt iam
antea etiam diximus) pestem acerfit vt
Auenzoar. 3. Theisir. tract. 3. c. 1. atq; Ra-
zes. 2. Contin. asseuerant. Cæterum apud
fenestrarum domorum apertionem me-
dici authores in hoc conuenere, vt quæ
versus partem Setentrionalem, vel Oriē-
talem sunt: pestilenti tempore aperiātur
ab ortu Solis vsque ad horas quatuor: A-
lijs verò claudantur, huiusmodi enim vē-
ti pestis putrefactioni resistunt: eamque
præceteris magis purificant. At verò si in-
fectus aer ab ea parte, forsan communice-
tur, tunc fenestræ claudendæ potius sunt
atque ei oppositæ aperiendæ vt sententia
Razes. 17. Cont. colligitur loca etiam (vt
inquit) mari propinqua saniora sunt alijs
locis mundi: ac perinde loca montana, &
alta, licet non desuere authores oppositū
asseuerantes, nempe habitandum esse (si
fieri possit) in humili, ac veluti subterra-
nea domo. Aer præterea loca circumdās
in quibus arbores nucum, & taxi, & cau-
les multi reperiuntur deterrimus ideoq;
fugiendus est vt Hipp. inter initia. 2. lib.

Epid. atque Razes loco proximè cita. re-
stantur. Neque in vtile consiliū est, quod
tritisimum his verbis vulgus habet Ci-
to, longe, tardeque reddito. Quod ex Ra-
zis snia. 4. ad Almanforē cap. de peste cō-
firmatur, cito (inquit) ne aer dictis de cau-
sis ibi infectus eū fortassis qui in hoc mor-
bi genus incidere paratior erat, inter pri-
mos opprimat. A loco, vbi is timor est di-
scedat, idque longius: quoniā cœlestis in-
fluxus frequēter huius mali causa alicubi
incipiens solet frequenter vsque adeo la-
tius progredi vt non cum vrbe sub vrbia
modo sed etiam prouinciam interdū ali-
quam totam polluat. Vt tarde reddat: ne-
que statim confidat si pestem aliquot die-

Fenestre ver-
sus quam re-
gionem ape-
riendæ: &
quanto tem-
pore.

Maritimo lo-
ca salubriora
esse tēpo-
re pestis: &
montana: q̄
alia.

Loca fugiē-
da.

Cito: longe-
tarde quæ
reddere tēpo-
re pestis cō-
uenientissi-
mum esse, &
ratio.

gustus re-
ctificans ac
rempestilē-
tem.

Stramentum
redolētium
herbarū, &
ramos cum
fructibus suis
suspendi, at
que spargi
domibus præ-
tium operæ
esse.

Pomū colo-
suspendi
tempore pe-
stis descri-
puo.

Quibus ma-
nū, & facies
abluendæ.

Quæ vtili-
ter gerenda
pestis tem-
pore.
Loca fugiē-
da.

bus defuisse audierit, qm̄ vel id forsan in causa fuit non quod aeris corruptio omnino discesserit sed quod superstites ad hoc malum suscipiendum inepti sunt veluti temperatura pituitosi atque potissimum atrabiliosi: aut quia huic veneno paulatim assuefacti minimē ab eo læduntur. Seu quod in aliqua lunari seu coniunctio ne seu aspectu: bonus quispiam influxus (breui tamen tempore) duraturus priorem alterum pro tempore correxit. Saluberrimum itaq; consilium est. Quod vulgo cōmuniter dici solet, nempe citò (vt iam antea diximus) longe, tardēq; reddi re: quod etiam ex sacra scriptura, aperte colligitur ex Isaiaē sn̄ia. c. 26. vbi voce domini inquit, Vade popule mi, intra in cubacula tua, & abscondete modicum ad momentum donec per transeat indigna tio mea. Et Ezechielis. c. 7. Qui in ciuitate sunt pestilentia, & fame deuorabuntur, & saluabuntur, qui fugerint ex eis. Vnde non ab restupendum profecto casum (cuius plures sunt oculati testes) narrare non sinam. Iam diu in magna pestilenti constitutione, post integram ipsius pestis iam lentescentiam contigit vt reductis iā in urbem nostram, profrigatis antea ciuibus aperta domo quadam supelectilia, quæ à pestis initio reliquerant, extraxere Ea; ad maius tutamen, in riualo, vbi ranæ fortē degebant, lauarunt. Et ecce penē ex templo ranæ omnes præ nimia venenositate in stragullis ad huc latente in aquæ superficie mortuæ apparuerunt: summum profecto aeris venenositatis diu latentis inditium.

CAP. V.

De cibi, potusque ratione in pestilenti constitutione obseruanda.

Aud dubium est, quod vulgo circumfertur. Plures nempe interijisse gula, quam gladio. Proinde qui ab hoc vitio (de quo præcipue sermo est) & quocunq; alio prosperam valetudinem tueri cupit, victus rationem, negligere non debet. Oporter igitur primo cibum non antea assumere, quam appetētia prorrita inuitauerit: præcipue horis consuetis. Et tunc (si possibile sit) minimē differre. Nō varia simul coquēda cibaria congere relacet: nec à malis cibis; diu consuetis, nos subito, sed paulatiue mutare. Consuetudo nanq; (etiam si mala sit) res magna cuiq; est; iam enim in naturę habitum fer mē absoluitur, vt est apud Medicos, atq; Philosophos, velut axioma. Cibaria rur sus (si calor, vel frigus præsertim excel lunt) omni tempore fugienda sunt: sed æstate modicum frigida, hyemē vero tē peratē calida sumenda sunt. Quæ bene olida sunt, pestilenti corruptioni aduer sari, meritò putantur. Quare, præsertim hyemē aromata odora cibis commiscen da sunt: ceterum vere, vel æstate acetosa herba, agresta, plantago, lactuca, borra go, cucurbita, spinachia, citri cortices ci barijs rectē commiscuntur: melon coto neum, mala granata, muzi, hoc est grana ta mista, odora poma proficua sunt: pa nis sit ex farina triticea syncera à fursure magis æstate, quam hyemē extracta, sa leq; æstu paucō, hyemē pluri, & laudabi li aqua confectus. Aqua etiam rosa. vel al terius ex ijs, quæ cordi subueniunt, cali dæ, frigida ve iusta cordis naturam mi sceantur. Sic enim vtilius multò panis conflatur. Aqua aut laudabilior fluuialis est per lapillos, atq; arenam mundā, aut viuū lapidem fluens, vel fontis ab oriē ti orti. Pluuialis etiā proficua est, vel decoctionis acetosæ, & corticum, atq; semi nis citri. Cōmisceri etiā potest ipsi aquæ,

P 3 cum

Sacræ pagi næ autori tas qua præ cipitur fu giendam ef se pestem.

Historia mi rabilis.

Maxime, ob seruanda est, victus rō.

Cibū nequa quam sumē dū ante ap petentiā vē triculi.

Cōsuetudo altera nata ra.

Qualiter ci bariatempo re calido: & tempore fri gido æden da.

Quæ odora commiscen da cibis tem pore calido: quæ vero sit gido.

Quæ ciba ria eligēda.

Quæ aqua melior.

Plurima aqua semel hausta iniungente morbo confert.

Vini potus quando cōcedendus.

Quale vinū potandum.

Quę carnes eligendę sūt.

Carne quę fugiendę & alia.

Saxatiles pisces, & quę alia addenda.

Aromata calida & cōdimenta ipsa confecta dimittantur.

cum bibitur, tantulum syrup. de limoni bus, vel de citri acerositate. Ceterū huic malo incipienti plurimum aquę frig. cō fert. Vnde Auic. 1. 4. tract. 4. c. 4. sic inquit & aqua frigida plurima subito est iuuatiua: pauca aut consequenter exhibita, fortasse excitat caliditatem. Potus aut vini raro concedatur, nisi vel virtute imbecilla, aut corruptione (quod rarissime accidit) in pituita euenienti: & tunc, pro indigentia modo antea dilutum, sub flauum, vel sub album suauiter olens: gustui verò dulcedinis & acritudinis sit expers. Huiusmodi enim vinum à Galeno in calce artis medic. laudatur, eligiturq; in quo, ac similiter in aquę potu, si lamina auri purissimi ignita extinguerentur pretium operę esset: carnes verò pullorum gallinarum, perdicum, arietinis, hędinę, vitulina laudabiles erunt: præsertim si inter asandum, vel bulliendam succus agrestis, vel arantis, vel limonum super spargatur. Præterea caro cerui, damę, leporis, cuniculorum syluestrium, collumbarum huic affectui aliquatenus accommodantur: non quidem, quia optimum chylum generet, sed quia huiusmodi carnibus in est vis putredinis resistendę. Ac ceteris vero crassioribus, carnibus, caseo, lacte, ac piscibus magnis, cauendum: paruis aut, saxatilibus (quos vocant) dulcis, & lucidę aque vtendum, vel fixis, vel incoctis succo agrestis, vel limonum commixto. Recentia quoq; oua, forbilia cum aliquo ex distictis iam succis iuuamento sunt: capares rursus in principio cœnæ veluti olus sylvestre putrefactioni resistens, accommodantur. Quarum Aristo. probl. 2. 1. probl. 2. 1. meminit. Lentescunt quoq; cum agrestis, licet chylum attrabiliosum generent, eadem tamen ratione profunt. Ad hæc sinapis, mel, piper, gariophili, zinziber, ac deniq; condimenta omnia, quę ex istis conficiuntur, vt deterrima prorsus fugienda

sunt: ac perinde alia, ac cepe, tempore potissimum calido, atq; in calidis temperaturis, & regionibus, cum ad finem penultij gradus eorum caliditas accedat. 5. collig. & 2. cano. Fructuum præterea siccorum, quibus vt ilicebit, sunt: velut amigdalę recentes, vel aquę infusę, aulanę tostę, pasule. Ficus autem cū nucibus atque ruta infarctę in ieiuno assumptę cibibus medicinalis in præcautione à peste eò vsq; est, vt theriaca trium rerum communiter nuncupetur. Efertur quoq; eius operatio à Gale. libr. de cib. boni, & mali succi. c. 8. ijs verbis: caricas cum ruta, nucibusq; præsumptas venenis vniuersis aduersari testantur. Idem etiam Razes non paucis in locis sui Continentis asserit. Ac perinde Auic. 2. cano. c. de nucibus. Radiculę rursus magnę, atq; grossę, vt minus calidę frustatim scissę, acetoque per noctem infusę si ieiuno summantur aduersus pestē præsidium optimū est. Atque in vsu, non absque magna vtilitate compertum. Cuius iuuamenti Philof. probl. 2. 0. probl. ij. meminit. ¶ Sitis, arque fames salum tēperatura biliosis, ac macilentis corporibus nocent: crasis verò, obessive cibi atque potus abstinentia nō itidē, præsertim, si multo cibo non fuerint assueti. Ceterū hora prandij ultra. x. horā veris, vel æstatis tēpore si possibile sit minimē differatur: principio verò prandij tēpore calido cibus optimus, & salutaris est, medulla optimi pannis albisissimi, prius gelidā, deinde rosacea aqua lota: postea paucosucco agrestis cōmixto cādidoq; saccharo super sparso. Deniq; oīum acetosorum vsus quocunq; tēpe pestis rectē vsurpatur.

Quibus ætatibus, tēperaturis & in quib⁹ regio nib⁹ alia, & cepę nocu mento sūt.

Cibus medicinalis quę theriaca, triū rerū dicit.

Sitis, & famen tollere macilentos, & biliosos, malum.

Qua hora æstatis & veris tēpore: cibus semendus.

Quo cibo principio prandij vtēdam.

C A P. VI.

De regimine circa corporis repletionem, atque in anitionem in peste obseruando.

Qui

Varia cibaria in eadē mensa fugienda.



VI à peste præseruari cupit, nullo modo varia, atq; diuersa cibaria (quāuis bona, atq; amena) in eadē mensa, neq; ad saturitatem vsq; assumat. Huiusmodi enim repletio, ventriculi concoctricem facultatem imbecillam reddit. Quolibet namq; membrorum vltra modum extenso, ipsius continuas ex templo soluitur, ac debilitatur. Vnde igitur in ipso ventriculo prima coctione corrupta, eademq; in iecinore, aut difficile, aut nullatenus correctā, Secunda etiam coctio in ipso epate vitatur. Quo fit vt tertia, quæ in venis, & ea, quæ in mēbris per attractionem nutrimenti vnionem, & assimilationem digestio celebratur corrupta reddatur. Quam ob rem membra, ac totum corpus male, afficiuntur: atq; ad recipiendam pestis infectionem, aptiora redduntur, vt Auenzoar in fine Theisr asserit. Ad pestis igitur præseruationem oportet, cum aliquantula cibi orexi, potiusquam omnino expletum à mensa surgere. Eatenus deniq; cibibus assumendus est, quatenus ventriculus saturitate non grauetur: neq; ad oxiremiā putrem, neq; ad validam, mendosamq; sitim perueniatur. De vtilioribus itaq; in victus ratione est, vt idem doctor citato loco asseuerauit, nō addere cibum cibo, donec primus sit cōcoctus: & nō, nisi post naturalem appetitū, ipsum sumere. Ea namq; corpora, quæ in pestem facilius incidunt, vt Razes. 17. Cont. c. 6. testat, sunt malis succis plena. Vulgi præterea dictū memorię mandandū, scilicet omnis saturatio mala, pessima verò panis: est namq; Auic. 3. part. dict. 2. 7. Cæterum, circa aluum in pestis præseruatione ciendā, scire oportet, nepe conuenire omni die aluum subducere: & si sua sponte naturaliter non correspondeat, quanto quo-

que die vnam, duas ve pillulas iusta indiuidualem dispositionē assumere ex maffa pillularum communiū Razes, vel harum, quæ sequuntur. Quarum operatio tan præseruationis, quam curationis via (præter experimentum) ex Auerrois etiam snia. 6. collig. 18. & Razes. 4. ad Almanforem. cap. 25. mille offertur encho-mijs. Conficiuntur ex duabus duntaxat partibus aloes, & croco Orientali atque myrrha vniuscuiusq; parte vna, cū drag. j. vini chatapotia formentur: in principio pestis singulis diebus exhibenda. Dosis est drag. j. Et si aluus forsan, plus iusto soluat, semel in hebdomada ea sumere sat est. Cæterum de ventre soluendo latius inferius differemus. Lotium præterea nullo modo retinendum est: eius nāque retentio plurima parit incommoda.

Ciendam esse aluum, & quibus.

C A P. VII.

De regimine, in somno, & vigilia in pestilenti constitutione obseruando.

Vanquam Auerrois. 3. colleg. c. de somno sic dixerit priuatio, à somno est vna ex rebus, quæ vitam perdere faciunt: si tamen plus iusto eo vtamur, admodum nocet: vnde Hipp. 2. aphor. sententia. 3. Somnus & vigilia (inquit) vtræque modum excedentia, malum. Quod ægrotis nō solum, sed etiam ab hoc morbo præseruandis ob audire oportet. Vnde placet certè illa Auicennæ elegans comparatio. 2. part. c. 13. æquiparat namq; somnū quieti, vigiliā vero motui: per somnū namq; temperatū, si cut per quietem (ventriculo videlicet nō ieiuno) restauramur: per vigiliā vero ē diuerso: sicut per motū dissoluimur. Sed eatenus eis vtendum, vt sententia illa Terentij (magis profecto incunctis etiam præ oculis habenda (quæ apud vulgus

P 4 quo-

Comodius esse à mensa surgere cū aliquantula orexi quam saturus.

Cibum non esse sumendū nisi post naturalem appetentiam.

Vulgi opinio nō spernenda.

Ejūdem sex
res non na-
turales secū-
dum variū
earū vsum
possunt con-
uerſi in res
naturales, ſa-
nitatem ad-
feruentes: &
in præter na-
turam mor-
bum efficiē-
tes.

Quibus pl⁹
fomni inun-
gēdam qui-
bus ve mi-
nus.

Quib⁹ fom-
nus meridio-
nalis inter-
dicatur, qui-
bus non om-
nino.

quoq; paſſim circumfertur) aſſeruetur ſci-
licet nequid nimis. Quod non ſolum in
ſomno, atq; vigilia, ſed in reliquis etiā ſex
rebus, quas non naturales vocat, aſſerua-
ri oportet. Earum nanque moderato,
atque ſecundum rationem uſu, ipſe qui-
dem in res omnino naturales proſpe-
ram, ac naturalem valetudinem aſſeruan-
tes, vertuntur: & diuerſo verò in res omni-
no præter naturam morbum efficiētes.
Quocirca, quia indifferentes ſe habent
ad proſperam, & aduerſam valetudinem,
humanis corporibus introducendam, au-
thores noſtri in abſtracto res non natura-
les nuncuparunt. Vnde aduertito, quod
exceſſus, non ſolum in corporis affecti-
bus, medendis, ſed etiam ſpiritualibus ra-
tione moderandus ſemper eſt, vt ex do-
ctrina Sancti Thomæ in quodlibet. 18.
aperte colligitur. Verum enimverò hoc
vnum minime ignorare oportet, vt quē-
admodum non licet eandem ſemper ine-
diam omnibus ſiue curandis, ſiue præſer-
uandis, medicum cōſulere, ſed pro ratio-
nis diuerſitate: ad eundem proſus mo-
dum neque ſomno, neque vigilia: nanq;
temperatura bilioſi, vt minus ſomnicu-
loſi, ita magis ſomno indigent: pituitoſi
vero hiſ minus: & ſanguineis, & hi min⁹
quam melancholici. Et qui minori vtun-
ter cibo, minus etiam quam hi, qui, & ani-
mi, atque corporis laboribus incum-
bunt. Et, qui potentius cibaria conco-
quunt, alijs minus. Rurſus à diuturno ſom-
no (præſertim meridiano) ſummopere
(vt omnes monent) cauendum: niſi lon-
gā iam conſuetudo in oppoſitū ſit, tunc
ſenſim in aliam ſe transferat. Præterea
poſt repletionem, vel inanitionem dor-
mire ſumme nocet. Ad hæc ſomnus im-
mediate poſt cibum non ſolum ægro-
tis, ſed etiam ſanis nocumento eſt. Verum,
ſi quis vel longam conſuetudinem vita-
re nequeat, vel ventriculi imbecillitate

laboret, tunc vna, vel duabus horis (ſi fie-
ri poſſit) à cibo aſſumpto elapſis de am-
bulatione leuiuſcula præcedenti ſomnus
parciſſimè perlibandus eſt, carne ci-
toneorum bolo cum coriandro præpara-
to præaſumpto ac (ſi fieri poſſit) ſub
eo corporis habitu, vt ſedeat potius quis,
quàm iacere videatur. Amplius dormi-
re in die, non dum ſumpto cibo, nulli pro-
deſt, niſi cui mane præter ſolitum surge-
re, externo cibo nondum concocto, ne-
ceſſitas ſuit. Verum accumbendi atque
à lecto ſurgendi hora minime conſtitui
potest, præſertim in tanta noctium, atq;
dierum in æqualitate. At verò ætate, at-
que etiam vere circiter horam. 9. noctis
dormiendi, ac quieſcendi commodius
tempus eſt: à lecto verò ſurgendi parum
poſt Solis ortum, hyeme vero circiter. 8.
horam, ſomnum conciliare licebit: ſur-
gere vero hora. 8. Sed hoc iuxta lon-
gam conſuetudinem, atque alia particu-
laria aliter, atque aliter diſpenſari poſſet.
Dormire autem oportet primo corpore
ſuperlatus dextrum inflexo: deinde, ven-
triculi concoctione nondum finita, ſini-
ſtrum. Super os autem, atque dorſum in
ſomno decumbere maximè cauendum
eſt. Quod ſenſit Ariſtotel. de regimine ſa-
nita. ad Alexand. atque etiam. 3. & 5. pro-
ble. probl. 6. atque Auic. 13. tertij. c. 5. at-
que Razes. 25. Contin. cap. 3.

Hora acum-
bēdi, atque
à lecto ſur-
gendi.

Iacendi mo-
dos.

CAP. VIII.

Indicat qua ratione motus at-
que etiam quies & exercitium tem-
pore peſtis ſunt mode-
randa.



Dem certe, quod in alijs re-
bus non naturalibus, facien-
dum eſſe, admonuimus, in
motu, atque quiete obſerua-
re licebit: nempe mediocritatem. Vnde
Auezoar ſui Thifir. c. 1. cōuenere, inquit,
medici

Quæ exerci-
tium tempe-
rarum iuua-
menta affe-
rat.

Non valen-
tibus exer-
cere, fuctio-
nes prodes-
se, & quales.

Gestatiões
maximè p-
sunt non va-
lentibus per-
se exerceri.

Tēpus exer-
citiij quādo.

medici, quod exercitium temperatum siue pedibus, siue equo fiat, adiuuat ad conseruationē sanitatis, dummodo tempus nō excedat: verum exercitatio hoc habet in cōmodi quia labore exercitiij homo crebrius inspirat, & respirat: quo fit, vt magis attrahat de ipso infecto aere: sed certè ex-
ercitatione temperata excretiones quædam: quæ in cute, exterioribusq; corporis partibus assidue generantur, per halitum digeruntur: in quarū euacuatione natura, nisi exercitio adiuta, cōpletè operari nō possit, vt Auic. 3. 1. dict. 3. ca. 1. de exercitio testatur. Eodē etiā exercitio natuius calor (totius vitæ fundamentū) viuificat⁹ augefcit, vt Gale. 1. de tuenda valetudine ca. 1. asseuerat. Cæterū quacunq; causa exercitio ineptis: loco ipsius mulcebris membrorū frictio inungenda est, vt Gal. lib. de parū pillæ ludo & Auic. 3. p. dict. 2. ca. 4. nos apertè docent. Sed eiusmodi frictio primo leni linteolo, ac leniter. Demum accuratius asperiori moliat. Pri-
mo partes superiores & brachia, deinde inferiores, & crura fricentur. Gestatio etiam letica, siue vehiculo, vel lecti suspen-
sione: non valenti aliter exerceri, loco ip-
sius exercitiij accommodatur, vt Cornelius Celsus vir nempe post Hippocratē nemini post habendus lib. secundo. cap. 15. docet. Tempus verò opportunius ex-
ercitationi, vt Hippocr. lib. de aere aqua, & locis & Isaac in dietis vniuersalibus ca-
pit. secundo. esse debet cibo iam externo concocto mane expulsiq; iam virisq; nempe egestionis, & lotij excrementis. Verum exercitationem circiter horam fieri fat est. Qua finita post aliquantulam moram cibus sumēdus est. Ante cœnam quoque temperatius exercitium molia-
tur: non autem alia diei hora neque im-
mediatè post cibum: tunc enim, vt con-
coctio moliaur quiescere melius est. Po-
terit tamen quifque leui ambulatione vt

vt inde cibus in imum venticuli, vbi con-
coctio fit, illabatur. Noctu verò à peste
præseruandi extra domum non egrediā-
tur, atque à radijs lunaribus magnopere
caueant. In æstu verò solis domi quiescen-
dum est: aer nanque calidus inspiratus,
ad cor attractus, ipsum, eiusque spiritus,
ac deinde corpus totum calfacit: humidi-
tates natuias, atque spiritus corrumpit, vt
Galen. 3. de diebus decret. ait, & Razes, 17. cont. testatur. Affurgere præterea
summo diluculo, nisi post ortum solis, de-
terrimum est. Denique exercitatio ipsa
eatenus molieda est, quatenus labore nō
grauetur. De quiete verò (qua modera-
ta restauramur) idem dicendum, vt scili-
cet modum non excedat. Ignauia si qui-
dem corpus heberat, labor firmat. Cœue-
nit rursus, pestem formidantes (vt alias
etiam diximus) citius quo poterint à lo-
co infecto in locum incolumen se trans-
migrare: segniūque reddire. Cuius cau-
sam iam superius expressimus atque ex
sacra etiam pagina authoritates addu-
ximus.

Noctu do-
mi manen-
dam: & à ra-
dijs lunari-
bus summo
pere cauen-
dum.

Ante ortum
Solis min-
imè surgen-
dum.

C A P. IX.

De animi passionibus quan-
tum vtilitatis, aut incommodi infe-
rant, & obiter qualiter, & quan-
do venere vtendum.



A Eterū ex animi passioni-
bus nulla excellens prodest,
sed potius nocet, præsertim
tempore pestis: quo vitandæ
prorsus sunt cuiusmodi erunt ingens so-
licitudo, ima rerum contemplatio, sum-
ma tristitia, imaginatio, maxima vere-
cundia, timor, desperatio, ac similia. Quo-
rum aliqua natuium calorem magna ex
parte ad interiora corporis retrahūt, eun-
demque suffocant, atque exterminant:
spiritumque cuiusque infectioni passio-
nibus

Quæcum at-
ferant incō-
modi animi
passiões, &
quales.

Quibus ani-
mus mulce-
dus, & qua-
liter.

biliores reddunt: ipsosque ad exteriora exhalare faciunt: vnde exoluuntur. Mulcendus igitur animus est, iucundiori aliquo solatij, genere, vt citharę, alteriusve musicalis instrumenti hilaris ludi: seu amicorum colloquij, seu pulchrarum rerum inspectionis, aut quas natura cōdidit, aut ars egregiē fecit: aut lectione aliqua, quę iucunditatem afferat: sic enim & corporis, & animi vires feruani ac sępius augentur. Fugienda insuper est pestilentię cogitatio non enim leuiter nocet. Quantam autem animi passiones vim habeant, nouerit facili, q̃ (inter reliquos autores) Gale. 2. de symptoma. causis legerit. Vbi quosdam ex vehementi timore, alios verò gaudio subito obijisse, refert. Quā nos hęc oculis contingere vidimus. Prę nimia etiam verecūdia Homerū interijisse comperimus apud Vale. Max. lib. 9. titul. 12. de morte non vulgari cap. 1. atque Antonium Florentinum lib. 1. suarum historiarum titul. 2. capi. 6. Nec non apud autorem lib. De vitis philosophorum & poetarum capi. 14. Qui etiam Polycratem autorem adducit. Homerus nāque (vt ibi narratur) quęstiunculam in litore maris à piscatoribus sibi impositam, cum respōdere non valuisset subito naturę concessit. Quęstio, siue percontatio hęc erat, quos capimus, non habemus: & quos nō capimus retinemus: pediculos enim in vestibus perscrutabantur: Homerus verò dirigens hoc ad pisces impossibile putabat.

Mortis suspēda
Meri occa-
sio.

Quibus te-
porib, æta-
tibus, natu-
ris Ven* mo-
lestia, aut nō
sit.

Cæterum circa Venerem cum Celso libro. 3. capit. primo. breuiter dicendum Hyeme Venus non pernitiōsa: vere tutissima: ætate, & autumnō non utilis: sed tolerabilior per autumnum: ætate prorsus fugienda. Sed vltra hoc certē, quod à tempore sumitur discrimen, oportet etiam secundum varietatem temperaturarum, & habitudinum corporum, atque

ætatum in ipsa Venere differentiam constitutuere. Iuuenes nanque carnosī temperatura sanguinea præditi, venas, ac poros largiores habentes hirsuti nullo morbo laborantes præ cæteris eiusdem ætatis Veneri sunt citra nocumētum aptiores, moderato videlicet vsu, ac multo tolerabilius concubitus ferunt: deinde temperatura biliosi: pituitosis vero molesta Venus est: atrabiliosis, aut macilentis: habentibus venas, & poros astuctiores, atque conualescentibus molestissima, ac non sine periculo: nisi quam rarissimē Veneri incumbant, senibus vero, præsertim debilibus, omnino interdicatur.

Veruntamen post venę sectionem in quacunque ætate, tempore, atque temperatura, & habitudine coitus fugiendus est. Quibus animaduēsis colligitur in prædictis dispositionibus coitum moderatum conuenire: nam rarus, corpus excitat: frequens soluit. Moderatus sit, quando nullum, postea totius corporis, neque membrorum grauamen, sed potius agilitas, & post moram iucunditas sentitur. Tunc nanque indicium est, naturā forsan feminis multitudine antea grauata post eius emissionem degravari. Nimia nanque retentio feminis (vt omnes asserunt) aliquatenus veneni naturā gerit: corrumpitur, enim atque symptomata grauissima, nempe syncopam, ac morbum comitalem, & in foeminis vteri extrangulatum affert. Potissimū si omnino continētes fuerint, vel si nunquam vtero gestauerint. ¶ Tutior coitus est, qui noctu exercetur, quā diurnus: & corpore, nec multo innanito, nec repleto, nec post longam vigiliam, sed post somnum & cibi cōtione iam completa, quia membra sunt iam cōpletē nutrita: tūc non lasciuia motus, sed naturę potius onere ad coitum accedat: præcipuē ante oram solitam naturales excretiōes expellendi

Quando oī
no fugiēda
Venus.

Coitus quā
diutior.

pellendi, vel forsan ipsis iam expulsi. In qua quidem sententia Philosophi, atque Medici omnes conueniunt. Gale. verò. 2. de tuenda valetudine. Summatim de coitu, inquit, post labores subsequi debent cibi & potus, deinde somnus: postea verò venerea, venereis quidem debentibus vitari. Quibusdam verò visum est: temperatum coitum esse in hebdomada semel, alijs bis, alijs sterasseuerantibus ultra hoc coitum esse immoderatum. Sed meo certe iudicio, ætatis, atque tēporis & temperaturarum, & habitudinum coeuntium ratione iuxta superiorem animaduersionem coitus diuersimodè est moderandus. Quibusdam enim semel in hebdomada superfluius coitus dici poterit nempe natura debilibus: alijs verò robustis ter quaterque diminutus.

CAP. X.

De simplicibus & compositis medicamentis, tam via præseruationis, quam curationis tempore pestis oppem ferentibus ex varijs authoribus, atque experientia collectis.



ERRA sigillata, lutum Armenum vtrunque non dissimile, vt nonnulli putant, sed ei vtilitatis par est. Quam sigillatam terram, vel Lemmiam (ab insula Lemmia sic dicta) Gale. 9. de med. simp. fac. tati fecit vt, si in nostris regionibus ipsa inueniretur, nullis quidem remedijs postponenda esset, siue aduersus pestem cum quis ea iam laborat siue antea cum ab ea sibi timet, aut vana certe essent (quod non credo) quæcumque de eis Gal. Dioscorides, Serapio, Auic. & alij tradiderunt. Rursus radix diptami & tormentille & herbe tunicæ dictæ, radix henulæ campanæ, grana iuniperi, iencia na, zedoaria, scabiosa, acedula, verbena

de qua potissimum præter ea, quæ à doctoribus inscribunt, incredibilia periculo cōperta sunt aduersus hanc pestis lucem. Cuius folia singulo quoque die si quis antea quam alius cibus accedat, mandiderit, & succum deglutierit, munitur à peste (Dei auxilio) præseruabitur: præcedente nimirum in sex rebus non naturalibus (quarum iam supra meminimus) debita obseruatione. Cæteram alia prius dicta simplicia impollinem redacta eo modo, eadēque dosi (vt de terra sigillata, & de bolo Armeno diximus) pro pestis præseruatione sumenda sunt. Verum enim verò cum ijs nostris regionibus vera terra sigillata, vel lemnia, ac perinde vero luto Armeno careamus, doctissimi, ac exercitati medici in magnis pestilentijs loco ipsius non absque magna vtilitate videntur pastillis, seu trochiscis, ex terra rubra præparata, atque sanguine hircino confectis, ac sigillatis iuxta Dioscori. sententiam: habet enim rubra terra (quam nos perperam bolum Armenum vocamus) nonnullas notas veri luti Armeni, quæ ab Auic. 2. can. cap. proprio ponuntur, nempe colorem: atque ad linguæ contactum adhaerentiam. Conficiuntur sic, prius terra illa rubra magis munda electa sæpius gelida, & ultimo aqua rosata, abluitur: postea exiccatur, ac impollinem redditur, & sanguini hircino munda, atque excollato commiscetur, & inde trochisci formantur, & exiccantur. Quorum pro pestis præseruatione mane drag. j. cum acetosæ, vel arbusci, vel scabiosæ, vel rosæ aqua assumatur, tempore videlicet calido: frigido, verò optimo vino albo: animaduersionis in hoc animaduertendis, nempe temperatura, ætate, tempore, &c. Verum cum quis iam hoc morbo laborat dupla pulueris quantitas ei exhibenda est. Quo certe remedio (vt oculatus sum testis) innumeri pene ab hac lue præseruati, & curati, incolumesque ad laudem Dei euasere.

Trochisci qbus loco vera terre lemnie vtendū est.

Que sint cōsideranda in exhibitione trochiscorū

Laudarē terram Lemmiam & bolus Armenus.

Diptami herbarū virens aduersus pestem.

euasere. Quamquam Gal. 9. simpli. medi. facul. cap. De terra lemmia Diosco. sententiam taxare videatur asseueratis (vt diximus) pastillos ex terra lemmia, atque hircino sanguine confici. Ego verò cū apostolo inquam, quod scimus loquimur, & quod vidimus testamur.

CAP. XI.

De methodo subueniendi iam peste laborantibus.

Symptoma
ra, quibus la
borantes pe
ste corripiū
tur.

QUAMVIS pestilenti infectione (aqua Deus sua clementia nos liberare dignetur) iā afficiatur, symptomata hæc penè subito ipsam inuadere solent, nempe febris, cum crebris, atque in ordinatis oripillationibus, & rigoribus: modo enim calet, modo friget: adfunt quoque vomitiones, anxietates, angustia, syncopa, pulsus cordis, interdum etiam tubercula in aliquo emunctorio, vel alibi, interdum nigrantia, instar carbunculi apparent. Namque cum pestilens infectio suapte natura præcipua mēbra, ac potissimum cor (natiui caloris sedem) aggrediatur, natura totis viribus venenum ad exterius corporis partes, & præfertim emunctoria loca, ad recipiendum aptissima, expellere conatur. Sæpè ob ortis ibidem bubonibus, vbij pretium opere erit, advertere pestilenti etiam tempore bubones non venenosos, sed ex materia benigna interdum in ipsis emunctorijs accidere: nempe alis si brachio: inguini si pedi, vel pudendo: si colo vlcera, vel pustulæ, siue scabies: sine dictis symptomatibus præcesse. Cui sententiæ subscribit Galen. 13. Metho. cap. 5.

Cum aliquis igitur, iam prædicta infectione (a qua Omnipotens sua ineffabili clementia nos liberare dignetur) se tactum senserit, oportet præpropere ad ipsum, tanquam vberimum fontem ani-

mæ, atque corporis salutis recurrere: hic enim solus langoribus vere mederi valet: ac sine ipso factum est nihil, Ioānis. 1. Postquam igitur peccata iam prorsus cōfessus fuerit Eucharistiæque sacramento suscepto, postea ad medicinalia præsidia statim recurrat, vt in decreto videlicet libro. 5. de poenit. & remiss. cap. Cum infirmas corporalis nonnunquā ex peccato proueniat &c. præcipitur: lex quoque regia idem imperat quod in ægritudine etiam salubri fieri iubent: à fortiori igitur in pestilenti lue omnium longè periculo fissima fieri debet. In quo vnum profecto, mirandū satis, aduertito: nempe Gentilium etiam nonnullos, huic negotio cōfessionis quadam tenus saltim quoad morum emendationem æquiuallēter alludere: asseuerantes, omnia vel bona, vel mala ab anima in corpus, & hominem totū influere. Vnde Plaro in Carmide quem admodum (inquit) oculos absque capite curare non licet, neque sine reliquo corpore caput, ita neque sine anima corpus. Gal. quoque. 1. de tuenda valetu. ca. 8. (et si infidelis) testatur se quotannis nonnullos egrotantiū curasse solius animi moribus ad debitum morem reuocatis. In quo certe (quod communiter circumfertur) dici posset nempe nos sapius veritatem accipere à Gentilibus, tanquā ab iniustis possessorib⁹ veritatis. Neque demorari nūc volo ex sacra pagina auctoritates, quas antea etiam tetigi, repetens. Quibus patet: vindicta Dei atrocem, ac deuoratricē pestem populum Israel, ob eius cōmissa scelera acerrimè infestasse: quam præcibus, ieiunijs, atque orationibus dominus placatus abstulit. Vt tempore etiam diui Gregorij summi Pontifi. in illa ingenti, inauditaque peste Romæ contingit. Quæ quidem apertè indicant nullum humanum præsidium confessione prius esse tentandum qua facta statim ad medicinam

Anima pri⁹
corpore me
dendum.

Nota Genti
les cōfessio
nem alluci
nari.

Interdū vin
dicta Dei pe
ste egensisse.

Quibus bu
bo pestilens
a non peūi
lenti distia
guar.

dicinam (vt diximus) recurrendum est.

Apparente igitur iam venenosa infla-
matione (de qua potissimum in hac tra-
ctatione diserturi sumus) quinque peni-
tus in curatione sunt vsurpanda. Primum
quidem bona victus ratione sex reru non
naturalium (de qua ad vnguem supra tra-
ctauimus) adimpletur. Hoc vno danta-
xat addito, vt somnus, nisi modicus, non
permittatur: cum enim huius inflamma-
tionis venenum ab ipsa natura ab inter-
nis corporis partibus versus exteriores
iam expulerat, ipsaque venenositus sua-
pte natura petat cor, tanquam natui cal-
oris arcem: ratione itaque somni ad in-
teriora retracta citius interficeret maxi-
me natura ipsa ex praterita materiei ex-
pulsione iam ad resistendum ad modum
imbecilla, in quo omnes medicinaru au-
thores conuenire eoque vt huiusmo-
di inflammatione laborantes excitandos
esse consulerint. Et licet quisque ex Auic-
cen. sententia. 6. 4. tracta. 3. capit. 33. de
morsu viperarum oppositum inferat pre-
cipientis vti multitudine somni ibi tamē
error editissimus (vt cuicunque inferio-
rem ipsius seriem legenti patebit) com-
mittitur, cum loco, aliorum perperam le-
gatur somnij. Secundum versatur circa
antecedentis materiei (quam vocant) sub-
tractionem. Tertium circa cordis con-
fortationem. Quartum sudoris concita-
tionem. Quintum penes bubonis pesti-
lentis curationem. De quibus seorsum se-
quentibus capitibus differetur.

C A P. XII.

De secunda intentione, quae
circa corporis euacuatio-
nem, & sanguinis de-
tractionem ver-
fatur.



Aliterum circa san-
guinis missionem in
hoc morbo mollien-
dam, omnes conue-
nire, incomperito est
(si aetas, & virtus per-
miserint) penesque

Rationes quibus sangui-
nis missio in
venenosa in-
flammatiōe co-
ueniat.

ad animi deliquiu sanguine esse mitten-
dum: quippe cum in forti dolore, aut vehe-
menti caumate febre, siue magna infla-
matiōe, etiā non venenosa, Gal. supra pri-
mū apho. Hipp. snia apho. 23. eam sic co-
celsit. Quae quidē oia in hoc morbo pesti-
lenti conueniūt. Ad haec, cum in huius san-
guinis missiōe veneni attractio à centro
ad circūferentiā fiat qua maximē egem-
iure optimo phlebothomia erit iuuatiua.
Amplius aer infectus venefica inflama-
tionis causa cum sit, & hic sanguini repe-
ratura proportionetur, quia calidus, &
humidus: sit vt infectio pestilens vel à
sanguine simpliciter, vel à pra dominio
causetur. Sed nullo modo ex parte oppo-
sita vena seccetur, ne fiat transitus super
membra praecipua, neque ad terminū ad
quem, sed ex eadem. Nanque si in mate-
ria pleuritidis, nullo modo venenosa, sed
benigna eadē ex parte affecta seccādam
esse venam Gal. lib. de curandi rationem
per sanguinis missionem magnopere do-
cet à fortiori in venenosa materia ne su-
per membra nobilia (vt diximus) transi-
tus fiat. Mollienda igitur est, ex parte af-
fecta inflammationis quacūq; hora, electio-
nis neglecta. Huiusmodi nanque veneno-
sa affectio, aut breues admodū, aut certē
nullas inducias reddere solet. Otissimē
nanque interimere solet: ita vt interdum
infra triduū, interdū verò breuius multo.
Si igitur pestilens bubo sub ala dextra in-
nascatur, mox, illico ex eodē brachio ve-
na nigra, mediana, seu corporalis seccan-
da est. Si verò in sinistra, ex sinistro bra-
chio ex cōi eadem etiam vena. Verum, si
inguini

Ex parte af-
fecta vena
semp. seccā-
da, & ratio.

Differentia
venae seccae
de secundū
varia loca
inflamata.

Quae vsur-
panda in cu-
ratione bu-
bonis.

Venenosa in-
flammatiōe
laborantes
poti⁹ a som-
no excitari
q̄ multū dor-
mire oportet.

Interpretis
Auic. error.

inguini inflammatio inhæserit ex saphæ
na tali eiuſdem lateris, vel digiti maioris
pedis. Si autem ſub auriculis, vel poſt eas
(quæ loca cerebri emunctoria ſunt) ex
eiuſdẽ partis affectu brachia nigra ſec,
deinde cephalica, humeraria vena ſec
etur. Meminimus aut magis inflamma

Pestilentes
bubones nō
semper emū
dioria occu
pare fed in
terdum alia
etiā mem
bra.


Scopi in sanguine mitti de inficidij, & quantitatibus pro finibus differentia.

Bubone, & pleuritide idem latus occupanti- bus ex eodẽ secunda ve- na est, si ta- men in va- rijs laterib- ex vtriusq; simul, & ite- dum si in va- rijs laterib- bubones in- nascantur.

dum, oportere exvtraque simul, & semel affecta parte venam seccare eodem momento. Idemque duobus pestilētibus bubonibus varia etiam loca occupantibus fieri licebit.

C A P. XIII.

An catarticum peste laborantibus competat, & quale.

 Irca vero catharticũ solutiuum
saltem effrene, cõscius sum mihi
peste, atq; venenosa inflãmatio

Rationes, q
bus apparet
effrenenhar

Rationes, quibus apparet effrenem phar-
macum non nocere.

ne laboratibus nocere: sed aduertito non nullos medicorū sanguinis duntaxat mis-
sioē, cathartico post habito, ī curatioē ꝑ-
cedere: ne venenositas aliq̃ pharmaci (cu-
ius pauca sunt expertia) veneno inflāma-
tio issaddita: anxietates, ingetudines ad au-
geat. Rursus si qđ minus vř in esse inest:
ergo & id, qđ magis: sed in pleuritica in-
flammatione non venenosa Auic. 10. 3.
c. 2. folatiuū exhibere veritus est propter
ingetudine (vt dicit) quā facit, ac perinde
Mēse cap. ꝑprio in calce. Auic. sequit̃,
ergo in venenosa inflāmatiōe lōgē maĩ
periculum inquietudinis & anxietatū se-
queretur, ergo non confert. Dicunt præ-
terea naturam ex præterita materiei bu-
bonis expulsiōne admodum imbecillam
mansisse, atque ob id pharmacū regulare
non posse. Duo præterea motus cōtrarij,
exhibito pharmaco, contingerent: nēpe
veneniā ab ipsa natura, ab interioribus
ad exteriora expulsi, ad intima corporis
cōuersio. Quippe cū pharmacū a circūfe-
rētijs ad cētū trahat. Amplius phlebotō-
mia ipsa vt Auic. 4. 1. c. 20. testat̃ ē euacua-
tio vniuersalis, quę multitudinē humorū
euacuat, ergo infectos humores cum san-
guine intra venas simul existētes euacua-
bit. Quamobrē vel cāsiā fistulārē, vel ta-
maros Indos, & diacatholiconē, rabarba-
rū, & similia dūtaxat exhibere consue-
runt. Quidā vero ē diuerso non posse di-
cunt, vehementi malo nisi æquē vehe-
mens auxilium succurrere. Itaque apud
eos tutius est catharticum, atque effrēne
ad humores infectos euacuandos exhi-
beri, quam lenitiuum. Vnde Gentilis à

Opposita a-
liorum opi-
nio.

Ful-

CAP. XIII.

De tertia intentione qua agitur de corde confortando: & à veneno tuendo, & de varijs ad hoc medicamentis.

AM superius ratione, atq; authorum sententijs probauimus venenū omne suapte natura cor, tanquā natiui caloris arcem, quā primum inuadere. Se cta igitur prius vena, aliquod medicamētum valetudinario exhibendum est, cordis confortationi, atque ei tutando profuturum. Quod multifariam ab authorib; inscribitur, atque experientia dignoscitur: sed hoc secundū temperaturarū statum, temporum discrimē vsurpatur. Cuius distinctio periti medici coniecturæ (vt Gal. sæpius docet) necessario relinquendum est. Et primo sequēs pulvis mirabilis operationis conficiatur. Recip. diptami regalis (quem pulegium ceruinū etiā vocant: ob id quia ceru^o venenata sagitta ictus in stinctu quodā naturali (vt ferunt) ipsum quæritat ipsoque vescitur, & à veneno liberatur) racemorum ab arbore nucū penduntium, cuiusque pares portiones, fiat pulvis, cuius dragm. j. cum aqua acetosæ, & scabiosæ ieiuno infirmo bibatur.

Pulvis alius ad idem.

Pulvis magna cū vtilitate expertus. Recip. visci quercini radicis collegiæ, diptami, singu. drag. j. radicis arbuti tormētillæ, añ. drag. j. & sem. olsis cordis cerui drag. j. corticū iacinthorū zaphirotū, rasuræ eburis, sing. scrup. j. terræ sigillatę vel loco ei⁹ luti Armeni, drag. j. & sem. oibus impollinē simul redactis, addat panorū auri num. x. & optimē cōmiscant: quidā etiā addūt limaturæ auri purissimę scrup. j. & i vase mūdissimovitri coopculo clauso vsurafferuet: cui⁹ sumit drag. j. mane ieiun-

Fulgino in quodā consilio aduersus pestem, plures (inquit) illorum vidisse euadere, quibus solutium pharmacum propinabatur, quā lēnitium. Afferūt idq; longē maius iuuamentum sequi ex materiæ venenosæ euacuatione, quā nocuum: quippe quia, quacūq; materia venenosa intra corpus derelicta, eidē corpori maximū nocuum esset. Quod deposita materia venenosa per pharmacum, prohiberetur. Nonnulli verò (quorum sententiam laudo) inter has dissentes opiniones mediocritatē asseruare nituntur. Medicinam fortem, debilem quā vocāt, nempe ex fortibus debiliore, atq; in paucula quantitate exhibentes: & hāc cordialibus veneno resistentibus etiam commixtam, vel possumus dare ē diuerso medicinam debilem fortem, id est benignam vt calsiam sist. rhab. mannā diacatholiconem & sirup. ex nouem infusio nibus rosarum persicarum. Quæ, licet benigna sint, tñ per additū quantitatis eorū gradus in operatione extensiuē augetur sicuti ē diuerso medicina fortis i exigua exhibita quantitate remittitur. Et sic dicitur medicina fortis debilis. Fortis quidē suapte natura: debilis verò, quia sua exigua quantitate debilis operationis redditur. Quantitas enim licet intensiuē gradum non augeat, extensiuē tamen ad augere ipsum potest (vt omnes asserunt) atque experientia docet. Verum in huiusmodi corporis euacuatione, nullo modo materiei concoctio (vt aliās) expectanda est, iuxta Hippo. sniam. 4. apho. 10. Medici in valde acutis si materia turgat, eadem die, tardare enim in talibus malum est. Sed aduertito, pretium opere esse, in decocto, in quo pharmacum diluendum est, simplicia aliqua medicamēta, quæ veneno aduersantur, commisceri, veluti diptamum, scabiosam, acetosam tormentilam, iuntianam & huiusmodi alia.

Quæ dicat medicina fortis debilis, & quæ debilis fortis.

Materiei concoctio ad euacuationē nō est expectanda.

Animaduertio.

ne ieiuno infirmo semel in hebdomada cum aqua acetosā, vel syrup. de acetositate citri: & certe tam præservationi, quā curationi valet.

Ad idem puluis alius.

RECIP. Doronicæ, tormentillæ, citri seminis, ana, behen albi & rubri, cuiusq; drag. semis, diptami regalis. drag. j. & semis, corali rubri margaritarum nō perforatarum singulorum dragm. j. croci scrup. j. misceantur & in pollinem reddātur: & in aqua arbusci diluatur cuius dosis est, à dragm. semis vsq; ad drag. j. cæterum hiberno tempore non incommode tanti lulum vini albi odoriferi commiscetur.

Ad idem impar, sublime medicamentum.

OLIM Vngariæ regnum penetatum maxima peste occupāte Turcarum Maximus Rex (& si infidelis) veluti tamen aliqua charitatis specie motus, ad Regem Vngariæ Christianissimum, sibi vicinum, interinducias ab vtriusque permissas, hoc teriacale medicamentum, simul cum epistola misit. Vtrunq; (non absque magno labore, & solertia) Illustrissimus Infantatus Dux D. Dominus Didacus à Mendoça habuit, apud quem magni habetur, ego verò ab ipsius medicis. Cuius medicamenti (quod teriaca oui nuncupatur) hæc est compositio. Recip. diptami albi radicis tormentillæ, sinapis albi vel loco eius communis, boli armeni ana. vnci. j. simul puluerizentur ac cribilentur: Deinde ouum recens cuspidem perforatum summito albumine inde extracto, & quæ in corticæ superfit cauitas Orientali croco impleatur: & in lebetæ ad ignem tenui ligno agitando ad exiccationem vsque, & donec coloris castaneæ formam referat circum voluatur: deinde in pollinem redigatur, & postea

prædictus puluis simul commiscendus est: ac tantundem teriacæ magnæ Andromacis fumatur: & in calice æneo lento igne cum vnci. iij. vini albi meracissimi diluatur, & liquefiat: prædicto puluere cloleari argenteo sensim commisto: & eo vsque coquatur donec oppiatæ formam referat. Quod (vt Turcarum Regis legatus atq; epistola afferebant) circiter quadraginta annos asseruatur. Dosis eius est tempore frigidum drag. j. cum. iij. vnci. vini albi: si calido, cum tantundem aquæ acetosæ: & oportet, superuenientem sudorem maxima cura ægrotū adseruare.

Qualiter tēpore calido qualiterque frigidum suū medum hoc impar tædici camentū sit.

Ad idem aliud præsidium tēpore nimis frigido vsurpandum.

SVmito cepam sub rubram, eius capitulo cuspidem gladii circum extracto, & ea quæ superfit interna cauitas teriaca electissima impleatur: cooperto capite, quod fecisti orificio eodem capitulo: & sub prunis cepam ipsam pannis, siue stupis gelida madefactis circum ductam incoquito: posteaque pistetur, & eius succum extrahito, & bibendū dato. Dosis eius est, coclear, sive unum vel duo mane ieiuno infirmo. Sed ego postea, volentibus annis, hoc idem auxilium apud Antonium Guainerium reperi aceto duntaxat differens quod ipsi committeri iubet.

Saluæ Imperialis descriptio duplex.

PRIMA est temperatior, cuius hæc est compositio. Recip. xilo balsami, corpobalsami, folij Indij, cinamomi, cassiæ lignæ, Doronici, mastichis singulorum scrup. ij. elebori nigri scrup. iij. mellis optimi quod sit satis: confice admodum Opiatæ.

Alterius

Alterius Saluæ imperialis, tē
poribus, atque corpori-
bus natura frigidis ex-
hibendæ hæc est
composito.

SVmito iuschiامي, piperis nig. radi-
cis ientianæ, elebori nigri, oppij, añ.
dragm. ij. euphorbij. vncj. j. croci dragm.
iij. philobalsami, carpobalsami, folij indij
cinnamomi calsiæ ligni, ligni aloes, do-
ronicæ, macis, cuiusque drag. ij. cum suffi-
cienti quantitate optimi mellis depura-
ti, conficito secundum artem post sepa-
rationem puluerem cōmisceto. Verum
hæc confectio non nisi tribus iam elapsis
mensibus exhibenda est. Et interim in
vitreo vase in farina ordeacea sepeliat: &
omni die argenti cocleari agitetur. Cu-
ius dosis à drag. sem. vsque ad drag. ij. sit.

Nō est sum-
menda nisi
tribus iā el-
apsis mensi-
bus.

Ad idem mirum in modum
confert confectio à Guido-
ne tradita tract. 2. c. de trans-
gressione mortalitatis.

C A P. X V.

De theriacalibus medicamen-
tis temperatioribus infan-
tibus, atque pueris tem-
pore pestis exhi-
bendis.



QUia infantibus, atque
pueris ob nimiam eo-
rum naturæ caliditatē
theriacalia medicamē-
ta admodum calida nō
sine vitæ discrimine ex-
hiberi possent: esset nanque ignem igni
addere. Infantium rursus, ac puerorum

natura sæpius imbecilla aliquātulam the-
riacæ venenositatem regulare, ac separa-
re non poterit. Vnde Gal. lib. De theriaca
ad Pisonem se in victum theriacam cui-
dam infantulo flagitationibus patris coa-
ctum, exhibuisse. Qui eadem die ab hac
luce migravit. Quam ob rem aliam tem-
peratorem theriacam, cum ad est neces-
sitas, eis exhiberi conuenit, veluti smerag-
dorum, vel limonum. Quarum hæc est
descriptio. Recip. smeragdorum scrupul.
j. & semis. peoniæ, & radices eius, cinamomi a-
na. scrup. iij. seminis citri, diptami ana.
drag. vj. corali rubri, seminis granæ & acē-
tosæ, añ. dragm. iij. croci drag. semis visci
quercini, rasuræ eburis, galagæ, añ. drag.
ij. cū succo limonū, & sirup. acetositis
citri & saccharo cādidiſsimo, confectiōe
veluti opiatam parato. Theriacæ vero li-
monum vel citri hæc est descriptio. Re-
cip. seminis citri mundati vncj. vj. semi-
nis acetosæ vncj. iij. diptami, seminis ci-
toneorum seminis bombacis, rasuræ cor-
nu ceruini ana. vncj. ij. croci. drag. iij. me-
dullæ nucum ad pondus omnium cum
syryp. acetositis citri atq; albissimo sac-
charo fiat confectio, cuius dosis in lactan-
tibus sit drag. sem. in lacte matris vel nu-
tricis diluta. Exhibeaturq; post vnus men-
sis, fermentationem: facta prius brachio-
rum vel crurium secundum exigentiam
scarificatione.

Descriptio
theriacæ li-
monum vel
citri.

Verum, quia non solum oportet, cor
ad intra, sed etiam ab extra confortari,
hæc sunt epithemata, ad hanc rem satis
accommoda, ac mihi experta. Recip. aqua-
rum rosararū, & acetosæ, atq; melisæ, suc-
ci pomorū redolentium, acetosati sin-
gul. vncj. j. & semis. pulueris trium sanda-
lorum, & diamargaritonis frig. ana. drag.
j. & semis. seminis granæ, coralis rubri pul-
uerizatorum ana. drag. semis. misce, & in
panno serico rubro in hoc madefacto

Epithemata
ab extracor-
di ad mouē-
da.

242 Liber.6.de pestilēti cōstitutiōe

super cor, & in carpo vtriusque manus apponito.

Ad idem aliud.

Recip. aquæ scabiosæ, & buglosæ, succi agrestæ, succi intubi, ana vnci. ij. pulueris diarhodonis abbaris, & sandalorum rubrorum, ana. drag. ij. misce pro epithemate: & idem etiam potest super epa ipsam admoueri. Ab intra etiā, præter theriacalia medicamenta (quorum iam facta est mentio) confert mirum in modum hoc medicamentum cordiale sæpè exhibere laboranti. Cuius hæc est permixtio. Recip. conferuæ melissæ, & rosatæ, atque borraginis cuiusque vnci. j. & sem. pulueris diamargaritonis frigidi: ossis, siue cartilaginis cordis cerui, pulueris diacoralis, pulueris lætitie Galeni, feminis acetosæ. ana. dragm. j. sacchari albisimi, quod sit satis misce & fiat cordiale, addatur panuum auri numero. v. sum pro vero cordiale hoc: de super sequentis apozimatis vasculum bibendum dato. Recip. aquarum rosarum, & buglosæ, & acetosæ, & scabiosæ, ana. vnci. v. sirup. acetositis citri, & rosati, sirup. agrestæ, sirup. confecti ex succo acetosæ, & saccharo singulorum, vnci. j. tamarindorum vncias. j. pulueris diamargaritonis frigidi, dragm. ij. misce.

C A P. XVI.

De quarta intentione, quæ sudoris concitatione, post bubonis pestilentis insultum adimpletur.

POST sanguinis igitur missionem, exhibito aliquo etiam commemoratis theriacalibus medicamentis: sudor ex templo ciendus est: quippe qui vel specifica sua virtute, vel de centro ad circun-

ferentias materia eo attracta his pestilentibus affectionibus, atque bubonibus proficius admodum est: cuius concitationis author est, Auic. multis in locis ac signanter. 1. 4. c. 7. & 10. De curatione feb. acut. nec non Cornel. lib. 3. cap. 7. De pestilentibus febribus: nec non libr. 2. cap. 17. De sudoris euocatione. Cæterum sudorem hunc interdum natura ipsa roborata veluti critica expulsiōe ad exteriora emittit: interdum verò medici adminiculo adiuta. At vero, his peractis, si sudor morosus euenerit, decoctum scabiosæ & acetosæ tepidum bibendum dato: in quo modicum ramenti rhinocerotis siue vnicornij antea infusi ferverit. At vero ut sudor copiosior euadat vaccina vesica semiplena decocto herbarum calidarum pedibus ægrotantis admoueatur. Quæ omnia præpropere fieri oportet. Hæc namque pestilens, ac deuoratrix belua interdum modicas, interdum nullas indutias reddere consuevit.

C A P. XVII.

De quinta intentione quæ circa pestilentis bubonis curationem vergitur: sed prius Auic. text. taxabitur: in quo prima fronte videtur in principio pestilentis bubonis re-

Quia pestilentes bubones in adnoscis, seu emunctorialibus locis ut plurimum innascuntur (cuius causam iam alibi docuimus) quæ in parte non solum ipsæ, sed in benignis etiam inflammationibus repellentia medicamenta, nedum propria, sed etiam large dicta ab omnibus medicinarum authoribus prohibentur. Imo è diuerso attrahentia medicamenta atque etiam cucurbitulas admoueri iubent: parui pendentes nimirum quam faciunt in ex-

Sudoris concitatio pestilenti bubonem laborantibus confert.

Quo modo moroso sudori succurrendum.

in exteriori membro immobili additionem ob maius iuuamentum membro principi, ex huiusmodi materiei expulsionem assequitur. Vt docet Auic. 4. r. ca. de medicanti. aposte. ergo per argumentum a fortiori vel a minori ad maius sequitur his venenosis bubonibus, vel antracibus nullo modo repellentia, sed attrahentia potius praesidia conuenire: non solum in emunctorijs, sed etiam alibi corporis, cum fiant ex materia venenosa, semper pro viribus ad exteriora attrahenda: ut est artis principium. Falso igitur Auic. 3. 4. c. de Althoin siue antrace venenoso in eius principio repercussua propria quae dicuntur ex posca siue oxicroto, id est, aqua & aceto admo- ueri iubet ijs verbis Althoin vero ipsum de eis quae nominata sunt curetur in principio cum eis quae alstringunt, & infrigidant locum sicut spongia infusa in aqua, & aceto, &c. in quo tria facere conabimur. Primum quorundam authorum explicationes super hanc Auic. sententiam (in qua prima fronte videtur repercussua in materia venenosa concedere) adducemus. Secundo eas efficacissimis rationibus confutabimus. Tertio veram text. explicationem aggrediemur. Et tandem quid in principio venenosa inflammationis, quidque in alijs temporibus faciendum sit docebimus.

C A P. XVIII.

De quibusdam authorum explicationibus super hunc Auic.

Alterum hic quidem Auic. text. non est ita, ut verba eius superflue, & tenuis intellectus resonant, intellegendus, sed ut cum multis in locis sibi ipsi aduersetur praesertim, prima primi, capit. primo, nec non 4. primi, capit. De medicantibus apostema, ac per i. d. c. 1. 4.

c. 1. 2. ubi adhuc in materia benigna inflammationis emunctoriarum medicamentis magnopere materiam ad exteriora omnino attrahentibus (quae sunt i. repercussuius contraria) uti iubet. Caterum Genuili a Fulgino, atque Dino Florētiz, Auic. expositoribus, ac nonnullis ex recentioribus alijs videtur, Auic. nullo modo super corpus ipsi⁹ althoin, sed super partes ipsi vicinas in circum ambitu, vel circum circa, ubi materia remissioris venenositatis est, intellexisse, repercussua esse admo- uenda. Quippe quibus corruptio inflammati membri prohibetur: secus enim (ut ibi aiunt) corrumpetur. Sed quantum i. a veritatis scopo aberrant, facile quisque rationis compos intelliget: si nocumentum repercussionis materiei venenosa influxu existentis versus cor, cum nocumento aliquantulum forsan exterioris membri corruptionis comparat: in illa enim repercussione mors certa: in aliqua membri externa noxa, non ita idem. Rursus repellentia medicamenta principio althoin circum circa ipsis admodum vel materiam venenosam ad ipsum fluentem versus cor, & membra interiora repelleret, vel ad corpus ipsius althoin. Si primo mors sequeretur infirmo: si vero, secundo circumferentialem materiam versus basim althoin aggregabunt, & augmentum ipsius (potissimum saepe causam enationis infirmi prohibebit. Ac rursus venenosa materies sic congregata fortior reddetur, scilicet ut antea dispersa, unde alius membrum corrumpere. In hac igitur expositione nullo modo animus acquiescere potest.

Quidam vero ut Nicol. Floren. 5. 7. ac per inde eius factionis alij, ex serie ipsa superiori Auic. text. explicationem inferunt, ubi inquit & saluus althoin mortali- tum est, illud quod est, rubicundum, deinde citum, sed ex eo, quod ad nigredinem est deinde, non coadit aliquis. Dicunt igitur

Quorundam explicatio text. Auic.

Taxat praedictorum expositio.

Aliorum, 2. explicatio text.

244 Liber.6.de pestilēti cōstitutiōe

tur, huic antraci rubeo remissioris venenositatis parum, nil ve nocituræ: compe-
 tere repellentia inuisse Auic. alijs. vero,
 in quibus venenositas viget, minime. Sed
 in hac confutanda explicatione non de-
 morandum: cum saluus multo, atq; secu-
 rius esset materiam aliquantum veneno-
 sam ad exteras corporis partes attrahi,
 quam ad interiores detrudi, quisq; men-
 tis composarebitur. Quippe cum ma-
 gis & minus non differre specie Philoso-
 phus asseuerauit. Ignis nanque cintillula
 (quantuncunq; paruula) quartum caloris
 ascensum, siue gradum sortitur: sic vene-
 num, quantuncunq; paruum. Rursus
 Auic. rubrum althoin non dicit esse salu-
 bre, sed non adeo mortale quam reliqui.
 Fulcitur præterea hæc mea in Nicoli sen-
 tentiam confutatio, cum ipse ferè imme-
 diate ibidem dicat. Sed tutius est, non re-
 percutere, & à percussione desistere.
 Valefius quoq; à Tarantolias Philo-
 nius multo secus hunc Auic. text. explicā-
 re nititur. Inquit enim. Super cor: confor-
 rantia, super bubonem veneficum attra-
 hētia, & inter regionem cordis & ipsam
 bubonem repellentia, Auic. in eo voluit
 se: vt effusio venenositatis inflammatio-
 nis cordi non lædat. Sed huius obie-
 ctio in promptu est. Cum enim materia
 venenosa influxu sit, siue in fieri (vt di-
 cunt) quo propinquius cordi repellentia
 medicamenta admouerentur, eo magis
 cordi læderent, quam si supra inflammatio-
 nem venenosam locum à corde distan-
 tiorem admouerentur. Patet, quia agens
 naturale potius in propinquum passum
 quam in remotum agit.
 Cæterum pro vera text. explicatione
 (in qua intellectus finaliter acquiescere
 debet) duarum alteram olim indagauit
 Primam quidem supposito pestilentis
 bubonis duplex esse principium: alterū
 videlicet sensationis, & apparitionis ip-

sius, materia venenosa fluente: cui nullo
 mō repellētia, sed potius attrahētia medi-
 camēta cōferūt, vt habūdē iā pbatū est.
 Ex hoc nāque quæ sequerent, nocumēta
 conspicua sunt. Vt pote tumoris veneno-
 si inflāmatiōis diminutio: & hinc veneni
 ipsius introrsus cōuersio. Alterum verò
 corruptionis, & apparitionis nigredinis
 post totalē materiei venenosæ expulsio-
 nē, quā Græci gangrenā vocāt. Huic igit
 scđo principio, etiā si bubo iā corruptus,
 partibus adænosus infederit, spongiā in
 posca iufusam admoliri licebit. In princi-
 pio nanq; taliusmodi antracis corruptio
 nis ad carminandam effrenandamq; cor-
 ruptionis malitiā, hoc certe medicamen-
 to, sale etiā cōmixto, periti chirurgi pas-
 sim vtūtur. Secus tñ esset cū materia erat
 influxu ante ipsius nigredinis editionē,
 vñ de aceto notādū, ac perinde de omni
 slyptico, atq; incisiuo, duplicē effectum,
 seu virtutem scđm varia tēpora sortiri. In
 principio nanq; materiā venenosā fluētē
 repcutiēdi vim habēt: penetrātibus nimi-
 rū mēbri meatus partibus subtilibus ace-
 ti, ac simul terrestribus eos cōdensantib⁹.
 Cæterū qñ in principio scđo, nēpe exter-
 na iā corruptione, & nigratie apparen-
 te (remissā iam furiositate, ac fumositate
 principij) admolitur, potius vim refrena-
 tiuā corruptionis, & incisionis materiei,
 & totū mēbri cōfortationis q̄ repercutiē-
 di habēt. Cōfirmat ex Auic. sn̄a. 3. 4. cap.
 De carbūculo venenoso, vbi in principio
 emplastrum ex malopunicis aceto inco-
 ctis super carbūculū admoueri iubet. In
 cui⁹ explicatione Guidō recte inquit re-
 missa (vt dixim⁹) fumositate principij. De
 hoc igit scđo principio patet Auic. in eo
 dē tex. tractare, cū in mediāte sub inferat
 in statu vero curei cū scāpestilatiōe (dīsta-
 tu em loquit respectu huius scđi princi-
 pij) respectu nāq; primæ scarificatio nō
 cōduceret. Augmētū aut curationē tacuit
 quia

Duplex pri-
cipium al-
thoin pri-
mum.

Alterum.

Nota dē a-
ceto: & pari-
ter de omni
slyptico.

Modifica-
tio text. A-
uicennæ.

Reprehēdit
secunda eu-
positio.

Confutatio
nis ratio.

Alia exposi-
tio tertiæ
pe.

Taxatur ter-
tia explica-
tio.

Duplex ex-
positio text.
prima.

quia eadē ferme est cū curatione status: nepe venenū ad exteriora attrahere, extinguere prorsus atq; extirpare. Ex duabus tandē explicationibus, quas superius pollicitus sum, me tractaturū, altera exposita, alterā aggrediamur, Pro qua aduertito Gal. originaliter tū. 2. ad Glauco. De causis inflammationū, tū etiā lib. De tumoribus præter naturā, atq; etiā Paul. lib. 4. c. 22. De sigmate, bubone &c. quos Auic. in hoc c. profl^o imitatur, hoc nomē bubo ad tria significata esse æquocū asseruisse: primō nempe ad apostema calidū minime venenosum, in quacunq; corporis parte innascatur secundo ad venenosum. Et dicunt postea, vt clarius suam finem exponerent, Verum priores scilicet non venenosi: quemadmodum inflammatio quæ libet auxilijs repelluntur, quæ refrigerant, & astringunt. Et hoc idē certe Auic. præfato cap. imitatus inquit, Antiquissimi antiquorum nominauerunt althoin omne apostema existens in locis glandosæ carnis, aut alibi, id est, in alio quouis loco corporis. Et subdit deinde dictū est post hoc ei quod est apostema calidum perdēs, venenosum, &c. Differt itaq; hoc nomen althoin, seu bubo ab apostemate venenoso sicut cōmune à proprio: quia omne apostema venenosum erit althoin, non tamē omne althoin erit apostema venenosum. Agens igitur Auic. de curatione primæ speciei bubonis, vel althoin non venenosi, inquit, althoin verò ipsum de eis, quæ nominata sunt, scilicet de non venenosis, curetur in principio cum eis quæ stringunt & infrigidant locum, &c. Vt ex Gal. etiam, atq; Pauli sententia locis iam citatis constat. Confirmatur etiam ex Di ni Florentini in Auic. sententiæ expositione qua in parte hæsitans, qua ex parte vena leccanda sit, inquit, In non venenoso ex opposita parte: in venenoso autem ex eadem. Ad illud autem, quod affurgit

dubium, nempe emunctoria, quibus non conuenit repercussio esse, loca glandosæ bifariam responderetur. Primō, aut illa in dictionem text. scilicet, alibi pro quacumque corporis parte supponere, aut alibi dicere alia loca glandosæ ab ipsis emunctorijs, sicut carnes sub meato, atq; in origine linguæ, & mammillarum, atq; etiam testium. Cui exponendi modo Guido tract. 2. cap. 5. de bubonibus satis alludit cum dicit, huiusmodi membra inflammata, repercussionem tolerare. Et subdit & sine dubio ita intelligit Auic. in suo 4. Ipse etiam Auic. cap. in mediate sequenti hoc idem aperte sensit, inquit, & quando apostoma est, in mammillis, & testiculis non timetur ex prohibitione. 5. cum repercussus nocumētum. Agere autem vicissim in eodem capite Auic. de viroq; althoin non venenoso & venenoso non inconuenit.

Responde-
tur cuidam
obiectioni.

oro etiam
nisi in
alio venenoso

C A P. XIX.

In quo proceditur in quinta intentione obseruanda in curatione pestilentis bubonis.



Vbonum igitur pestilenti tempore euenientium vt ex præfato text. Auic. nec non Galen. atq; Pauli (quos ipse imitatur in hoc) colligitur: quidā sunt non venenosi de quibus nunc in præsentia non tractatur: iam enim de ipsorum curatione, regulam generalem capit. vniuersali tumorum præter naturam Guido constituit. Quidam vero venenosi, de quibus nunc verba facimus qui aut rubrum tuberculum est, aut citrinum, hoc nigrum, vt ex eadem Auic. serie constat. Pro cuius igitur curatione quatuor sunt scopi seruandi. Primus venenosæ materiei extractio

Triplex venenosis bubo.

Quatuor scopi venenosi althoin in curatione

Bubonis nomen ad tria equiuocari.

Veratex. expositio.

Confirmatur expositio.

246 Liber. 6. De pestilenti constitutione

ne: sergani
dis: bus: rui
monitudo

Varijs mo-
dis prima in-
tentio vfur-
patur.

ne completur secundus eiusdem iam at-
tracta: prorsus extinctione, tertius ipsius
a parte affecta extractione, quamuis illius
hubonis iam vltimam coratione. Primum
igitur varijs modis a multis vfurpatur ne
pe aut cucurbitulis ex carificatis aut hiru-
dis inibus aut vtriusque, vel oris fucione vt
Gualdo tract. 2. c. de antracæ ac perinde. c.
de transgressionem mortalitatis iubet. Qd
etiam Gal. sententia 3. meth. c. 6. col-
ligitur. Atq; etiam Cornelij Celsi libr. 5.
vbi summopere monet, vt fuggentes hoc
virus caueant ne forte in ore habeant ali-
quam exulcerationem, sic enim pericu-
lum subirent, secus vero nullum. Alij et-
iam ranam viuentem extemplo scissam.
Quidam gallum depillato anno, sale su-
per sparsa buboni super imponant: & at-
tracto veneno gallus moritur. Quidam
cocleis pistis idem faciunt. Plurimi vero
emplastrum ex cepa intus cauatæ & the-
riaca plena sub cineribusq; affata: & de-
mum optime pistata venenoso bubone
admouent. Alij placuit venenosum to-
tum tuberculum rasorio vel forcipe pror-
sus euellere: turpissimum quidem. Alij
potentiali cauterio. Alij vero actuali idē
faciunt. De quibus sigillatim differendū
est ab actuali cauterio orsus. De quo pri-
mo dubitatur an competat. Et prima frō
re videtur non conuenire: primo quia in
ter reliquas eius vtilitates habet, mem-
brum confortate ita vt non recipiat recre-
menta Auicē. 4. part. cap. de cauterizatio-
ne affeuerante sed in apostemate vene-
noso in emunctorijs vbi prope semper in-
nascitur ipsum ad augere totis viribus co-
nandū est vt Auicē. 4. part. cap. De medi-
camentis apostema (etiam non veneno-
sum) docet ergo non confert. Rursus A-
risto. prima problema. 33. problemate,
quæ in alis (inquit) aut inguine abscesse-
runt medicamentis potius quam caute-
rio curandum est. Sed ad primum dicen-

da longe maius sequitur in mentum ex
attractione, ac simul destructione mate-
rie venenose ab ipso cauterio inducta
quam no cumentum (sicquid est) ex ali-
quantitate prohibitione tota proportionis par-
tis buboni circum vtriusq; Ad philosophi
verò auctoritatem loco citat. quo vide-
tar his partibus cauterium prohibere, di-
cendum illi in hoc aduersari Gal. 13. me-
tho. 5. & in flag. lib. introductorio seu me-
dico titul. de chirurgia. Vbi in alis atque
inguinibus cauterio in myrthi folio simili
aperire iubet. Et idem Pauli lib. 4. cap. 22.
atq; Razes lib. Diuisionum docent, & de-
niq; est omnium recte practicanum v-
sus. Quam ob rem haud immerito subti-
lissimus Conciliator in huius text. Philo-
sophi explicatione veluti anceps verita-
tis ipsius inquit primo quod sermo eius
in hoc forsan in experti non est verus
sed exemplaris potius in quo magis ex-
positio quam verificatio requiritur. Ve-
rum postea ne videretur impudens tanti
tanque grauisissimi authoris sententiam
absque aliqua explicatione dimittens:
eam vitionem, atq; incisionem non qui-
dem partibus emunctorialibus. Sed ad
oculorum affectum; & calculi vesicæ
eas adscribit. Sed forsan dicere etiam li-
cebit Philosophum non quidem leuem
apertionem neque cauterizationem qua
passim vtimur in emunctorijs, ea infe-
riæ prohibuisse: sed ingentem; ac su-
perfluum duntaxat exultionem præci-
pua membra emunctorijs vicina, exi-
mio suo calore molestantem, vel altam
carnis incisionem, & euulsionem car-
nis inflammatorum emunctoriorum.
Quam natura ipsa spongiformem ad re-
crementa membrorum principum me-
lius in se emungenda condiderat. Cuius
manere euulsa illa carne spōgiforma: na-
tura priuaretur: nempe callo ingēti in ea
parte post vlceris consolidationē indura-
to. In

Responde-
tur Auicē.
sententia.

Gal. aduers-
satur. Arist.
& Paulus, at
que Razes.

Non placet
Conciliato-
ri Arist. sen-
tentia, & ne
videretur in-
solens alie-
na machina-
tur.

Authoris ex-
plicatio in
verba Ari-
stotelis.

V. A quale
cauterio ve-
nenoso bu-
boni compe-
tat.

Auicē. senten-
tia.

Aristot. sen-
tentia.

Nocumen-
tū maximū
extractio
ne carnis e-
munctoria-
lis, vel ex al-
tra & ingenti
cauteriza-
tione.

Confirmat
sententia au-
thoris.

Taxatōe
res cautōis
potentia.

Alia medi-
camēta quae
auctori pla-
cent.


Consilii in
sugendo ve-
nenum.

Et in hac rursus inflammata carnis edul-
sione ob vaforum illie tendentium ma-
gnitudinem maximum sanguinis proflu-
uii periculum emerit. Cui certe expo-
nendi modo Cauliacus tract. 2. c. de apo-
stemate fugilico & indurato in emuncto-
rijs visus est alludere ubi inquit. Multa au-
tem incidunt & glandulas naturales. eue-
lunt, quod ego non facio quia post locus
indicatrizando contra intentionem natu-
rae induratur. Quae illas partes ad recipiē-
das superfluitates membrorum principa-
lium molles addit. Hanc igitur altam
emunctoriorum exustionem, & carnis
euulsionem philosophus in ea serie aper-
te prohibet, non tamē superficialem cau-
terij, neque sagittellae apertionem. Qui-
bus communiter vitimur. Ex quo eminē-
tissime obiter patet confutatio in non-
nullos satis temere tempore pestis natu-
rales emunctoriorum inflammatorum
ad eas euellentes. Praeterea potentialis
cauterij vsus is venenosis bubonibus nō
est tutus, propter ingentem non solum
dolorem, sed etiam ingens incendium:
quod in toto corpore concitatur. Attra-
ctionem verō, siue ranis scissis, siue gallo
ano depillato, siue fuctu oris, vel cucurbi-
tulis scarificatis, atque hirudinibus molli-
tam laudo. Sed in illa oris suctione, quae
à Galen. 13. metho. cap. 6. & Cornel. lib.
5. & à Guidone tract. 2. cap. De transgres-
sione mortalitatis laudatur, aduertito iux-
ta ipsius Cornelij loco citato sententiam,
oportere fugentem nullam in ore habe-
re ulcerationem. Quoniam si haberet, vi-
tē periculum subiret: sin minus, quod ex
perientia se compertum habere inquit:
sed si meum consilium in hoc admitti li-
ceret ore prius aceto acerrimo optime
loto, & non aliter suctionem hanc fieri
consulerem. Quantam autem vim ad-
uersus omne venenum acerrimum habeat,
neminem (vt opinor) latet. Reliquis ve-

ro medicamentis dictis tutius possemus
primam attrahendi intentionem adimplere.

C A P. XX.

Quo indagatur an praedictū
medicamentum ex cepa atque the-
riaca confectum (vel theriaca ipsa
per se) super pestilenti bubone
tuto ad moueri possit.



AEstari certe non im-
merito posset, an pra-
fatum ex cepa atq; the-
riaca medicamentum,
vel theriaca ipsa per se
exterius illita super bu-
bonem pestilentem iuuamento an nocu-
mento sit. Nanque vel theriaca ipsa attra-
hendi ad se venenum, vel ipsum a se ex-
pellendi vim habet. Si primum, exterius
certe illita, vt venenum foras euocetur
duntaxat competeret, & nullo modo bi-
bita ne ad interiora venenum attrahat.
Si secundum, ne utique exterius illita
conueniret ne venenum ad interiora de-
trudat. Sed huius oppositum ex sententia
Galen. lib. De theriaca ad Pisonem aper-
te colligitur: vbi in morsu venenoso ra-
bientis canis theriaca ipsa exterius super
vulnus applicita, atq; ore sumpta vt do-
cet. Cuius eam Gentilis à Fulgino super
lib. 5. canonis Auic. agens de theriaca ele-
ganter exponit. Vbi operari ipsam theria-
cā (inquit) attrahēdo, atq; postea venenū
fugādo, & expellēdo, quā admodū phar-
macū solutiū. Sed quā primū in tractu
praeperere, occisimēq; venenū virtute
theriacali extinguit. Itaq; licet tūc expel-
lat, nullā habet nocēdi potentia: cū iam nō
sit sub forma veneni, sed cadaueris ipsi.
Exēplū de caelo recēti toxico affert, qd
licet illius toxico, infectus, atque niger,
reddatur, opima tū theriaca in altero la-

Dabium.

Galen sententia.

Gentilis ratio.

Exemplum operationis theriacae.

248 Liber. 6. De pestilētricōstitutiōe

tere ipsius casei illita nigricies illi correspondēs rectificata discelsit, caseo, ut prius de albatō. Ad eandē igitur primā intentionē, quę venenī attractiōe molliū plurima etiā alia medicamēta, non absq; vtilitate nobis experta, adducere volumus, ut secundū particulariū exigentiā peritus medicus in eorū vfu distinguere valeat. Quorū primus sic conficitur. Recip. alliorū syluestriū, vel domesticorū, ceparū rubearū caricarū siccarū, radices cucumeris sylvestris singul. p. j. quibus prius incoctis, ac pistatis, adde nitri drag. ij. fermenti. p. sem. stercoreis colubini, vnc. j. sinapis, drag. ij. puluerizatis puluerizandis, & omnibus optimē mixtis emplastrū conficito. Addito etiā modico antiquissimi olei.

Aliud ad idem, sed mitius medicamentum.

Sumito radicū liliorum alborū numero. iij. scindant minutissimē, atque pistentur: deinde bulliant in oleo lilij coelestis: postea addant limatariū cum coaculis suis nu. vj. iterumq; pistentur. Et simul scabiosę, & rutę vindium (sit tempus tulerit) cuiusque. p. j. sint minus ipsarum puluis. De scabiosę ramusculis, ac perinde de symphitu, id est, consolidę maioris virentium, magnā profecto à quatuor magistris promittuntur si totum videlicet inflammatum membrum ipsis optimē inter duos lapides pistatis, inuoluatur. Et certē vltrearum mirabilem quam Guido vocat iuuandi proprietatem temperatorem attrahendī virtutem sortiuntur aqua sapientius opus est, potissimum nempe biliosis temperatūra: iuuenibus effrene caliditate præditis, ne humores in sumo scandescent ac furiant, magisq; inficiantur. Magna itaque Medici dexteritate in ijs medicamentis adinouendis est opus: ita ut in frigidis temperaturis, calidioribus remedijs in calidis vero temperatio-

ribus vtatur. Quorum medicamentorū crebra fieri debet remutatio, ut doctores admonent, ne venenosa materies à medicamento, iam attracta ibi retenta versus cor euaporet. Cura etiā habita, cum venenum ad affectam partem trahere conamur: ut frictiones, atque deuinationes (aliās infestissimæ) membris è directo huic malo correspondentibus molliantur, ut pote, cum sub ala dextra bubo innascatur, dextro brachio: leua verò, sinistro: inguini dextro, pede eodem.

C A P. XXI.

De secunda intentione in curatione althoin obseruanda.

Eracta igitur iam, atq; completa prima intentione veneni extrorsus attrahendi, scientifica (quam diximus) distinctione præ oculis in curatione habita: postea secunda, quę veneni extinctiōne completeretur, statim aggredienda est. Super basim itaque ipsius althoin sequens medicamentum imponito. Recip. ficuū pinguium, fermenti ramusculorū virentis scabiosę cuiusque. p. j. theriacę electę, drag. iij. ex omnibus bene contusis ac pistatis emplastrum conficiatur: addito in fine salis nitri momento, & modico pulueris iuntianę atque tormentillę.

Ad idem.

Recip. cottoniorū minutissimē cissorū numero. ij. cum quarta parte theriacę electę optimē pistentur & apponito. Ad idem aliud. Recip. vitelorum ouorum sub prunis assatorū nu. iij. salis nitri impollinē redacti drag. ij. pulueris cōsolidę maioris drag. j. misceant simul donec vnguētī formā referant. In circūambitu verò althoin, attracta videlicet iā, atq; extin-

Medicamentum quo attrahitur venenū à dextera.

Laus scabiosę, & symphiti.

Varijs naturis varia medicamenta attrahentia, sunt admodum.

Medicamentum.

cta

& de venenosis bubonibus. 249

sta, prius venenosa materia: & ea parte aliquatenus ulcerata, ne sua effumatio de cordi forsan lædat: tunc tps (vt iā antea p bauimus) licebit tuto in panno in medio perforato stipiticum, atq; confortans malagma admoueri licet in primo principio (vt alias diximus) infestissimum fuerat. Cuius hæc sit compositio. Sumito olei rosati, & myrthi, cuiusque vnci. j. & sem. acetirofati, vnci. j. boli Armeni, sandalorum rub. puluerizatorum, pulueris scabiosæ cuiusque dragm. iij. cæxæ quod sitisatis confice vnguentum.

Medicamē
ta incircum
ambito ad-
mouenda.

Ad idem aliud.

Recip. olei nimpheæ, & mastichini cuiusque vnci. j. pulueris acetosæ, & granæ finissimæ, coralini rubri, ana, dragm. fem. succi acetosæ, & scabiosæ, ana. vnci. fem. cæxæ quod sufficiat fiat linimentum.

Ad idem emplastrum, cuius supra meminimus atque in principio fluxionis non con ferre probauimus, quando vtiliter admouetur.

Constat ex duobus malogranatis acetosis cum cortice suo satis con tussis: & aceto optimè in costis, atque morosè pistatis, & panno etiam (quem diximus) in medio perforato circum cir ca applicito. Verum ad tertiam intentio nem, quæ corrupti extractione adimplet ur, scarificatione alta incircumambitu admota fiet: vltra eam videlicet quæ prin cipio ad attrahendam materiam vene nosam super ipsum althoin simul cum cucurbitulis faciendam esse docuimus. Extracto autem nigro, ac venenoso san guine locus spongia noua in decocto a quæ, & aceti, atque scabiosæ & iuntianæ madesacta foueatur. Postea emplastro

Tertia intē
tio excarifi
catio.

ex asungia suylla ac ficubus siccis, passul-
lisque enucleatis, ac fermento pari por-
tione mixtis, modico salis superaddito

vtendum. Verum enim verò si bubonis
diruptio, siue nigri corrupti, siue rubri
corruptionis expertis differatur, statim,
suppuratione neglecta, quæ in alijs inflam
mationibus spectari solet, candenti ferra
mento præcociter aperiatur. Huius
modi nanque cauterium quocunque fe
ret tempore pestilentis inflammationis ac
cōmodatur. Locus autem cauterio exu
stus, vt crustam siue scaram à se expel
lat, linimento ex ouorum luteis atque va

Quando cau
terio vten
dum.

cino butyro, oleoque communi æquis
portionibus atque pauca farina triticea
commixta, illiniatur. Neque alienum e
rit, eidem linimento scabiosæ & aceto
sæ pulueris modicum commisceri. Ad
idem quoque præstat butyrum vaccinū
cum puluere sulphuris viui commisceri.
Crustam quoque eleuat medicamētum
ex corticibus radicum altæ recentis, &
passulis & ficubus siccis & oleo feminis
lini, & ouorum luteis cum croci momen
to, & butyro vaccino omnibus mixtis,
& morosè pistatis. Crusta igitur bubo
nis iam dempta, vltimo vlcus sequenti
bus medicamentis emūdandū est. Dein
de sarcoticis carne implendum. Sumito
succu scabiosæ, & acetosæ, atque apij sin
gulorum vnci. j. mellis communis, vnci.
ij. & sem. farinæ ordeaceæ, quod sufficiat,
confice vnguentum cui vitellorum ouo
rum numero. ij. addantur. Ad idem. Su
me succu absinthidis, & apij cuiusque vnci.
& sem. succu scabiosæ vnci. sem. mellis
rosati coll. vnci. iij. terebinthinæ clarissi
mæ, vnci. j. myrrhæ electæ sarcocolæ pul
uerizatorum cuiusque dragm. j. farinæ or
dei dragm. iij. pulueris croci, scrupu. fem.
confice vnguentum. Cæterum si crassior
materia in vlcere supersit vnguento a
postolorum, vel Aegyptiaco, vel quo
piam

Medicamē
tum pro ele
uanda cru
stra.

Aliud.

Quarta in
tentio.

Mundifica
tia medica
menta.

Mundifica
tia medica
menta & sarco
ticum.

Abstergen-
tia atq; cor-
rodentia me-
dicamenta.

Vnguentum
vulgo nuncu-
patur rufum.

Aliud ad
idem.

Sarcoticum
medicamen-
tum.

pia alio fortiori abstergetur quale fie-
ri posset puluere Ioannis de Vigo alicui
istorum commisto, vel aliud ex rosato o-
leo, atque argenti spuma, id est, lithargi-
rio ad crassitatem incoctis conficito: addi-
to in fine sufficenti prædicti pulueris quā-
titate. Fieri etiam potest, ad idem aliud
medicamentum: cuius hæc est constru-
ctio. Recip. olei rosati vnci. iij. elebori ni-
gri, pulueris de Vigo lithargirij, an. drag.
iij. cæra quod sufficiat, confice vnguen-
tum. Verum vlcere iam prorsus mundo
medicamentū sarcoticum vsurpādū est.
Quod sic fieri pōt. Sume succi cetaureæ,
veruascij, scabiosæ & matris syluæ singulo-
rum vnci. j. olei mastichini, & rosati, om-

phantidis cuiusq; vnci. ij. & sem. buliant
in vnci. viij. vini albi optimi vsque ad vi-
ni & succi consumptionem postea excol-
letur: deinde adde rasinæ pini terebinthi-
næ ex beto ana. vnci. j. thuris, mastichis,
myrrhæ, aloes impollinem reddatorum
cuiusque drag. j. & sem. cæra, quod suffi-
ciat confice vnguentum: & in separatio-
ne ab igne adde pulueris seminis granæ,
dragm. j. croci gran. v. Hactenus de pesti-
lenti constitutione: atque bubonibus ve-
nenosis differuimus. A quibus omnipo-
tens, & misericors Deus, Sumus, atq; vni-
cus salutis animarum, ac corporum au-
thor, summa eius clementia nos liberare
dignetur. Amen.

✠ Finis libri Sexti, & totius operis, ad lau-
dem, & gloriam Dei, & intemeratæ Virginis matris
Mariæ: quorum nomina per infinita seculorum se-
cula glorificentur. Quos suppliciter depre-
cor vt opus nostrum suæ Reipubli-
cæ profuturum sit.

Amen.

S A L M A N T I C A E,
In ædibus Dominici à Portonarijs, Sacræ
Cath. Maieſt. Typógraphi.

I 5 7 5

INDEX T V M C O P I O

fissimus, tum etiam selectissimus eorum

quæ in hoc opere sparsim continentur, ordine Alpha-

betico digestus in quo prior numerus totum. Al-

ter paginam seu columnam designat lite-

ra. P. principium paginae Indicat.

M. medium. f. vero finem.



A Bdomini consuendo, du-
plex error. comitti po-
test. 163. 2. f.

Abdominis vulnerati, va-
ria consuendi metho-
dus. 163. 1. m.

Abdominis consuendi, sub
obscura Galeni verba declarata. 163. 2. m.

Aceti vsus in tuberculis, iuxta nervos obor-
tis, qualiter moderandus. 184. 2. m.

Acetum ac omne stitum duplicem ac diuer-
sam virtutem: secundum varia tempora ha-
bere compertum est. 244. 2. m.

Acetum accerrimum, super dura cerebri me-
brana Hypocrates infundit iubet. 72. 2. m.

Actuale cauterium, longe securius potentia-
li. 183. 1. f.

Actuale cauterium an venenoso buboni co-
petat vel non. 246. 1. m.

Acuti morbi duplex terminatio. 37. 2. f.

Acos ad futuram vulnere qualis. 115. 1. m.

Alopecia affectis, capillos antea nigros in al-
bis mutari, post sanitatem vero in priorem
nigredinem redire autor vidit. 204. 2. m.

Alopecia seu capillorum defluuium æthiæ
febris tertie speciei superueniens, præser-
tim cum alijs finitris indicijs lethale sig-
num. 204. 2. m.

Animi passiones, quantum afferant in com-
modi, & quales. 233. 2. f.

Animi passionum casus admirandi. 234. 1. m.

Animalium, nonnulla prorsus disiecta, agglu-
tinari quidam asserunt. 120. 1. p.

Anodina, vellargerepellentia, nervorum ab-
scissibus conueniunt. 124. 1. p.

Apertioni inflammationis septem scopi ob-
seruandi. 125. 1. p.

Apechema, quæ fractura sit. 19. 1. p.

Aqua excocta ad vulnere agglutinanda. 128. 2. f.

Aqua frigida nervis aduersa. 108. 1. p.

Argenti viui facitij conficiendi methodus.

142. 2. m.

Argenti viui illinitione iam finita quæ medi-
camenta fortorem oris auferant. 223. 1. f. ad
idem dentifritium. 223. 2. p. Aliud ibi. 2. m.

Ad idæ aqua mirabilis & experta. 224. 1. p.

Argenti viui simplicis vsus, licet morbo galli-
co non competat, correcti tamen & alijs
commixti qualiter proficit. 128. 2. f.

Argenti viui naturæ apud authores discordia
140. 1. f.

Argenti viui, quatuor species. 142. 2. p.

Argenti viui linimento vngendis, quo laua-
cro brachia & crura abluenda. 215. 2. f.

Argenti viui linimento vngendis, quæ præpa-
randa. 145. 2. f.

Argenti viui linimento, nullo modo ventri-
culus, nec emuntoria, nec spinalis medul-
la, nec articuli linienda. 146. 1. m.

Argenti viui vnguentum, quo morbo gallico
laborantes illiniuntur non est igne liquefa-
ciendum & ratio. 146. 1. m.

Argenti viui vnguento illiniendi & modus,
& tempus. 176. 1. m.

Argenti viui illinitione accepta, brachia & crura
codæ lauacro, quo antea abluda. 147. 2. p.

Argenti viui illinitione accepta, spucione ces-
sante, varia medicamenta aduersus oris &
gutturis vlcerationes applicandæ, de qui-
bus ibi. 147. 1. f.

Argenti viui vnctione suscepta, vel decocto
ligni indicij hausto, qualis victus ratio ob-
seruanda. 147. 2. m.

Argenti viui adulterati dignoscendi metho-
dus. 214. 1. p.

Argenti viui vnguento illitis, pharmaco solu-
tuo non vtendum nisi prorsus oris euacua-
tione iam finita & ratio. 146. 2. m.

Argento viuo, qualiter celerrimus motus ac-
cidat. 144. 2. f.

Argento viuo in linimentis commiscendo
quæ aduertenda. 213. 2. m.

Argentum viuum in aliquo medicamento in-
grediens, qualiter post annum separari ab
alijs prorsus possit. 196. 1. m.

†

Arculus

INDEX.

Arculus supra capfulam, in qua crus vulnera-
-turi reponitur. 107.2.p.
Aristolochia duplex. 126.1.f.
Arteria a corde ortu licet in sanguinis missio-
ne pungiuntur non accidit conuulsio sicut
accidit peruis a cerebro. pagatis. 101.1.p.
Aristotelis sententia qua videtur cauterium
emundum & orijs inflammationis prohibuisse qua-
liter intelligenda. 246.1.f.
Attriti ac contorti nervosi membri, absque
vulnere curatio. 120.2.m.
Auicennae locus declaratur. 28.1.m.
Auicennae textus duplex explicatio. 244.1.f.
Auicennae textus, vera explicatio. 245.1.f.
Auicennae textus in fissuris labiorum, quorum-
dam explicatio ridicula. 177.2.f.
Auicennae interpretis error. 237.1.m.
Augmenti triplex species cum sit, qua nam
ipsa luna in plenilunio augetur. 57.1.f.
Aurium vlcera, aceto sanescunt & scoria ferri
& troscilij ex calce. 126.2. p.
Aurium foramina. 16.1.f.
Auris combustio vtrum ischiadi seu coxendi-
cium dolori iuuamento sit. 198.1.f.
Auris in coxendicium dolore, qua parte cau-
terizanda. 149.1.f.
Authorum discordia de loco refectionis pe-
toris, & authoris opinio. 149.1.p.
Authorum dissensus in curatione vulnerum
penetrantium, ad cauitatem thoracis & cu-
iuscunq; eorum ratio redditur. 135.2.m.
Authorum quorundam expositiones circa
naturam argenti viui, intellectui non satis
faciunt. 142.1.f.

B

Balamum indicum (quod falso vocat)
quid sit. 127.2.p.
Basilare os. 16.1.f.
Biliflua exuberante, vel sanguine seniores ob-
oriuntur synthomata puerita vero, vel bili-
atra, non adusta remissiora. 48.2.m.
Brutorum forma, ex potentia materiae redu-
citur. 120.1.m.
Bubonis nomen, trifaria & quatuor. 245.1.p.

C

Calli excessus quando amputandus
122.1.p.
Callo minuendo pyritidis lapidis sus-
fusus. 121.2.
Callus spirituum transitum, & ne abscessi ner-
ui inter se cohaereant prohibet. 123.1.f.
Camarosis vel camaromata, quae species fra-
cturae cranei sit, & quare sic nuncietur.
79.2.p.
Cambit nobis ignotum cum sit, quid loco e-
ius substituere liceat. 178.2.f.
Capillorum materies & vitas multiplex,

145.1.m.
Capita fracturarum, expertia nonnumquam re-
periri. 15.1.m.
Capite cum fractura cranei vulnerato, si eger
ipse retento spiritu, sanguinem per fractu-
ram emittat, signum penetrationis. 23.1.f.
Capite vulnerato panni lacte muliebri imbã-
tione oculis superponendi. 72.1.p.
Capiti rotundo oblongum vulnus absq; pe-
netratione fieri non possunt. 13.2.m.
Capiti a natura oblongo magnum vulnus à
telo incidenti, citra penetrationem cranei
accidere potest. 21.2.m.
Capitis descriptio. 13.1.m.
Capitis vulnerum penetrantium, varia indi-
cia. 20.2.m.
Capitis vulnus ab incuruo telo inflitum mag-
num, siue oblongum, citra cranei penetra-
tionem fieri potest. 21.2.f.
Capitis vulnus, paruum, seu breue, qualiter
possit craneum penetrare. 21.1.m.
Capitis anathome. 14.1.p.
Capitis partes continentes, atq; cõtractae. 14.1.p.
Capitis craneo vulnerato, quale iudicium a
sonitu ossis sumatur. 24.1.f.
Capitis vulneris lateralis, post admotum su-
duram curatio. 41.1.m.
Capitis vulnerum ossa commota, vel altera-
ta, non sunt violenter extrahenda nisi in-
terdum coacte. 64.2.f.
Caput oculorum causa, altiori loco positum. 13.1.f.
Caput sphaerica figurae conditum, cum nulla
alia capaciore figura sit. 13.2.p.
Caput quamuis rotundum, vtrinque tamen
compressum & ratio. 1.3.2.p.
Caput hominis, plus cerebri, quam reliqua a-
nimantia, proportionem magnitudinis con-
tinet. 13.2.m.
Caput quibusdam, oblongae figurae reperitur.
13.2.m.
Caput frigidae temperaturae. 13.2.f.
Caput, quibus partibus constet. 14.1.p.
Caput tentae, non debet, vlcis orificiũ pro-
fus claudere. 140.2.m.
Carnis productio naturae opus subtractio ve-
ro artis. 182.1.f.
Caruncula spongiformis, atque raritas qua-
dam. Inrer vtranque cranei tabellam conti-
nentur. 14.2.f.
Casus in felices, qui ex nervi punctura, con-
tingere solent. 111.2.m.
Casus notandi in vlcere ventriculi penetrã-
re. 156.2.f.
Casus satis admirandi. 157.2.p.
Casus satis aduertendus. 158.1.m.
Casus stupendus. 158.1.m.
Casus stupendus, qui Segouiae cuidam mulie-
ri conti-

INDEX.

- ri contingit. 162.1.p.
- Cafus & contusio alicui cum accidit, quare statim gelida ei exhibetur. 76.1.m.
- Cafus in quibustrepanatio cranei ferius multo quã autores iubet, molliẽda est. 67.2.m.
- Cafus in qbus fera trepanatione admota, chirurgi taxadi sunt & in quibus nō. 68.2.m.
- Cafus admodum difficilis creditu in quodam iuvene pectore vulnerato. 154.1.f.
- Cafus rarissimus, qui auctori contingit in curatione vlcis antiqui penetrantis in pectore. 37.1.f.
- Cafus menstruus, cum spinalis medullę in cisione. 137.2.p.
- Cafus ex contusione valida in toto corpore euenienti, quare æger syndone in gelida madefacta inuoluitur æstate, hyeme vero vino. 76.1.m.
- Cataplasma ad contortum membrũ. 120.2.f.
- Cataplasma aliud ad idem. 121.1.p.
- Cataplasma aliud ad membri duriciem, & ad motum difficilem. 121.1.m.
- Cautistici medicamenti vim augendi, vel minuendi propria methodus. 182.2.m.
- Cautistici medicamenti ad mouendi præcautiones ac modus. 183.1.p.
- Cautistici applicationẽ praua interdũ sint omata & nõnunquã mors cõsequitur. 183.2.p.
- Cautistico medicamento admoto quã in circumambitu vulneris admouenda. 215.2.p.
- Cauterio potentiali, quibus casibus vt liceat. 183.1.f.
- (dilatanda. 110.2.m.)
- Cauterio teui auri, quando cutis puncturã Cauterij actualis & potentialis, cum venæ cisione, & alius solutione cõparatio. 183.2.p.
- Cauteriorum varia applicatio pro coxendi cum dolore. 98.1.p.
- Cauterium in vertebri colli insigniter cõuulsiõni ex plenitudine confert. 108.2.f.
- Cerebri membrana iam detecta: eius situs & motus considerãdus, & quale indicium ex hoc sumatur. 71.2.f.
- Cerebri membrana submissa, & motu per quindẽ dies expertem auctor vidit ægro euadente. 71.2.f.
- Cerebri membrana iam detecta lac mulieris filia lactãtis intra vulnus emulgẽdũ. 70.1.f.
- Cerebri perforatiõe iam detecta membrana, medicus vt in omnibus circumspectus sit oportet. 70.1.f.
- (dulla est. 17.2.m.)
- Cerebri habitantia non proprie, sed large me Cerebrum nec sentit, nec vere mouet. 101.1.p.
- Chiaotheca qualis & quando in manu inualida gestanda. 122.1.f.
- Cibus vulneratis sensum augendus. 165.1.m.
- Cicatricibus fœdis vultus auferendis vel multũ minuẽdis medicamẽta experta. 210.2.p.
- Cynabaris duplex species. 184.2.p.
- Clister ex regulari cura, sanguinis misionem præcedere debet. 104.1.m.
- Clisteres vulneratis vtre iniiciendũ. 168.1.m.
- Cogitativa & rationalis virtus. 17.1.m.
- Columela prorsus abscissa, quã nõcumenta sequantur. 206.2.f.
- (1.m.)
- Columelã laxatã medicamẽta experta. 207.
- Columelã duplicem, quidam a natiuitate habens curatus fuit. 27.2.m.
- Commune oleum ferme factum puncturã nerui quando competat. 110.2.m.
- Composita medicamenta: quã facultatem agglutinandi habeant. 128.1.m.
- Conciliatio sententię auctoris cum Galeni serie. 160.2.p.
- Conciliatori cum non ardeat sententiã philosophi in prohibẽdo cauterio emũtorij: in explicatiõe aliena machinã. 246.2.m.
- Couciliatoris opinio circa temperaturam ægenti viui confutatur. 141.2.p.
- Confectio syrupi Sancti Ambrosij. 175.1.m.
- Confirmata siccitas, insanabilis. 49.1.p.
- Contenta partes capitis. 16.2.p.
- Contusio in vulnere, immediatam agglutinationem prohibet. 154.1.m.
- Contusionis ingetis in toto capite cuiusdam pueri curatio. 76.1.p.
- Contusa neruorũ vulneris ab incisio triplici discrimen. 118.2.f.
- Contusio si contigerit citra vulnus exterius, quo pacto curanda. 114.2.p.
- Conuulsio triplex. 108.2.p.
- Conuulsio quibus arcenda. 108.1.f.
- Conuulsio ex inanitione, a quibus oriatur causis. 108.2.m.
- Conuulsio ex inanitione lethalis. 108.2.m.
- Conuulsioni ex plenitudine pũdia. 108.2.m.
- Conuulsio ex vulnere quo pacto lethalis dicatur. 48.2.f.
- Cõuulsione iã orta, quibus succurratur. 108.2.p.
- Cornelij Celsi, asseuerantis, in neruorum inflammationibus, vltimam maturitatẽ esse expectandã taxatur. 124.1.m.
- Cornelius, qui videtur sententiã Galeni & si bi ipsi aduersari defenditur. 55.1.f.
- Coronalis futura. 16.1.p.
- Corruptã iam columelã incidendã methodus. 207.1.f.
- Corruptioni præputij, quando cauterium actuale admouendum. 204.1.m.
- Coxendicium dolori in radice agnis commodius fonticula cauterio aperiendũ, & modus cauterij. 199.1.f.
- Craneifutura a valida contusione interdum dehiscunt, absque fractura ipsius cranei. 201.1.f.

I N D E X.

- Cranei fracti foramē, quod trepanatione molitur, nec exiguum admodum, nec valde amplum.** 58.2.f.
- Cranei magna parte cōpressa, qñq; non licet totum compressum os eleuare.** 54.1.m.
- Cranei fractura penetrans, quādo ratiōne perforatur, quo rasio prius, quo postea, quo ultimo vtendum.** 70.1.m.
- Cranei quātitas, detegēdi mediocris.** 70.1.m.
- Cranei peculā iam fere prorsus tenebratam, quando liceat vsque in sequentē diem dimitti & ratio.** 71.2.p.
- Cranei trepanandi tempore, quo pacto medicus instrumentum affigere, & circumducere debeat.** 71.2.p.
- Cranei ossa, senu tenuiora ossibus iuuenū esse autore experientia iuuenit.** 71.2.f.
- Cranei trepanatio, in fractura penetranti citius in regione calida, aliās in frigida, atque citius in iuuenibus, quam in senibus molienda.** 66.2.m.
- Cranei fracturæ in trepanatione citius quam possibile sit operatio molienda.** 65.2.m.
- Cranei trepanatio cur tempore calido citius, quam hyemali moliat.** 67.1.m.
- Cranei trepanatio vbi oportet ex regulari cura infra triduum molienda decoacta vero tempus præfixum non est.** 67.1.m.
- Cranei à terebratione, quando desistendum, & quæ sunt signa.** 71.1.m.
- Cranei os quare non rupta cute sæpe frangatur.** 75.2.f.
- Cranei trepanationem medicus nō aggrediat, nisi prius cū calloso atq; exercitatisimo chirurgo diu versetur.** 71.2.m.
- Cranei trepanationis tpe oportet extremitates deuinci atque constringi & rō.** 64.2.f.
- Craneo integro venula interdum rumpitur, inter cerebri membranā.** 20.1.f.
- Craneo facto perforādo qñ ciclypsicis seu scalpris rasio, qñ vero abatisa, seu terebella, vel trepano immerfili vtendū.** 54.2.m.
- Craneo perforato & mēbrana detecta interdum accidit pus, etiam si subeat egredi nō posse & ratio.** 67.2.f.
- Craneum abique vulnere cutis fragi potest.** 20.1.m.
- Craneum inter terebrandum, oportet infundilac muliebre, vel terebellam ingelidam vicissim immitti.** 71.1.m.
- Craneum cum raditur, oportet aures infirmigospio obturari & ratio.** 64.2.f.
- Cruri vulnerato, capsula admouenda & eius vtilitas.** 107.1.f.
- Cucurbita frustum, quando & qualiter vulnerebus capitis super imponendum & quot ex eo sequantur iuuamenta & in hoc vulgi deceptio.** 73.1.f.
- Cucurbitula puncturæ nervi affixa vulneris icorem extrahit vel hyrudo.** 110.2.m.
- Curatio mēbri ob nimium callū supercrecētem imbecillis.** 121.2.m.
- Curatio quanto intermisso tempore sit iterā da in pectore vulneratis.** 134.2.m.
- Curationi vulneris vētris penetrātis scopi obseruandi atque dubia.** 54.2.m.
- Cutis capitis solidior est, quam in cæteris corporis partibus & in hoc vtilitas.** 14.1.f.
- Cutis præputij altera parte rupta glandeque ibi egrediente, quæ sequantur in commoda eiusque curatio.** 210.1.f.

D.

- D**eceptio chyrgorum quorūdam in ratione fracturæ cranei. 14.2.m.
- Deligatura duorum initiorum tantū absque sutura & sibilis vulnus per longitudinem inflictum agglutinatur.** 117.2.f.
- Differentiæ quinque inter cerebri & aliorū ossium medullam.** 17.2.f.
- Digerentia & pus concitantia quando fugienda.** 116.1.p.
- Dyni Florentini error in Auicennæ interpretatione.** 28.1.f.
- Dolore vrgente ex vulnere neruorum turunda olei tantillo intingenda.** 116.2.f.
- Dolore vrgente laxiori deligatura vtendum.** 115.2.p.
- Dolor cur corrupte laxdere dicatur.** 101.2.p.
- Dolor tæuior reliquis synthomatib⁹.** 101.2.p.
- Dolor quandoque imaginari cogit, quod nō est.** 101.2.m.
- Dolor quo pacto neruos lædat, an ablatis minute an corrupte.** 101.1.m.
- Dolor quibus præfidijs mitescat.** 104.2.m.
- Dolor dentium, quare euulso dente sedetur, quandoquidem dens ossis particula cum sit est expers sensus.** 74.2.m.
- Dubia quædam satis aduertenda.** 210.1.f.
- Duplex principium Althoin, vel antracis.** 244.1.f.
- Dura membrana & tenuis mēbrana.** 16.2.p.
- Durissima ossa punctuli instar in temporibus.** 161.1.f.

E.

- E**dem sex res nō naturales, qualiter in res naturales & præter naturam mutari possint. 232.1.p.
- Egritudine non solum cum magna est compedit sanguinis missio, sed cum suspicabitur vehemens.** 103.2.m.
- Emplastrum figuræ coronariæ aduersus plures affectiones vtiliter admouendū & qualiter.** 220.1.p.
- Emplastrum in fine curationis vulnerebus capitis**

I N D E X.

pitis ad eius confortationem. 88. 2. f.
 Emundantibus atque sarcoticis medicamen-
 tis, quando vti liceat. 141. 1. f.
 Emuntoria quo medicamento vnguenda &
 quare. 167. 1. m.
 Error quorundam chirurgorum, qui abdo-
 mine duntaxat in superficie vulnerato lon-
 ge diuagari esse vulnus existimant. 155. 2. f.
 Ethici consumpti quare non couellantur cū
 summa siccitate laborēt in quo Galeni opi-
 nio defenditur. 44. 1. m.
 Euzucatio corporis supurata iam inflamma-
 tione eius integram supurationem demo-
 stratur & quare. 124. 1. f.
 Euforbij vires, quandiu durent, & discrimen
 ipsius veteris & recentis. 127. 2. f.
 Exercitij tempus, qñ commodius. 233. 1. f.
 Exercitatio temperata, quā adiuuamenta af-
 ferat. 233. 1. p.
 Exercitatione nequeuntibus vti, quid loco
 eius iniungendum. 233. 1. m.
 Expositiones quorundā authorum super tex-
 tum Auicennæ præcipientis apponere re-
 percussu sua super antrace venenoso taxan-
 tur. 242. 2. f.

F.

Facocti instrumenti in fractura cranei v-
 sus, qualis esse debeat: & ibi locus Ga-
 leni explicatus. 74. 1. p.
 Fames apud Galenum pro qualibet corporis
 imbecillitate vsurpatur. 54. 2. f.
 Phantasia virtus imaginatiua virtus. 17. 1. p.
 Pharmacū præcisum, quo alius, ducenda, &
 certa ei⁹ quātitas p̄scribi nō pōt. 104. 1. m.
 Febrem conuulsioni superuenire melius est,
 quam febri conuulsionem & rō. 44. 1. m.
 Felis percussione signa. 156. 1. f.
 Figura spherica capitis, non nisi in puncto tā-
 gi potest. 21. 1.
 Fibularum sutura quando, & qua methodo
 molienda. 114. 1. f.
 Filo ad suenda vulnera, vel serico, vel cerato
 vtendum. 115. 1. m.
 Flatum intestinorum extrahēdi noua inuen-
 tio. 166. 2. m.
 Foramen vlcis pallati osse ablato licet ad-
 modum difficile agglutinetur tamen au-
 thor iam ipsum vidit agglutinari, & qua
 methodo. 206. 1. f.
 Fracturam cranei penetrantem absque ratiōe
 & perforatione osis: solis medicamentis
 esse curandā quidam asseuerauerūt. 52. 2. p.
 Fracturam cranei, genera rhogmæ ecope, Er-
 pectina engisoma, camarosis & quales sint.
 14. 1. m.
 Frigidum inimicum nervis. 108. 1. p.
 Frigidum non ingredi, opus naturæ, quomo-

do intelligendum. 47. 2. m.
 Fugienti sunt, tanquam pestis vulgares homi-
 nes & vetula luxatoria artem temerē exer-
 centes. 121. 1. f.

G.

Galeni locus, qui videtur authores fen-
 tentiæ in sutura neruorum aduersa-
 ri declaratur. 113. 2. f.
 Galeni contextus duo, qui videntur oppositi
 conciliantur. 125. 2. m.
 Galeni exemplū ex duobus eodem loco fau-
 ciatis, quorum eodem medicamento alter
 sanitati fuit restitutus, alter vero non, & ra-
 tio. 127. 1. p.
 Gariophilos, pro gariophilata herba perpe-
 ram scribi. 142. 2. m.
 Gentiles etiam ad corporis medendum mor-
 bum animam prius esse curandam faten-
 tur. 236. 2. m.
 Guidonis textus ambigui circa cerebri tem-
 peraturam declaratio. 172. 2. m.
 Guidonis in Guilielmum sub obscura repre-
 hensio declaratur. 341. p.
 Guidonis series in octauo documento in vul-
 neribus capitis trepanādis absurde legitur
 in perforatione osis in hyeme diem quar-
 tā, æstate septimā esse expectandā. 65. 1. m.
 Guilielmi & aliorum præceptum in fractura
 cranei cum caput pertunditur satis irriden-
 dum. 64. 1. m.
 Guilielmi opinio in consuendis neruis taxa-
 tur. 112. 2. p.

H.

Homo non solum inter reliqua animā
 tia, est naturæ erectæ sed etiam pi-
 scis quidam qui cœli speculator nū-
 cupatur. 13. 2. p. (1. p.)
 Hominis fabrica tribus ventribus constat. 133.
 Hepatis percussione notæ. 156. 1. m.
 Herbarū varietas ad balneum illorum qui pustu-
 lis antiquis crustum laborant. 200. 2. f.
 Hypocrates laborum finem & vtilitatē mor-
 tem nuncupauit. 47. 1. p.
 Hypocratis series explicatur, qui visus est præ-
 cipere viscera reliqua vino madefacienda
 nisi in articulis. 115. 2. m.
 Hypocratis locus de internis affectionibus, li-
 bro vbi sibi ipsi aduersari videtur declara-
 tio. 149. 2. f.
 Hypocratis sub dubio locus explicat. 151. 1. p.
 Hyrudines pustulis iam affixas, sanguineque
 repletas euellendi methodus. 200. 2. m.
 Historia in consuendis neruis satis aduertenda.
 113. 2. p.
 Historia qua narratur, quo pacto ferramenta
 capitalia, quæ author olim condiderat, nō
 solum per nostras regiones, sed per cate-

INDEXE X.

- ras etiam diuulgata fuere. 60.1.p.
- I** Coris extractio à punctura nerui quibus comparetur. 110.2.p.
- Indicia quibus dignoscatur an medicamēta agri & membri temperaturæ conueniant. 127.1.m.
- Indicia à pro cathartici siue externis causis quāsumenda, quando vero non. 130.2.m.
- Indicia puris contenti, interius in vulneribus thoracis. 140.1.m.
- Intestinatorum vulneratorum consuendi atq; medendi methodus. 164.1.f.
- Intestinatorum crassorum vulnera sæpē sanabilia. 154.1.f.
- Intestinatorum tenuiorum vulnera lethalia. 157.1.m.
- Instillatio proficua atque puluis ad vulnera agglutinanda. 85.1.m.
- Instillatio proficua ad concitandum in morbo gallico sudorem. 175.1.f.
- Instrumentum quo referatio pectoris molienda. 150.1.f.
- Instrumentorum effigies, quibus lauacrum inuasitatem pectoris vulnerati iniiciuntur. 153.2.m.
- Iuuenes, & senes æqualiter vulnerati lethali vulnere, citius iuuenes quam senes moriuntur, & ratio. 66.2.f.
- L.
- L** Acunæ locus in cerebro ubi reperitur. 16.2.f.
- Lateralia seu parietalia ossa. 16.1.p.
- Lethalia synthomata vulneribus capitis euenientia quare in morbi gallici vlcereb⁹ officario & membrana interdum detecta, vel prorsus deficiant, vel citra mortis discrimē sæpius eueniant. 186.1.m.
- Lexiuium tumoribus scirrhis & edemathosis proficuum. 221.1.p.
- Licm & iecur in quibusdam animalibus interdum mutāt locum, nam licm in parte dextra iecur in leuare peritur. 15.2.p.
- Ligamentum exterius tuto futuram tolerat, & quare. 94.1.m.
- Ligni indicii decoctum sumētibus interdum circiter vigesimum diem synthomata augescunt: & quod inde sumatur præfagiū. 179.2.f.
- Ligni iudicii, decoctum sumendi methodus. 180.1.m.
- Ligni indicii decoctum fumentibus biscocti panis conficiendi methodus. 80.2.m.
- Ligni indicii decoctum pauperes fumentes loco biscocti panis, pane torrefacto vescantur. 180.2.m.
- Ligni indicii decoctum fumentibus cibis augendus vel minuendus pro virtutis robore & imbecillitate est. 181.1.p.
- Ligni indicii decoctum renuentibus suis legibus, quid expediat. 181.2.p.
- Ligni indicii decoctum fumentibus si sudor differatur, quibus ciendus. 182.1.m.
- Ligni indicii in vino decoctio, quibus naturis, ætatibus, & regionibus & temporibus interdum conueniat. 182.1.m.
- Ligni indicii temperatura: varia quorundam placita. 178.1.p.
- Ligni indicii temperaturæ authoris opinio. 178.1.m.
- Ligni indicii eligendi notæ.
- Ligni indicii decoctum fumentibus varia victus ratio iniungenda. 174.1.m.
- Ligni indicii decocto sumēdo quas herbas interdum commisceri liceat. 174.2.p.
- Ligni sancti aceti descriptio. 218.2.p.
- Ligni indicii olei descriptio. 218.2.m.
- Ligni sancti decoctum fumentibus tempus veris vel autūmi cōmodius & rō. 174.1.p.
- Ligni sancti decoctum ante vlcera mūdificationē nullo mō exhibendum. 174.2.p.
- Lignum indicii qualiter ex accidenti possit limeteram tēperaturā excedere. 178.1.f.
- Ligna non in plenilunio, nec in augmento lunæ, sed i decremento ipsius rescēda. 57.2.f.
- Linamentū fortē in paruo vulnere iuxta spinalē medullam causa mortis fuit. 137.2.m.
- Locus autoritate, negatiuē non procedit. 113.2.m.
- Luna ex se ipsa nec augmentum decrementū recipit. 56.2.f.
- M.
- M** Amillares caruncula, & earum situs atque à cerebri substantia differentia. 16.2.f.
- Maris alterius trepani solidi atque etiam fœminæ effigies & eorum vsus. 63.1.p.
- Meatu urinario penis iam corrupto inde lotio egrediente curandi methodus. 210.1.p.
- Medicamenta secundum vulnere mutatio nes varianda. 104.1.m.
- Medicamenta ad sanguinis profluxionem à vulneribus compescenda. 54.2.m.
- Medicamenta post primam vulnere curationem, vulneribus quæ secunda intentio ne curantur secundum varias temperaturas adaptanda. 85.1.f.
- Medicamenta in circumambitu vulneris adaptanda. 85.1.f.
- Medicamenta ad conuulsionem prohibendam vulneribus capitis sæpius peculiarem. 85.2.f.
- Medicamenta aduersus tensionem conuulsivam membranarum cerebri. 86.1.p.
- Medi-

I N D E X

- Medicamenta Flatum intestinorū discutientia. 166.2.m.
 Medicamenta vulneribus capitis desuper ad mouenda nempe post admota linamenta interius. 86.2.f.
 Medicamenta aduersus contusionem capitis absque fractura cranei & absque vulnere exteriori. 88.1.m.
 Medicamenta vulnerato venter exterior ad mouenda. 168.2.p.
 Medicamenta pus emundantia. 124.2.f.
 Medicamenta ad inflammationes neruorū. 130.1.f.
 Medicamenta aduersus sanguinis profusionem. 130.2.m.
 Medicamenta ad corroborandam enervatam particulam atque prohibendam neruorum putrefactionem & discutendum abscessus tumores. 135.2.f.
 Medicamenta pus attrahentia. 141.2.m.
 Medicamenta repellentia admouenda. 197.1.m.
 Medicamenta, quæ conferunt membro restaurando post vulneris coalescentiam. 131.1.m.
 Medicamenta vulnere pectoris eiusque circūferentijs admouenda. 138.2.m.
 Medicamenta ore sumpta multum profunt vlcibus pectoris penetrantibus. 137.1.m.
 Medicamentorum copia ad curationem vulnere capitis cū fractura cranei in antydata rio inuenietur. 70.2.f.
 Medicamentorum qualitatis gradus vt corresponsdeant vulneratæ particulæ oportet. 104.1.f.
 Medicamento Galeni ad sanguinis profusionem sistendam in humidis corporibus plus thuris in siccis vero plus aloes commiscendum. 84.2.f.
 Medicamentorum vis secundum varia subiecta intendi vel remitti potest. 143.2.f.
 Medicamentum ad confortationem duræ membranæ cerebri tensione eius iam remota. 86.1.f.
 Medicamentum membranæ cerebri nudæ post ossis perforationem adaptandū. 86.1.f.
 Medicamentum ad carnis productionem in membrana cerebri. 86.2.p.
 Medicamentum ad carnem producendum super duram cerebri membranam in temperaturis humidis. 86.2.m.
 Medicamentum ad carnem producenda in temperaturis medicoribus. 86.2.p.
 Medicamentum ad diuiscendum in magna contusione capitis absque vulnere, an ossis fractum an non. 88.1.m.
 Medicamentum ad lateralia vulnera capitis à telo incisivo inflata glutinanda. 88.2.m.
 Medicamentum, quo antiquæ pustulæ crurium vngenda. 201.p.
 Medicamentum apponendum in ambitu vulneris in pectore vulneratis. 140.2.f.
 Medicina quæ fortis debilis: & quæ debilis fortis dicitur. 234.m.
 Medicum oportet dextro oculo virtutem, sinistro vero agnitū inspiciere. 174.1.f.
 Medicus naturæ & medicamentorum differentias cognoscere tenetur. 126.2.f.
 Mel cibi & medicamenti, vires in vlcibus pectoris fortitur. 142.2.f.
 Membra post vulneris coalescentiam bifaria imbecilla manent. 121.2.p.
 Membra à vulnere aut paralesi inuolida cur minime corruptantur. 122.2.m.
 Membri debilis ob inflammationes neruorum præcedentes suppuratas curatio. 122.2.p.
 Membri nutritiis vulneratis victus ratione atque medicamenta oportet membri temperatam afferuare, & quo pacto. 165.1.p.
 Membro organico in homine proptus amputato eius consolidatio est impossibilis, & ratio. 120.1.m.
 Menstrua à mense nomen claturam accipit. 83.2.f.
 Menstruans mulier, quo pacto vulnera inficere potest. 84.1.m.
 Menstruas mulier speculum maculat & quo pacto. 84.1.f.
 Menstratē mulierem non oportet pannos nec linamenta vulneribus adaptanda tetigisse. 84.2.m.
 Menstruantes mulieres, procul à vulneratis iniicienda. 84.2.p.
 Menstrui generationis & expulsiōis causa. 83.2.p.
 Menstruo infectam mulierem solo aspectu infecisse vulnus experimento visum & ratio. 84.1.m.
 Menstruus sanguis à canibus degustatus eosdem agit in rabiem & multa alia incommoda ex eo sequuta. 84.1.p.
 Methodus operandi cum ratorijs in fractura cranei penetranti. 70.1.p.
 Methodus operandi abatiila seu modiolotrepiano & in quibus fracturis. 71.1.p.
 Methodus, qua in morbo gallico vox & loquela forato pallato deturpatæ ad tempus refarciuntur. 206.2.m.
 Myrtus licet fugillationibus, & contusionibus à Galeno prohibeatur non tamen absolute intelligendum. 77.2.m.
 Modiolus duo varia instrumenta significat, & qualia. 60.1.m.
 Modus ampliandi vulneris, abdominis alijs non conducentibus. 166.2.f.

INDEX

- Modus operandi in curatione vulneris capitis per medicamentum iam dura cerebri membrana detecta.** 70.2.p.
- Morbi gallici vlceribus, quæ medicamenta topica adhibenda.** 182.2.p.
- Morbi gallici varia notæ.** 173.1.p.
- Morbi gallici specierum diuinitio.** 173.1.f.
- Morbi gallici prima species.** 173.2.f.
- Morbi gallici secunda species.** 173.1.f.
- Morbi gallici tertia species quæ sit.** 173.2.p.
- Morbi gallici quarta species.** 173.2.p.
- Morbi gallici in curatione.** Nicholai Leniceni opinio laudatur. 174.1.m.
- Morbi gallici primæ speciei curationis tribus scopis adimplenda.** 174.2.m.
- Morbi gallici varij authores suis monumentis mentionem fecere.** 170.1.m.
- Morbi gallici mentagæ seu pudendagæ duplex descriptio.** 130.2.p.
- Morbi gallici originis duplex habenda consideratio.** 170.2.f.
- Morbi gallici originis perferenda industria satis laudanda & historia.** 171.1.f.
- Morbi gallici causa duplex.** 172.1.m.
- Morbi gallici infectio, variæ humana corpora inuadere solet.** 172.2.m.
- Morbi gallici tonsillarum adauctæ caro, quæ & qualiter incidenda.** 205.2.m.
- Morbi gallici tonsillarum adauctæ carne iam dempta sanguinis profusione forsan superuenienti cucurbitula cum scarificatione & trocollum affixa prodest.** 205.2.m.
- Morbi gallici tubercula cur sæpe doloris expertia.** 210.2.m.
- Morbo gallico confirmatio curando variæ indicationes pro ætatis & temperaturæ discrimine adhibenda.** 212.2.m.
- Morbi gallici pustulis crura occupantibus vtrum Eyrudines admota iuuamento sint.** 144.2.m.
- Morbi gallici pustulas habentes, quibus hyrudines sunt affingendæ non in ribulo ubi ipsæ degunt imitædi & rō.** 200.2.m.
- Morbi gallici pustulis antiquis hyrudines eligendi & applicandi methodus.** 144.2.f.
- Morbi gallici hemibraneæ suffusus vitilis.** 222.2.p.
- Morbi gallici cithosis tuberculis varia medicandi methodus.** 186.2.f.
- Morbi gallici ossa capitis cariōsa non, vt alia cauterizanda & ratio.** 187.1.m.
- Morbi gallici vlceribus iam mundis, quæ sarcotica applicanda.** 215.2.f.
- Morbi gallici cithosis tuberculis emolendis ac discutendis medicamentum ex gummis.** 217.2.f.
- Morbi gallici tuberculis cithosis emolendis ac discutendis vnguentum de ligno indol.** 218.2.f.
- Morbi gallici scabiei vnguentum proficuum.** 219.1.f.
- Morbi gallici vlceribus iam prorsus mundis sarcotica medicamenta.** 214.1.f.
- Morbi gallici vlceribus & tumoribus tybiarum quæ medicamenta conferant.** 221.1.f.
- Morbi gallici vlceribus diu manantibus iam clausis fonticulam in parte innobili illis correspondenti referare oportet & ratio.** 203.2.f.
- Morbi gallici alopetiæ, quæ expediant medicamenta.** 204.1.f.
- Morbi gallici vlceribus optimum potentiale medicamentum.** 215.1.m.
- Morbi gallici tubercula in capite habentibus pileum cereum qualiter & quando superponendum.** 214.1.f.
- Morbi gallici alopetiæ, humorum discrimen quo pacto dignoscatur.** 204.1.m.
- Morbi gallici vlceribus epulotica medicamenta.** 214.2.p.
- Morbi gallici cuiuslibet materiei euacuande varia simplicia atque composita medicamenta accommodata.** 214.1.f.
- Morbi natura incognita medicus tenetur ipsum morbum curatione alterius sibi similis curare.** 188.2.p.
- Morbis extremis, extrema remedia optima.** 111.1.m.
- Morbo gallico laborantibus, quando vena secanda.** 174.2.f.
- Morbo gallico laborantibus sanguinis missione prohibentium medicorum opinio taxatur & ratio.** 173.2.m.
- Morbo gallico primæ speciei exercitatio vitilis.** 175.1.f.
- Morbo gallico primæ speciei topica medicamenta.** 175.2.p.
- Morbo gallico infecti, solo osculo alios inficiebant.** 170.2.p.
- Morbo gallico correptis temperatura biliosis sirupus exhibendus.** 211.2.f.
- Morbo gallico infectis atrabiliosa temperatura sirupus.** 212.1.p.
- Morbo gallico laborantibus illinitio Mercurij iam suscepta: quæ medicamenta gingibas firmet, ac dentes dealbent.** 222.2.m.
- Morbo gallico laborantibus: quando in linimentis argentum viuum adungere vel minuere licet.** 212.2.m.
- Morbo gallico argentum viuum pro futuro qualiter inuentum.** 188.1.f.
- Morbo gallico laborantibus post finitionem argenti viui suffusus ore recipiendus.** 218.2.f.
- Morbo gallico sirupi solutui descriptio, qui absque linimento mercurij nescit.** 221.2.f.
- Morbo

INDEX.

- Morbo gallico laborantes si oris vel gutta-
ris viscera habeant argenti viui vnctiones
infestissima: sed decoctum ligni indici eis
exhibendum & ratio. 147.1.p.
- Morbo gallico laborantibus atque illitis nō
statim gingiuis tumescentibus medicamē-
ta repellentia admouenda. 197.1.m.
- Morbo gallico vomitoria atq; suffusus vtilia.
203.1.f.
- Morbo gallico omnes morborū species com-
plicari possunt. 204.1.p.
- Morbo gallico laborantes, argentum viuū
timentes, quomō sint decipiendi. 215.2.m.
- Morbum gallicum à principio omnes eodē
modo medicantiū opinio taxatur. 173.1.p.
- Morbum gallicum antiquissimā habere ori-
ginem contra vulgi opinionē author pro-
bat. 164.2.f.
- Morbus gallicus quare à multis mentagra vo-
catur. 170.2.p.
- Morbus gallicus qua ratione vt plurimū pu-
denda prius inuadat. 170.2.m.
- Morbus gallicus antiquissimus cum sit qua-
re à multis recens nuncupetur. 170.2.m.
- Mortis stupenda Homeri occasio. 334.1.m.
- Mulieres vnica tantum suturam interdum
habent. 15.1.f.
- N.
- N**aso prorsus præciso ex brachio aliū
constituunt. 120.1.f.
- Natura particulæ, quo fieri possit in
curatione semper obseruanda. 114.1.m.
- Natura semper membra nutrire, & incorru-
pta conseruare conatur. 123.1.f.
- Natura sæpe expellit materiam in cauitate
thoracis contentam, & quibus vijs. 136.2.f.
- Naturæ imbecillitas duplex. 147.2.f.
- Nerui puncturæ nota. 109.2.p.
- Nerui puncturæ curationis scopi. 109.2.p.
- Nerui puncturæ consolidatiā minime appli-
canda. 104.2.f.
- Nerui puncturæ rosaceum oleum, vel myrti-
num fugiendum. 104.2.f.
- Nerui puncturæ oleum qñ competat. 110.1.p.
- Nerui puncturæ & sanguinis pro fluuio simul
eidem membro venientibus quibus suc-
curratur. 112.1.m.
- Nerui vel tendines incisi an conuendi sint.
112.1.p.
- Nerui & tendines, sub feminalibus partibus
censentur. 112.1.m.
- Nerui fugiendo rem lædentem versus princi-
pium suum videlicet cerebrum contrahunt
vnde conuulsio, & deliria insurgunt.
101.1.m.
- Nerui sensorij ac motiui omnes immediate à
cerebro: & ab spinali medulla mediate o-
riuntur. 94.1.f.
- Nerui ex medullari spina vel triuuli ex flu-
mine protendunt, ipsa vero à cerebro ve-
lut à fonte. 91.1.f.
- Nerui incisi extra vulnus prolapsi curatio.
118.2.p.
- Nerui descriptio. 84.1.m.
- Nerui an à cerebro an à corde originem con-
trahant & varia in hoc authorum opinio-
nes eorumque conciliatio. 40.1.f.
- Neruis in parte extrinseca membri incisis
quare flexio amittatur, intrinseca vero ex
tensio & ratio. 99.2.m.
- Neruis conuendis quæ obseruanda. 114.2.f.
- Neruis nudatis, quæ pericula impendant.
118.1.f.
- Nerui inter reliqua organicum membrū cō-
stituentia motus & sensus principii. 90.1.p.
- Neruo tantum puncto acui in pede cuiusdam
pueri ipse conuulsus perijt. 120.1.p.
- Neruo vel tendine per transuersum semī in-
cisis grauiora synthomata excitantur quā
neruis prorsus sectis. 117.1.m.
- Neruo per transuersum non prorsus incisso
vberius sanguis mittendus. 117.1.f.
- Neruo non ex toto per transuersum incisso
potissima curatio in eo prorsus amputan-
do consistit. 117.1.f.
- Neruo extra vulnus prolapsio incisso, qua ra-
tione cauterio tangendus. 118.2.m.
- Neruos multifariam detegi, nudariq; contin-
git & curandi methodus. 118.1.m.
- Nerorum synthomatum nullum pernicio-
sius dolore. 48.2.f.
- Nerorum vulneribus copiosus, & assiduus
sudor superueniens futuræ conuulsionis
præsegiū, & ratio. 44.2.f.
- Nerorum vulnerum puncturæ excepta ea-
dem est cum alijs vulnerib; curatio. 113.1.p.
- Nerorum motiuorum ortus & ad quæ mē-
bra deligantur. 96.1.m.
- Nerorum tendinum & cordarū qualitem-
peraturæ. 46.2.f.
- Nerorum sensitiuorum septem paria ex an-
teriori cerebri parte orti ad quæ membra
delegantur. 94.1.f.
- Nerorum quare quidam sensitiui, quidā mo-
tui nuncupentur: cum nec sensitiuis mo-
tus nec motiuis sensus deficiat. 84.1.f.
- Nerorum originis duplex cōsideratio. 41.1.m.
- Nerorum nomē trifariā usurpatur. 43.2.m.
- Nerorum vno aut diuersis vtrum sensus &
motus ad membra ferantur. 41.2.f.
- Nerorum & cordarum vulnera maximē à
mollificantibus medicamentis offendun-
tur. 47.1.p.
- Nerorum vulnera omnia periculosa, sed præ-
cipuè

I N D E X.

- cipue punctura & quæ ad tus digitos prope articulos sunt inflicta. 48.1.p.
 Neruorum vulnera, quæ sunt salutis vel mortis causa aut occasio. 48.1.f.
 Neruorum vulneribus sex rerum non naturalium obseruatio bona prodest admodum & e contra. 48.2.p.
 Neruorum vlcere recrudescente si tumor occupat cum prauis synthomatibus malum. 48.2.m.
 Neruorum inflammationes à quibus causis proueniant & eorum notæ. 123.2.f.
 Neruorum inflammationi, nisi à vulnere distet minimè propriè repellentia conueniunt. 124.1.p.
 Neruorum abscessibus putrefacientia medicameuta satis incommoda. 24.1.p.
 Neruorum inflammatio si discuti non possit supuratorijs vtendum & nulla tunc corporis vacatione. 124.1.m.
 Neruorum inflammationibus iam apertis linamento non integri capitis, sed pene abscessi vtendum. 124.2.f.
 Nicolai Leonicensi opinio in morbi gallici curatione laudatur. 174.1.m.
 Nicolaus Florentinus reprehenditur qui perperam seriem Galeni intellexit. 154.3.m.
 Nocumentum maxima, quæ sequuntur ex alta cauterizatione & carnis euulsione in emuntorijs. 246.2.f.
 Nouum futuræ artificium ad præcidendum & simul consueudum neruum semi incisum. 117.2.m.
- O.
- Obedtio. 14.2.p.
 Oculos obcæcari in vulnere capitis rupta interna vena sub craneo cum prauis synthomatibus apud textum Cornelij qualiter intelligendum. 78.1.f.
 Olei roseti qualitas varia. 126.1.m.
 Oleum rosatum dolorem sedat atque ab humorum fluxione membrum tuetur. 124.1.m.
 Oleum rosatum vel amigdalinum post trepanationem autibus infundendum & rō. 72.1.m.
 Oleum lumbricorum neruosis inflammationibus optimum. 124.1.m.
 Oleum apparitij (quod vocant) qualiter & quando eo vtendum. 124.1.f.
 Oleum rosatum quantum sipticitatis sit pariceps ad aliquid tamen temperaturæ membris fictioris humens redditur. 65.1.p.
 Omnia alligandi & scindendi methodus. 162.2.m.
 Omento scisso quæ sequantur incommoda. 162.2.p.
 Omento alligato atque incisso an competat candens ferramentum ad mouere. 162.2.f.
 Omentum quando, & qua ratione incidere liceat. 164.1.m.
 Omentum extra vulnus prolapsum cum reducere nequimus vulnus ampliandum firringo tomæ instrumento, & eius duplex significatum. 160.2.m.
 Omentum & intestina euulnere foras prolapsa reducendi methodus. 160.2.f.
 Omne contusum in pus conuerti necessum esse non absolute intelligendum. 75.1.m.
 Ossa in pueris sæpe prima intentione agglutinantur. 112.2.f.
 Ossa commota, vel quomodolibet in vlcere alterata, si expulsiōni naturæ amittantur, idem præfagire prius oportet & rō. 74.2.f.
 Ossa sensus expertia, sed non vitæ sunt. 123.1.p.
 Ossa non vere sed similitudinari apostemantur. 185.2.m.
 Ossa in eis qui morbo gallico laborant sæpe carie afficiuntur carne pene illaesa & ratio. 185.2.m.
 Ossa capitis tamen detecta & rafa à natura expelluntur, cur non iidem alia ossa. 187.1.f.
 Ossibus cranei circa fracturam disgregatio compaginis futurarii interdum euenit cuiusque curatio. 82.1.m.
 Ossis flexionem non solum craneo, sed etiam alijs ossibus aut euenisse vidit. 80.2.p.
 Os aluararum duabus tabellis constat. 14.2.m.
 Os aluararum non continuū sed contiguum septem ossibus compactum. 15.1.p.
 Os aluararum quinque constat futuris tribus veris duabus mendosis. 15.1.p.
 Os coronale. 16.1.p.
 Os occipitis. 16.1.m.
 Os cranei quare & quomodo non rupta cutē sæpe frangitur. 75.2.f.
- P.
- Panni & linamenta, quæ à vulneribus auferuntur non oportet (vt quidam ferunt) vt à lunarijs radijs tangantur. 84.2.m.
 Panni & deligaturæ, cum à vulnere secunda curatione auferuntur: quibus ma defacienda. 115.2.m.
 Passilli neruis denudatis & corruptis per quæ vtilis. 131.1.m.
 Pauli opinio qualiter sententijs aliorum circa apothema aduerfetur. 14.1.f.
 Paulus & Albucasis falso arbitrantur in fractura cranei penetranti decimam quartam diem esse expectandam ætate, hñemē vero decimam. 65.1.f.
 Pectore vulnerato si parte neruosa septum transversum vulneretur lethale. 138.1.p.
 Pectore vulnerati, qualiter curari debeant, vt pus contentum foris prodeat. 134.2.f.
 Pectore vulnerati hinc inde moueri debent, vt pus facilius expellatur. 154.1.p.
- Pectore

I N D E X.

- Pectore vulnerato qñ oporteat agglutinatione post habita consilium in curatione mutare. 138.1.m.
- Pectoris vlcibus confectiones varix ad materiam extenuandam, & expellendam. 143.1.m.
- Pectoris penetratibus vlcibus, quæ lauacra symphone iniicienda. 143.2.p.
- Pectoris vlcus penetrans, cum curatur: ægri hinc inde concutiendi agitandi que sunt & qua ratione. 143.2.m.
- Pectoris internis vlcibus, methalica medicamenta, nec ore exhibenda, nec syphone intus iniicienda. 144.1.m.
- Pectoris versus partē anteriore mediastinū p tenditur ac bipartitur & ex eius ignoratiā quæ sequantur incommoda. 144.2.f.
- Pectoris vlcibus veram penetrationem à non vera distinguenda signa. 145.1.p.
- Pectoris vlcibus penetratibus, quando linamenta minuenda & quando prorsus auferenda. 145.1.m.
- Pectoris vlcibus, stiptica & exiccantia lauacra à doxtra ad mouenda. 145.1.f.
- Pectoris vlcibus victus rō, qua agglutinatione vulneris molitur, quo pacto instituenda. 145.2.p.
- Pectoris vlcibus laboratibus, cōfectio optima multis diebus exhibenda. 145.2.m.
- Pectoris vlcibus penetrantibus, quando blanda seu palatiua curatio ad mouenda. 145.2.m.
- Pectoris vlcibus piulca instrumentum puris attractum. 146.1.m.
- Pectoris vlcibus penetratibus cucurbitula sicca purum extrahenda iuuamento est. 146.1.m.
- Pectoris vlcibus penetrantibus, luctus alius amicti, vel cognati maxime iuuant. 146.1.p.
- Pectoris vlcibus penetrantibus, quæ sint refectionem seu contra apertionem prohibentia. 148.2.f.
- Pectoris contra apertionem, periculi præagium præcedere debet. 152.1.m.
- Pectoris vlcera penetrantia, non nūquam cura palatiua curauit author, qua in propria conuersa incolumis euasit æger. 146.1.f.
- Pectoris vlcibus penetrantibus, an vnquā contra aperire liceat an non. 147.1.p.
- Pectoris vlcibus penetrantibus, reformatio, seu contra apertio ad molienda non est nisi aliqua puris editione ab extra apparente. 148.1.m.
- Pectoris vulneri penetranti statim inflicto contra aperire non licet. 148.2.p.
- Pede cuiusdam adolescentis conto hastæ trās fixo, appposito lenisco siue contra ratiola vulnus transeūte brachia & gennæ extem plo quasi cōuulsa riguerunt, sed fasuola femo tu statim synthoma discessit. 100.1.p.
- Pennis incisio quando molitur, cauendum ne meatus vrinarius rumpatur. 210.1.f.
- Peri cranei substantia, eiusque vtilitates. 14.1.f.
- Peri cranei vulnera licet exigua periculosa, & qua ratione. 14.2.p.
- Peri cranei vlcibus emollientia medicamenta quam rarissime ad mouenda, & ratio. 14.2.p.
- Perfectio cuiusque potentix consistit, vt recte de obiecto iudicet. 101.2.p.
- Peste citius sanguineos & biliosos temperatū ræ corripit. 226.1.f.
- Peste iam cessante casus mirandus contingit. 229.1.f.
- Peste qua hora tempore calido, & qua frigido cibis sumendus. 230.2.f.
- Peste quo cibo principio prandij vtendum. 230.2.f.
- Peste iam laborates, quibus synthomatis corripiantur. 236.1.p.
- Pestem interdum vindicta Dei Optimi Maximi euenisse probatur. 236.2.f.
- Pestem fugiendam esse sacra pagina docet. 224.1.m.
- Pestilentem aerem suffitus rectificans. 228.1.p.
- Pestilentes bubones, non solum in emuntorijs, sed etiam in alijs corporis partibus innascuntur. 138.1.p.
- Pestilentibus inflammationibus potentiale cauterium ad mouentes taxantur. 247.1.m.
- Pestilentis aeris rectificandi methodus. 227.1.m.
- Pestilentis bubonis materiei ad exteriora attrahendæ methodus. 247.1.m.
- Pestilentis bubonis materiam fugentibus consilium optimum, vt in illa functione non le dantur. 247.1.f.
- Pestilentis bubonis attrahendæ materiei varia medicamenta. 248.1.p.
- Pestilentis bubonis principio simphitum, & scabiosa apud autores magni habentur. 248.1.m.
- Pestilentis bubonis materiei attrahendæ secundum temperaturarum discrimen medicamenta attrahentia sunt ad mouenda. 248.1.f.
- Pestilentis bubonis materiam iam attracta que medicamenta ipsam extinguūt. 248.2.m.
- Pestilentis bubonis materiam iam corruptā extrahendi methodus. 249.1.f.

I N D E X.

- Pestilentis bubonis** scara iam euulsa, quæ medicamenta vlcus emundet & abstergant & carnem alant. 248.2.f.
- Pestilentis seu venenosi althoin** quatuor curationis scopi. 245.2.f.
- Pestilentis bubonis** cur sanguinis detractio in curatione utilis. 237.1.p.
- Pestilentis bubonis** ex parte affecta vena secanda. 237.2.m.
- Pestilentis anni**, à morbifero discrimē. 227.1.p.
- Pestilenti buboni** an teriacale, aliquod medicamentum super imponi liceat. 247.2.p.
- Pestilenti buboni** theriacam cōspicuo exemplo conuenire probatur. 247.2.f.
- Pestilenti buboni** quando cauterium admo- uendum. 248.2.p.
- Pestilenti bubone** iam corrupto cauterio ad- moto quæ medicamenta crustam euellat. 248.2.m.
- Pestilenti tempore**, varia cūbaria in eadem mensa fugienda. 231.1.p.
- Pestilenti bubone & pleuride** idem latus oc- cupantibus qua parte vena secanda ex qua etiam si in varijs lateribus. 238.1.f.
- Pestilenti bubone** iam apparente, & vena se- cta sudor qualiter ciendus. 242.1.f.
- Pestilenti buboni** repercussui nullo modo admo- uenda vbi textus Auicennæ explicat prima fronte contrariū tenentis. 243.2.f.
- Pestilenti bubone** iam apparente quot scopi in curatione obseruandi. 237.1.p.
- Pestilenti inflammatione** laborantes à fom- no excitandi. 237.1.m.
- Pestilens bubo**. 245.2.f. (2.f.)
- Pestis causa duplex**, superior & inferior. 225.
- Pestis superior causa duplex**. 225.2.f.
- Pestis inferior causa** multiplex. 225.2.f.
- Pestis futura nota**. 226.1.f.
- Pestis iam infestantis signa**. 226.2.m.
- Pestis aerem**, quam cibum mutari salubrius. 227.1.f.
- Pestis tempore** impunditiæ omnes longe ab oppidis iniicienda. 227.2.p.
- Pestis tempore**, quæ herbæ & arborum rami viciatim comburendi. 227.2.p.
- Pestis tempore**, quibus domus irriganda, & quo tempore. 227.2.m.
- Pestis tempore**, quæ odoranda. 227.2.f.
- Pestis tempore** acetum magnam vim aduer- sus omne venenum habet. 227.2.f.
- Pestis tpe** domibus quæ spargenda. 228.1.p.
- Pestis tempore** pomi collo suspendendi de- scriptio. 228.1.m.
- Pestis tempore**, quibus manus & facies abluē- da. 228.1.f.
- Pestis tempore** quæ vniuersaliter gerenda. 228.1.f.
- Pestis tempore** fenestæ versus quā regionē aperienda & quanto tempore. 228.2.p.
- Pestis tempore**, maritima loca & montana sa- lubriora. 228.2.m.
- Pestis tēpore**, quæ loca fugienda. 228.2.m.
- Pestis tempore** cito longe, tardeq; redire ope- repetitum est. 228.2.f.
- Pestis tempore** in omnibus ratio victus ob- seruanda. 224.2.p.
- Pestis tempore** ante appetentiam ventriculi cibis non sumendus. 229.2.p.
- Pestis tempore** malo cibo diu affuetos nō su- bito sed paulatim eos mutare oportet. 224.2.m.
- Pestis tempore**, qualiter calido tēpore & qua- liter frigido cibi edendi. 224.2.m.
- Pestis tempore** calido, quæ odora cibis com- miscēda & quæ tempore frigido. 229.2.m.
- Pestis tempore** cibaria eligenda. 224.2.f.
- Pestis tēpore**, quæ aqua laudabilior. 224.2.f.
- Pestis tempore**, initiāte morbo plurima aqua semel hausta confert. 230.1.p.
- Pestis tēpore**, quale vinū bibendum. 230.1.p.
- Pestis tēpore**, quæ carnes eligenda. 230.1.m.
- Pestis tpe**, quæ cibaria omittenda. 230.1.m.
- Pestis tempore**, saxatiles pisces, & alia arden- da. 230.1.f.
- Pestis tempore**, aromata calida & condumen- ta ipsis confecta dimittenda. 230.1.f.
- Pestis tempore** quibus & quando alia & ce- pæ no cumento sint. 230.2.p.
- Pestis tempore** cibis medicinalis, theriaca- trium rerum dicitur. 230.2.p.
- Pestis tempore**, famem & sitim tolerare qui- bus infestissimum. 230.2.m.
- Pestis tempore**, à mensa surgere eum aliquan- tula orexi quam saturus commodius esse. 231.1.m.
- Pestis tempore**, secundum varia loca inflam- mata ita variè secanda vena. 237.2.f.
- Pestis tempore** scopi in sanguinis missiōe ob- seruandi. 238.1.m.
- Pestis tempore** an pharmacum effrene com- petatur an non. 238.2.p.
- Pestis tempore**, ad euacuationem venenosa- materiæ humorum concoctio non expe- ctanda. 234.1.f.
- Pestis tempore** pharmaco exhibēdo semper aliquid commiscendum, quod resistendi veneno vim habeat. 239.1.f.
- Pestis tempore** ad cordis confortationem & veneni resistentiā varia medicamenta the- riacalia. 234.2.p.
- Pestis tempore** theriaca oui nuncupata, qua- liter tempore calido & frigido exhibenda de eiusdemque temporis conseruatione. 240.2.m.

Pestis

I N D E X.

- Pestis tempore, salua imperialis nisi transactis tribus mensibus non est exhibenda, & qualiter conseruanda. 241.1.m.
- Pestis tempore theaeacalis confectio Guidonis magni habetur. 241.1.m.
- Pestis tempore theriacalimonum exhibenda descriptio. 241.2.f.
- Pestis tempore nec alio tpe cibis, nō nisi post naturalem appetentiam sumendus. 231.1.f.
- Pestis tempore & alio quouis omnis saturatio mala, pessimo vero panis. 231.1.f.
- Pestis tempore, si alius non correspondeant, quibus cienda. 231.1.f.
- Pestis tempore noctu domi manendum, & a radijs lunaribus cauendum. 233.2.p.
- Pestis tempore in solis celtu domi quiescendum. 233.2.p.
- Pestis tempore ante ortum solis minimē a leto surgendum. 233.2.m.
- Pestis tempore, quibus animus mulcendus, & qualiter. 234.1.p.
- Pestis tpe terra lemmia & bolus armenus magna viam aduersus venenū habent. 235.1.m.
- Pestis tempore variae herbae quibus ipsi succurritur adducuntur. 235.1.f.
- Pestis tempore quibus bubo venenosus a nō venenoso distinguatur. 236.1.f.
- Pestis tempore, & quocunque, anima prius corpore curanda. 236.2.p.
- Pestis aegritudini magis resistunt temperatiora pituitosi & atrabiliosi aut veneno paulatim assuefacti. 224.1.p.
- Petrifas, scammiosa, vel mendosa ossa. 16.1.f.
- Plenilunij tempore cur morbus comitialis, vt quidam ferunt, remittatur. 57.2.m.
- Plenilunij tempore, os cranei quando liceat trepanari. 58.1.m.
- Plenilunij tempore medullae ac humiditates omnes auferuntur & e contra. 56.2.f.
- Plenilunij mutationes quam breuissimae ac celerissimae: cōiunctionales vero diuturniores. 57.2.f.
- Plumbeum globum, quando manu inualida gestare oporteat. 122.1.p.
- Plumbum et si frigide temperature sit virtutem tñ discutienti fortitur & qre. 85.1.p.
- Poëio melleo contra casum, quando agrotus exhibetur, non granarhabbari vt perperam scribitur sed dragmā intellige. 76.2.p.
- Præputio subleuato, & sic in prædenter dimisso quod sequatur in commodum & de modo ipsius reducendi. 204.2.p.
- Præcisio per transfuerum neruis quando cōtingat vulnerato membrum illud euadere. 117.2.p.
- Præcisum ex toto membro an possibile sit agglutinari. 114.2.m.
- Prolapso extra vulnus in scisso nervo, quara tione cauterio tangerendus. 118.2.m.
- Proportio vnguenti apostolorum ad duram cerebri membranam mundificandam cum mele rosato ad tenuem membranam comparatio. 73.1.m.
- Pulmonis vlcera, quare insanabilia. 134.2.f.
- Puncta vulneris ventus, quo tempore coacte scindere liceat. 163.2.m.
- Punctis euulnere scissis, quando oporteat nō statim fila abstrahere. 116.1.m.
- Punctura neruorum leuia medicamenta emollientia tolerant, & qualia. 108.1.m.
- Pure alho æquali apparente, quod non graui ter sit olens, bonum. 48.2.m.
- Puri expellendo a pectoris cavitare oportet vulneratum super vtrumque latus reuolui, & ratio. 140.2.p.
- Pus mouentia medicamētia qualia. 124.2.m.
- Pustularum antiqua crurium manatione resfante, in tuberculo inguinis in hoc morbo peculiari fonticulam aperire, diuq; apertam retinere oportet & quare. 201.1.m.
- Q** Vale medicamentum ad mouendum si corporis & membri temperatura inter se dissideant. 127.1.m.
- Quantitas ad aucta, vel diminuta menti ad augere vel diminuerē ipsius gradum potest. 144.1.p.
- Quaticoriscopi, in curatione vulneris obseruandi. 134.1.p.
- Quæ nam sit in curatione vulnerum thoracis sententia magis eligenda. 136.2.p.
- Quæ requiratur ad hoc vt antiquum vlcus velut simplex vulnus, interdum agglutinetur. 202.1.m.
- Quæ simplicia medicamenta & cuius temperatūre vlcus nernorū cōueniāt. 125.m.
- Quorundam medicorū opinio taxatur morbum gallicum a principio eodem modo medicantium. 173.1.p.
- Quot scopi obseruandi in abscessus supuratione & apertione. 124.2.p.
- R** Abs locus interpretatur. 128.2.m.
- Ratio medicamentorum, quæ apponenda sunt in pectore vulneratis. 134.2.m.
- Rece mirabile per quam difficile in anathome cernitur. 14.1.m.
- Reffis mirabilissimus & cur mirabile dicatur. 17.1.f.
- Reffum vulnus signa. 156.1.f.
- Repræhenio eorum qui apparentibus synthomatibus puris in cavitare pectoris refectionem differunt. 148.2.m.
- Respon-

I N D E X.

Responsio pro Nicholao Florentino qui visus est sententia Hypocratis & Cornelij Celsi aduersari. 14. 2. f.

Reuulsio in vulneratis pectore quibus modis paretur. 134. 1. f.

S.

S Agitalis futura. 16. 1. m.

Sanguis principio vulneris neruorum mittendus & quare ratione. 103. 2. m.

Sanguinis missio vulneratis neruis principio confert, quauis corpus excrementorum sit expers. 103. 2. m.

Sanies in cauitate pectoris crassior qualiter extenuanda. 150. 1. m.

Sarcotica vlcibus non admouenda nisi iam prorsus mundis. 216. 1. p.

Sarcotica quæ emundandi & carnis producendæ in vlcibus vim habent. 216. 1. f.

Sedantia dolorem & sanguinem intus concretum discutientia. 141. 2. f.

Septum transversum diagonaliter, vel oblique spiritus membra nutechius diuidi. 148. 1. p.

Senes & iuuenes dolore meatus auditorij interni cruciati iuuenes citius quàm senes moriuntur. 67. 1. p.

Senex octuagenarius post duos iam menses in capite vulneratus, prauis synthomatibus affectus liuescenti iam cerebri membrana qualiter sanitati fuit restitutus. 68. 1. m.

Seuum & iuuenum ætates temporibus anni æquiparantur. 66. 2. f.

Sensibile supra sensum ponatur, sensus non fit perceptio, & quo pacto intelligatur. 100. 2. m.

Sensus tactus in doloris impressione id quod est iudicat. 101. 1. f.

Sensus & motus membrorum an substantia-liter, an radialiter per neruos deferatur. 43. 1. p.

Sententia Ilaac circa temperaturam cerebri à conciliatore reprehensa saluatur. 18. 1. f.

Sera contra apertione in pectoris vlcibus facta butyro vacino non vitendum. 152. 2. p.

Seruatrix & memoratiua virtus. 17. 1. m.

Signa statim vulnus ad pectoris cauitatem penetrasse indicantia. 133. 2. m.

Signa quæ tractu temporis sanguinem in cauitate pectoris contentum indicant. 134. 1. p.

Signa lætionis interiorum membrorum pectoris. 134. 1. m.

Signa ad methodus dignoscendi puris in cauitate pectoris contenti. 151. 2. f.

Simplicia medicamenta ad membrorum vulnera quæ iia. 127. 1. f.

Sindefmus seu ligamentum os cum osse à parte interna cōnectens sensum expers est for-

tissima tolerans præsidia. 43. 2. f.

Singulorum ventriculorum cerebri diuissio. 16. 2. f.

Synthomata omnia quæ vulnera cōsequi solent cuidam adolescenti vulnerato vulnere eo euadente incolumi. 100. 1. p.

Syrupi quæ sunt sumendi, & aquis admixtis in pectore vulneratis. 134. 2. p.

Situs vulnerati ratio. 141. 1. m.

Solis variaz operationes. 126. 2. p.

Solutio continuitatis à causa externa seu primitiua cur maius vitæ periculum afferat quam antecedens interna. 186. 1. m.

Somniantibus duntaxat crurium læsionem habere, vomitus ciendus. 104. 2. p.

Somni & vigiliæ cum motu & quiete comparatio. 231. 2. f.

Somni quibus plus, quibusve minus iniungendum. 232. 1.

Somnus meridionalis, quibus interdicatur, quibus vero non. 232. 1. f.

Specilij exploratio in fractura cranei non certam penetrationem fracturæ indicat, sed tantum sedem teli nisi admodum ampla fractura sit. 23. 1. f.

Spherica figuratur & min⁹ obnoxia læsionibus. 13. 1. m.

Spinalis medulla. 16. 1. m.

Spinalis medulla cerebri, prorsus ad similes cerebro, quadam tenui membrana neruea à natura diuissio & ratio. 45. 1. f.

Spiritus animalis transitum, in paralytico membro quæ impediunt. 123. 2. m.

Substantia medullaris in tres diuisa ventriculos. 16. 2. m.

Sutura capitum formicarum intestinis scissis ac perinde frustra intestini animalis applicatio irritanda & ratio. 164. 2. p.

Sutura vulneris nec laxa nec stricta esse debet. 114. 2. f.

Sutura quæ admolienda, quando doloris atque inflammationis suspicio est. 115. 1. p.

Sutura quæ neruo partim oblique partimque directe incisso competat. 118.

Sutura transversalis. 161. m. 1. p.

Sutura sagittalis. 161. m.

Sutura retis, quæ dicatur & quibus & qualiter applicetur. 120. 2. p.

Sutura vulneris quando scindenda ac linamentum mittendum. 140. 2. p.

Suturarum vtilitas. 15. 2. p.

Suturæ, pauce aut nullæ san. commodius caput reddant. 15. 1. m.

Suturæ capitis non eodem modo in omnibus sitæ. 15. 1. f.

Suturis cranei vulneratis ratio non est adhibenda nec admouenda. 14. 2. m.

Tabella

I N D E X.

T.

Tabella & capsula, quando citius, quando serius auferenda. 107.2.p.
 Tabella aut capsula membro vulnerato applicanda. 115.2.p.
 Tabellula leuissima vel ex cucurbita fabrefacta, qualiter manui vulneratae applicanda. 107.1.m.
 Taciti cuiusdam authoris quo ad futura nervorum reprehensio. 114.2.m.
 Tactui tam proprium est excellens quam mēsuratum percipere. 101.2.p.
 Taxatur quorundam medicorum opinio sanguinis missionem in morbo gallico damnatum & ratio. 137.2.m.
 Telum ē vulnere qui refigatur. 104.2.m.
 Telum locus, & vulnerationis modus vulnera varia efficiunt. 18.2.f.
 Tempus calidum pro vere & æstate frigidum vero pro hyeme, vel autumno supponit. 67.1.m.
 Temperatura medicinarum duplex fortis nexus vel debilis. 142.1.p.
 Temperaturarum & membrorum discrimen in admoventis auxilijs alta mente tenendum. 117.1.m.
 Tenuiorum intestinorum vulnera lethalia. 157.2.m.
 Terebentina ab Auicena laudatur. 127.1.f.
 Terebentina vera Hispania caret. 127.1.f.
 Terebratione facta præstabit vulneratum colare faculum cum rosis sandalis nenufari aqua rosata super sparsa. 72.1.m.
 Terra lemmia vera vel sigillata cum caream quibus loco eius vtendum. 235.2.m.
 Thlasia quid sit. 19.1.m.
 Thlasia ossis cranei flexio vel compressio contra fracturam, eiusq; medendi methodus. 80.1.m.
 Thoracis vulnerum causa. 133.1.f.
 Thoracis vulnere penetrantium signa. 133.2.p.
 Thoracis vulnera in posteriori parte periculosa & ratio. 134.2.p.
 Thoracis vulnera penetrantia, vt plurimum lethalia & ratio & super hoc quædam Guidonis contextus declaratur. 134.2.m.
 Thoracis vulneribus, naturam enervata duplex præsidium. 142.1.f.
 Thus viceribus corporis, vel membri scipus viceribus vero corporis humidi carnem alit, & ratio. 65.1.p.
 Turis varia operatio. 126.1.p.
 Trepana antiqua, vt summa pernicies ab usu abolenda & ipsorum effigies. 61.1.p.
 Trepana authoris masac foemina bifariam condita, quibus tuto vti possemus & eorum

effigies. 62.1.p.
 Trepanatio fracture cranei cum admoventur admoventur præsertim hyeme oportet linamenta & paños atq; manus chirurgi & instrumenta calefacere. 64.2.m.
 Trepanationis cranei tempore oportet extremitates, deuinci atque constringi & quæ ratione. 64.2.f.
 Trepanorum solidorum, quæ arcu circumguntur effigies. 64.2.p.
 Trepanum idem mascul. & foemina qualiter condatur. 62.2.p.

V.

Varia authorum opiniones circa naturam argenti viui conciliantur. 143.1.m.
 Balsamum indicum (quod falso vocant quid sit. 127.2.p.
 Vena inter duram cerebri membranam rupta non fracto craneo, cur authores in curatione nullum verbum fecerunt. 78.1.m.
 Vena secanda est principio vulnerationis capitis & ratio. 64.1.m.
 Venæ & arteriæ caux & veluti canullatæ cū sint ipsi abscessis ad similes callus creatur. 123.2.p.
 Venæ & arteriæ in plures ramos disperguntur nervi non. itidem. 123.2.m.
 Venularum disruptionis inter duram cerebri membranam quæ sint notæ. 78.2.m.
 Venenum vnum sæpe alterius remedium esse solet & ratio exemplaq; 184.2.f.
 Venter triplex. 13.1.p.
 Ventriculorum cerebri virtutes & situs. 17.1.p.
 Ventriculo imbecillo ex capitis vulnere per consensum medicamentum. 85.2.f.
 Ventre vulnerato confortanda sunt membra præcipua cordi vicina & quare. 167.1.m.
 Ventre vulnerati decubitus. 167.2.p.
 Ventre vulneratis medicamenta applicanda quibus sint commiscenda, vt natura partis simul cum curatione adseruetur. 168.1.p.
 Ventris inferioris vulnerum, quædam in partibus continentibus, quædam vero in contentis fiunt. 155.1.p.
 Ventris vulnerum inferioris causa. 155.2.p.
 Ventris vulnere non penetrantium signa. 155.2.m.
 Ventris vulnere penetrantium signa, & quo pacto exploranda. 156.1.p.
 Vulneribus virtus ampliadis siringotomi idonei instrumenti effigies. 161.2.f.
 Ventris vulnere deligata methodus. 158.2.f.
 Ventris vulnere penetrantia absque linamentis initio curando. 154.1.f.
 Venus quibus temporibus, ætatibus, & naturis molesta, aut non. 234.1.f.

Venus

INDEX

- Venus quando omnino fugienda. 234.2.m.
Venus quando tutior. 234.2.f.
Verba illa Hypocratis libro de lege scilicet natura repugnante: nihil medicina profuit qualiter intelligenda. 73.2.f.
Verum iudicium qualitatis medicamenti non semper a colore vel sapore sumit. 144.2.p.
Vestimentum in aceto decoctum quod Aui-cenna vulnerato ventre super imponi iubet, quid sit intelligendum. 161.1.m.
Vexillæ vulnera lethalia. 157.2.m.
Victus ratio vulnerati in neruis paulatim ad consuetudinem deducenda est. 103.2.p.
Victus ratio pro bono sex rerum non natura lium regimine vsurpatur. 225.1.f.
Victus ratio qualis & quanto tempore vulne-ratis iniungenda. 164.2.f.
Victus ratio qualis. 134.1.p.
Victus ratio quomodo varianda. 134.1.m.
Vinum austerum exsiccans & confortans vul-nus. 87.2.f.
Vinum vulneratis neruis, quando & quibus seruatis propinandum. 103.1.f.
Viridæ arisin quibusdam carnem alere & ra-tio. 126.2.m. (uert. 17.2.p.)
Vitales spiritus quater dicantur inanimales co-
Vlceribus oris abluendis lauacra. 205.1.m.
Vlceribus cum ossis carie proficuum medica-mentum. 178.2.m.
Vlceri pudendi tuberculum inguinibus super uenire peculiare est. 208.1.f.
Vlceris palati materies per nares, narium ve-ro per os deriuanda. 206.1.p.
Vlceribus cum ossis casie oportet candes fer-ramentum ad mouere, quod longe est vti-lius. 207.2.m.
Vlcera antiqua, qualiter interdum contingat vt simplicia vulnera agglutinari. 202.1.p.
Vnguentum gummi iuniperi (vulgo grafa) ad agglutinandum vim habet. 85.1.p.
Vnguentum satis agglutinationi accommo-datum. 166.1.m.
Vnguentum apostolorum & Aegyptiacum apud vulgus suspecta quando ad mundi-fi-cationem duræ membranæ cerebri admo-ueri liceat. 72.2.m.
Vnguentum isis chephalichi aduersus cranei præcisionem cur sic dicitur. 72.2.f.
Vnguentum ex cola ad vulnera agglutinan-da. 118.2.p.
Vnguentum quo inguina & spinalis medu-la & loca ad enosa vngenda in pectore vul-neratis. 141.1.f.
Vnguentum de mucilagibus ad discutiendas & emolliendas morbi gallici cicchofa tuber-cula. 218.1.p.
Vniuersalia decem documenta in vulnere
neruorum curatione obseruanda & qualia. 102.1.p.
Vomitum conuenire affectibus inferioribus & non pharmacum & econtra. 160.1.m.
Vomitum licet absolute dicat morbis inferio-rum membrorum conuenire vulneribus tñ uentris infestissimus & ratio. 160.1.f.
Vrgente dolore ex vulnere nerui turunda o-lei tantillo intingenda. 116.2.f.
Vrgente dolore laxa deligatura vtendum. 115.2.p.
Vulgi opinio qualiter spernenda asseueran-tis morbi gallici a frigida materia sem-pet ortum contraxisse. 172.2.f.
Vulnera omnia genu lethalia apud omnes fe-re authores describuntur. 100.1.f.
Vulnera periculosa in suturis cranei & mini-me radenda. 15.2.f. (16.2.m.)
Vulnera membranæ cerebri inflicta lethalia.
Vulnera capitis rotundi a telo incidendi in-flicta absque cranei penetratione fieri non possunt & ratio. 21.1.m.
Vulnera synthomata consequuntur quæ ma-terierum præ dominium indicant. 44.2.m.
Vulnera crassorum intestinorum remedijs que per sedem iniiciuntur egent, tenuiorum ve-ro medicamentis & quæ ore sumuntur, & quæ per sedem iniiciuntur. 168.1.m.
Vulnera intestinorum aliorum notæ. 156.2.p.
Vulnera in ore ventriculi lethalia in parte ve-ro carnosa non itidem. 156.2.m. (1.p.)
Vulnera hepatis in parte interna lethalia. 157
Vulnera splenis non adeo lethalia. 157.1.p.
Vulnera vexicæ lethalia. 157.2.m.
Vulnera ventris deligandi methodus. 158.2.f.
Vulnera neruorum transuersim incisurum consuendi methodus. 114.1.f.
Vulnera capitis inter supercilia vix absque fi-stula manente curari possunt in quo Cor-ne-lij Celsi cõtextus difficilis explicat. 32.1.m.
Vulnera capitis, vel alia multum intumescere malum nihil vero pessimum & rō. 36.1.m. (f.)
Vulnera lateralia capitis suædi discriminē. 40.1.
Vulnera quatenus vulnera exiccatione egent. 115.2.f. (Celsi. 38.2.f.)
Vulnerata mulier post octo menses euita dif-ficilis
Vulnerato craneo dentium stridor quo pacto penetrationem vulneris significet. 24.1.f.
Vulneratis capite, que signa infalibiliter mor-tem ostendant. 31.1.p.
Vulneratis aqua pituiualis proficua. 50.2.f.
Vulneratis quādo virum propinquū. 50.2.f.
Vulneratis capite ad sanguinis missione, & al-ui solutionem non sunt critici dies ita vt in alijs morbis obseruandi. 51.1.p.
Vulneratis cepite an solutium pharmacum competat. 51.1.p.

I N D E X.

- Vulneratum** quendam ingenuis acerrimus dolor assidue torquebat nullo medicamento proficiente nisi, tantum cibo assumpto. 100.1.m.
- Vulneratus** quomodo immobilis pene egere se possit. 167.2.m.
- Vulneratus** si decesserit euita causa vulneris, vel ne non est curandum de tempore, sed solum an post illatum vulnus semper a malo indeterius processerit. 38.2.f.
- Vulneratus** si imbecillis, ad sanguinis missio nem fit vel partius miti oportet vel cucurbitulas affigi. 103.2.f.
- Vulneri** capitis cum cranei rima naribus correspondenti lauacrum per nares syphone iniiciendum & quale. 73.1.m.
- Vulneri** capitis contuso vt plurimum sutura non conuenit. 40.1.f.
- Vulneri** capitis contuso nonnunquam sutura competit & qualis. 70.2.f.
- Vulneri** in articulis nisi insigniter alto sutura non competit. 115.1.p.
- Vulneri** ab aere offenso viuens gallina statim per medium scissam applicanda. 115.1.f.
- Vulneri** in aliquo articularum infidenti prima curatione oui albumen cum oleo omphacino agitatum applicetur. 115.2.p.
- Vulneri** si agglutinationis, tendat via semper agglutinantia ad mouenda. 115.2.m.
- Vulneri** neruorum si dolor & inflammatio superueniant eis potissimum succurrendum vulnere non prorsus neglecto. 117.1.p.
- Vulneri** contuso in neruis non oportet digere ncia & saniem concitantia nisi breui tempore ad mouere & ratio. 114.1.m.
- Vulneribus** capitis cum fractura cranei in futuris nullo modo ratiōne fractura exploranda est sed linimento mastichis. 24.2.p.
- Vulneribus** capitis cum cranei rima inter radendum os quandoq; sanguinis exitus per fracturam penetrationem indicat quando que vero non. 23.1.f.
- Vulneribus** capitis cum fractura cranei medulla cerebri egressa, quo pacto explorat an sit vera cerebri substantia an sanies concreta vel aliud extraneum. 26.2.p.
- Vulneribus** capitis medicamenta putrefactia maxime in perioftio vel membranis cerebri infestissima. 27.2.m.
- Vulneribus** capitis aposthematis calidi membranis cerebri superuenientis indicia. 28.1.m.
- Vulneribus** capitis super cerebri membrana fungi formis carnosae prominentiae superueniente malum & quomodo curetur. 28.1.m.
- Vulneribus** capitis casus admirandus. 28.1.p.
- Vulneribus** capitis membranarum cerebri rubor, & immobilitas interdum malum. 24.1.p.
- Vulneribus** neruorum inedia tenuis vsque ad septimum diem obseruanda est. 102.2.p.
- Vulneribus** neruorum victus ratio aliter dispensanda est quam illa quae febri citantibus absque vulnere exhibetur. 102.2.m.
- Vulneribus** neruorum partium inferiorum corporis vomitus potius quam ventris solutio conuenit. 104.2.p.
- Vulneribus** neruorum pus superueniens quoniam approbandum. 48.2.f.
- Vulneribus** capitis in principio, quando liceat vitellum oui albumini commixtum admoueri. 43.1.p.
- Vulneribus** capitis, quando maturius aut ferius curatio iteranda. 43.2.p.
- Vulneribus** capitis vena sectio & extremitatum frictions, quando conferat. 43.2.m.
- Vulneribus** modicus sanguinis fluxus non est cohibendus & ratio. 43.2.f.
- Vulneribus** capitis defensuum medicamentum in circumambitu ad mouendum. 44.1.p.
- Vulneribus** capitis deligatura duorum initiorum recte ad mouenda. 44.1.p.
- Vulneribus** capitis atque alijs an oleum & digestiua medicamenta competant. 44.5.p.
- Vulneribus** capitis detecta membrana an oleum rosaceum competat, vel non de eiusque temperatura. 44.2.m.
- Vulneribus** capitis, an oleum rosatum cum butyro vaccino membranae detectae competat, vt Galenus innuit. 45.1.m.
- Vulneribus** capitis ex authoris sententia olei & digestiui, & aliorum emolientium vsus modificatur. 45.1.m.
- Vulneribus** capitis oleum rosatum & alia medicamenta emolientia qualiter & quando a Galeno prohibentur quandoque conceduntur. 45.2.m.
- Vulneribus** capitis oleum omphacinum in principio optimum. 46.1.p.
- Vulneribus** capitis Galenum assuerate medicamenta duntaxat sicca conuenire qualiter intelligendum. 46.1.m.
- Vulneribus** capitis ad mouentes emolientia emplastra taxantur. 46.1.f.
- Vulneribus** capitis stimula cranei quo pacto exploranda. 47.1.m.
- Vulneribus** capitis stimula in futuris incedens longe melius linimento mastichis quam attrimento & ratiōne exploratur. 47.1.m.
- Vulneribus** capitis contulis apparentibus prauis symptomatibus craneum illa sum radendum vel trepanandum est absque linimento mastichis & absque attrimento. 47.2.p.
- Vulneribus** capitis cum fractura cranei non omnino penetrante quando & qualiter oporteat vt ratiōne in quo Galeni & Guidonis

I N D E X.

- nis textus difficilis declaratur. 4.2.m.
- Vulneribus capitis cum fractura cranei si interradendum os sanguis effluat non semper penetrationem arguit. 48.1.p.
- Vulneribus capitis, cum aliquantula fractura cranei etiam si os rasure lene relinquitur tamen synthomatibus pravis denovo occurrentibus rasure vel trepanatione craneum perforandum est sicuti in penetranti fractura & ratio. 48.1.f.
- Vulneribus capitis cum fractura cranei penetranti sectionis admonenda figura. 48.2.m.
- Vulneribus capitis in temporibus inflectis aperiatio valde periculosa & ratio. 48.2.f.
- Vulneribus capitis in temporibus sectionem admodum lethale esse Hypocrates & Cornelius probant. 44.1.p.
- Vulnerato capite mamillares carunculae extra vulnus interdum prodeit in quibus a cerebri substantia differant. 26.2.m.
- Vulnerato capite & laeso cerebro in parte anteriori quare ratio laeditur, & in posteriore vero memoria. 26.2.f.
- Vulnerato capite situs tam principio quam postea observandus. 44.1.m.
- Vulnerato capite cuiusdam pueri egressa quae notabili cerebri substantia, & in columis eualit. 30.1.m.
- Vulnerato in laterali parte capitis si gladii & ceruicis tensio vulnere correfpondeant non lethale & super hoc historia. 31.2.p.
- Vulnerato capite panni laete muliebri imbuti oculis superponendi. 72.1.p.
- Vulnerato pectore quod oporteat agglutinatione post habita consilium mutare. 138.1.m.
- Vulnerato in genu exiguo vulnere euita discessisse vidit author. 100.1.f.
- Vulneratorum periculum caute praesagiendi methodus. 55.1.f.
- Vulneratorum foelix vel infelix eventus quod lites saepe ex influxu caelesti pueniant. 27.2.f.
- Vulnerati venter brachiale per multum tempus post fanitatem atque etiam lana gerere debent. 168.2.f.
- Vulnerati in ventriculo signa. 156.1.m.
- Vulnerati capite praesagium Petri de argelata taxatur. 33.1.m.
- Vulnerati capite, quando crassiori cibo uti debeant. 74.1.m.
- Vulnerati in capite a luce caueant & a locutione abstinant. 72.1.f.
- Vulnerati membro reposicio qualis. 107.2.m.
- Vulnerati non eadem victus ratione sicuti laborantes acutis morbis sunt cibandi & ratio. 74.1.m.
- Vulnerati ad calli generationem, quibus cibis nutriendi. 74.1.f.
- Vulneratis capite pileum ex agnina pelle praefertim hiemali tempore superponatur. 44.1.m.
- Vulneratis capite cum fractura cranei penetrante quare vomitus contingat. 24.1.p.
- Vulneratis capite cum fractura cranei penetranti quare casus contingat. 24.1.m.
- Vulneratis capite quare oculorum caligo contingat. 24.1.m.
- Vulneratis capite membranae cerebri incisio quibus notis deprehendatur. 24.2.f.
- Vulneratis membranis cerebri qualiter ipsius potentiae laedantur. 25.1.m.
- Vulneratis capite quando febris lethalis quado vere non. 25.1.m.
- Vulneratis capite rigor ceruicium & maxillarum quando lethalis. 25.2.p.
- Vulneratis capite vigilae interdum malum protendunt. 25.2.p.
- Vulneratis capite cum fractura cranei nauseam, & vomitum accidere malum & ratio. 25.2.m.
- Vulnerato capite excrementa & lotium malemittere malum. 25.2.m.
- Vulneratis capite fracto craneo luctuosa suspiria superuenire malum. 26.1.p.
- Vulneratis capite oculum lipitudo aut obsecna lacrymula malum. 26.1.p.
- Vulneratis capite cerebri medulla incisio quibus notis dignoscatur. 26.1.m.
- Vulneratis capite quot modis contingat cerebri membrana inflammari. 27.1.m.
- Vulneratis capite os comprimere vel pungere cerebri membrana statim auferendum. 27.2.f.
- Vulneratis capite cum fractura cranei quae sint humiditatis prolapsae super membranam cerebri notae. 24.1.m.
- Vulneratis capite non omnibus prava synthomata eodem modo assurgunt sed diuersimode. 24.1.f.
- Vulneratis capite absque fractura cranei quaeque prava synthomata eueniunt & ratio. 24.2.p.
- Vulneratis nervis aluicienda est non pharmaco nimis estrene. 104.1.f.
- Vulneratis canite, imbecillis, non princeps venae venarum ramus, secunda & ratio. 44.2.m.
- Vulneratis capite, quibus sanguinem emittere non licet, cucurbitulae affigantur. 44.2.f.
- Vulneratis capite, cephalica vena post principium vulneris commodum fecatur. 50.1.p.
- Vulneratis capite victus ratio quo pacto sit instituenda. 50.1.m.
- Vulneratis capite principio lentes alias non conceduntur & ratio. 50.1.f.
- Vulneratis capite liquidum amygdalarum conceditur & obiectionibus quorundam respondetur. 50.1.f.
- Vulneratis thorace duplex exhibenda potio nis discrimen cum febre, aut sine ea. 142.2.p.
- Vulneratis capite quando terebratio ferius corste

I N D E X.

- coacte ad mouenda. 24. 2. m.
- Vulneratis capite sub lingua bulas ac pustulas & maxillarum, & ceruicium rigorem euenire malum. 30. 1. m.
- Vulneratis capite biliosum vomitum superuenire malum. 30. 1. m.
- Vulneratis capite diuagatio, & inquietudo malum. 30. 1. m.
- Vulneratis capite sudor inter febriendū assiduus conuulsionem minatur. 32. p.
- Vulneratis capite sincopa superueniens quādo sit cum mortis suspitione quando vero non. 32. 2. m.
- Vulneratis capite mentis alienatio quando lethalis. 32. 2. m.
- Vulneratis capite oculorū varius tumor quo pacto ad prædictionem salutis, vel mortis distinguendus. 32. 2. f.
- Vulneratis capite, an verum præsagium per vrinam & pulsū assumatur. 32. 2. p.
- Vulneratis capite cur resolutio in latere vulneris, conuulsio vero in opposito accidat, & super hoc tria dubia super textu Guidonis adducuntur & diluuntur. 32. 2. m.
- Vulneratis recenti plaga frigida magis conuenit quam antiqua. 50. 2. m.
- Vulneratis capite ante prandium, & cenam crura fricanda. 72. 1. m.
- Vulneratis capite post trepanationem cephalica vena secanda. 72. 1. f.
- Vulneratis capite in collo alijs inguinib⁹ vnguēto in antidotario describendo illiniatur. 72. 1. f.
- Vulneratis capite venę sectio ex tallo quando commodior. 49. 2. f.
- Vulneratis capite febris superueniens quādo lethalis. 30. 1. m. (30. 2. f.)
- Vulneratis capite febris non lethalis signa.
- Vulneribus ventris non penetrantibus sutura aliorum vulnerum adaptanda. 188. 2. f.
- Vulneribus capitis cū fractura cranei perforāda authoris consiliū ac limitatio. 52. 2. m.
- Vulneribus capitis synthomata praua ex interna noxa absque fractura cranei quandoque vsque ad quatuordecimum quandoq; vero vsq; ad vigesimum primum hyemali potissimū tempore differuntur. 24. 2. f.
- Vulneribus capitis os alienum sumere colorem principio nigrum, deinde palidū, aut valde album malum. 30. 1. m.
- Vulneribus capitis lateralibus cōuulsionem superuenire vidit author infirmis euadentibus, & ratio. 31. 2. f.
- Vulneribus capitis duo aphorismi Hippocratis accommodati explicantur. 21. 1. p.
- Vulneribus, vel quo vis alio affectu laborantibus, vrinę indicium melius sumitur ab hepate sursum quam deorsum. 33. 1. f.
- Vulneribus capitis synthomata praua si deteriorando procedunt lethalia, secus si remittantur. 33. 2. p.
- Vulneribus capitis durā cerebri membranę nigrities trifariam euenire potest & quare illarum lethalis cum noua textus Auicennę explicatione. 35. 2. p.
- Vulneribus capitis cum cranei fractura in plenilunio verenda, & ratio. 35. 2. f.
- Vulneribus capitis caro rubra apparens salutis spes. 35. 2. f.
- Vulneribus capitis, siue alijs, tu more magno apparente, citoque sine causa rationabili delitescere malū, & ratio. 36. 2. p.
- Vulneribus capitis pus superueniens quale optimum. 36. 1. m. (do. 34. 2. p.)
- Vulneribus capitis an cōpetat sutura & quādo.
- Vulnerib⁹ capitis cū fractura cranei tps generandi calli & super hoc dubitatio. 36. 2. m.
- Vulneribus capitis fracto craneo, nec alijs vulneribus callus seu porus æquali tempore generatur, sed quibusdam citius, quibusdā serius, & ratio. 37. 1. m.
- Vulneribus apta figura puris expulsionī momenti est. 1. p.
- Vulneribus, quando & qualiter fibularum sutura molienda. 40. 1. m.
- Vulneribus capitis, noua capillorum sutura molienda & qualiter. 40. 1. m.
- Vulneribus temporum, eadem quæ cæteris lateralibus vulneribus capitis incisus curatio ad mouenda. 41. 2. m.
- Vulneribus capitis cum ossis abolitione frustrum cucurbitæ crebris foraminibus impactis ad mouendū, & quo pacto. 42. 1. p.
- Vulneribus neruorū, dolore infestante si rupum papauerinum vulneratum delingere optimum. 116. 2. f.
- Vulneribus neruorum emolientia præfidia intestissima. 107. 2. m.
- Vulneribus thoracis penetrantibus qualis medendi methodus instituenda, vt sanguis intus prolapsus foris prodeat. 138. 2. p.
- Vulneribus capitis trepanandis octo obseruanda documenta ab authore sigillatim explicata. 54. 2. m.
- Vulneribus capitis præsertim trepanandis oportet medicum periculum infirmi præfagire, & ratio. 55. 1. f.
- Vulneribus capitis trepanandis à futuris fugiendum, quo pacto intus futuris possimus vitiosam humiditatem ad interiora prolapsam extrahere. 56. 2. m.
- Vulneribus capitis trepanandis quod tempus à plenilunio expectare liceat. 57. 2. f.
- Vulneribus neruorum principio linamento imposi-

I N D E X.

- imposito plures è vita discessisse author vidit, sine ipsis vero multos breui sanatos & historia & ratio. 105.1.p.
- Vulneribus nervorum principio linamenta minimè sunt imittenda & ratio. 104.2.m.
- Vulnerib⁹ capitis pharmacū solvès cōvenire aut non ex authoris s'ia declaratur. 51.2.m.
- Vulneribus capitis duo Cornelij Celsi cōtex tus, qui vident cōtrarij declarantur. 52.2.m.
- Vulneribus capitis trepanādis duplex temeritas à quibuldā chirurgis cōmittit. 544.m.
- Vulneribus capitis trepanandis quorundam abusus reprehenditur.
- Vulneris secundam remutationem infra triduum semper esse molendam alienum à ratione. 106.1.m.
- Vulneris curam æstare bis die hyeme vero semel semper fieri qualiter nihil absurdus. 106.1.m.
- Vulneris breuitas curationis quid habeat apud vulgus incommodi. 106.1.p.
- Vulneris nervorum ex secundaria intentiōe curationi brevis turunda abscesso eius capite ad mouenda & ratio. 116.2.m.
- Vulneris ex secunda intentiōe curatio quando & qualiter aggredienda. 116.1.f.
- Vulneris primæ curatiōi, curtere bentina applicatur, cum sit calida. 115.1.f.
- Vulneris agglutinatio, à quibus cōstat. 117.1.p.
- Vulneris capitis lateralis post adnotam futuram curatio. 41.1.m.
- Vulneris verticis capitis varia curatio secundum ipsius vulneris varietatem. 43.2.m.
- Vulneris capitis referandi ad aduerfio. 43.1.f.
- Vulneris capitis penetrantis indicia à synthomatibus desumpta. 23.2.p.
- Vulneris capitis cum fractura cranei ratione, & attramēto explorādi methodus. 24.2.p.
- Vulneris nervorum acerrimj doloris duplex causa, & quæ eorum potior. 100.2.f.
- Vulneris ventris nō penetrātis curatio, q̄ nō differt à curatione aliorū vulnerū. 158.2.m.
- Vulnerū capitis cū fractura cranei circa prognosticorū tps opinionū diuersitas. 37.2.p.
- Vulnerū capitis circa varia præfagia varièdu obitationes, earumque solutiones. 37.2.m.
- Vulnerū capitis varia indicia atque præfagia quæ salutem, vel mortē ptendant. 30.1.p.
- Vulnerum capitis sententia quædā Lamfrancii reprehenditur. 54.1.f.
- Vulnerum capitis cum labia marcescūt & extenuantur malum. 30.1.m.
- Vulnerum capitis synthomata mala quorū omnia simul ægrum inuadunt. 31.1.f.
- Vulnerum capitis periculum ad centum dies protendi Rogerius testatur. 781.2.m.
- Vulnerum capitis cum fractura cranei obitio-
gorum quorundam error aut fraus & huius rei historia. 26.1.f.
- Vulnerū capitis ossa cōmota alterata nō sunt violēter extrahenda nisi interdum coactē. 64.2.f. (24.2.p.)
- Vulnerum capitis mala, non statim patent.
- Vulnerū capitis intuitu paruorū sepius quā magnorū pericula cōtingunt & rō. 42.2.f.
- Vulnerum intestinorum ieiunij & portanarij signa. 156.2.p.
- Vulnerum ventris curatio. 58.2.p.
- Vulnerum capitis de eo textus contrarij pauli agmenta explicātur & conciliant. 52.2.f.
- Vulnerū ac potissimū capitis non temere debet medicus salutem polliceri. 42.2.m.
- Vulnerū capitis circa tēpus periculi quorū Guido iuris peritos allegauit. 38.1.f.
- Vulnus oblongū in temporibus citra fracturam cranei qualiter euenire potest. 22.1.f.
- Vulnus temporū per transuersum et si oblongum quo pacto citra fracturā cranei cōtingere pōt & q̄b⁹ oīa hæc dignoscant. 22.2.m.
- Vulnus capitis contusum etiam exigua ossa frangere potest. 22.2.m.
- Vulnus si in brachio sit saphena ex talo eiusdem partis secanda si in pede aut crura basilica eiusdem. 104.1.m.
- Vulnus puncturæ nerui quibus digerendum, emundandum, & exiccandum. 111.1.m.
- Vulnus multum intumescere mahum nihil vero pessimum & ratio. 44.1.f.
- Vulnus iam confutum, quo medicamento abluendum. 166.1.p.
- Vulnus capitis ubi ingēs dolor torquet oleo ex ouorum vitellis fouendum est. 441.p.
- Vulnus colli vesicæ agglutinatur. 157.2.f.
- Vulnus capitis cum cranei penetrantis rima nō posse absq; ei⁹ perforatiōe curari pbat, & deniq; alia verior autorū opinio. 52.1.m.
- Vulnus capitis cum cranei fractura si auribus correspondeat speculo, aures, amplianda, & syphone fanies fugenda. 73.1.m.
- Vulnus cōtusum semper compositū. 75.2.m.
- Vulnus laterale capitis transuersum incisum & cum substantia abolitione quo pacto curandum. 41.2.f.
- Vulnus capitis omne periculosum sed magis in summo capite. 42.1.f. (est. 114.1.p.)
- Vulnus incisum simplex continui solutio
- Vulnus quando agglutinari prospere succedit, non triduo nec sexto die dissoluendū, si vero aduerse eodem die. 106.2.f.
- Vulnus in aliquo articulo, non tucto cōtingit, nisi magnum sit. 44.1.m.
- Vulnus bifariam contingit. 106.2.m.

Finis Tabulæ.